

绪言

总论

第一章 方剂学发展简史

第二章 中兽医方剂基本理论

第一节 方剂与中药

第二节 中兽医治则治法

一 治则

二 治法

第三节 中药的配伍

一、配伍的概念

二、配伍七情

三、方剂中配伍的目的

四、配伍与方剂的关系

五、配伍禁忌与妊娠禁忌

六、药对

第四节 兽医临床实践中方剂的来源

第五节 方剂的命名和分类

一、命名

二、分类

第三章 方剂的组成

第一节 概述

第二节 组方的依据

第三节 方剂的基本构成

第四节 成方的使用变化

第四章 方剂的调剂

第一节 概述

第二节 处方

一、处方的概念与种类

二、医师处方的内容与特点

第五章 方剂的使用

第一节 剂型

第二节 剂量

第三节 用法

第六章 类方概述

一、促进动物产品产量方

二、防治传染性疫病方

三、治疗内科病证方

四、治疗外科及伤科病证方

五、治疗胎产病证方

六、治疗幼畜病证方

第七章 比较方剂学概述

各论

附录:

- 1、 新药典方剂名称剂组成
- 2、 兽药典制剂通则部分
- 3、 常用药对

绪言

方剂包含“方”与“剂”两方面相关联的含义。其“方”是在辨证审因确定治法之后，依据治法、结合药物性能，选择合适的药物及用量，按一定配伍原则和结构层次，形成一个处方。其“剂”是依据上述处方遣药定量，并按应用要求加工成一定的制剂形态。

“方剂”一词，最早出现于南北朝前后，《梁书·陆襄传》记载：“襄母卒患心痛，医方须三升粟浆……，忽有老人诣门货浆，量如方剂。”《新唐书·甄权传》中附许胤宗云：“脉之妙处不可传，虚著方剂，终无益于世。”这里所说的方剂，即是指医方而言。

考“方”之义，既有医方、药方、处方的含义，如“譬医之治病也，……方施而药行”（《论衡·定贤》）；又有规定、规矩的意义，如“圆者中规，方者中矩”（《周礼·考工记》），“不以规矩，不能成方圆”（《孟子·离娄上》）。“剂”，古文通‘齐’，有整齐、整合、排列之义，也体现了一定的规定性和有序性；同时，“剂”还有调配、调和之意，《礼记·少仪》说：“凡齐，执之以右，居之以左”，郑玄注：“齐，谓食羹酱饮有齐和者也”，《后汉书·刘梁传》也说：“和如羹焉，酸苦以剂其味。”可见，方指药方、处方，剂指调配、调和，“方剂”的原意是指以药物按一定的规矩和方法组合成方。《汉书·艺文志》最早对方剂的含义进行了阐述，认为：“经方者，本草石之寒温，量疾病之浅深，假药味之滋，因气感之宜，辨五苦六辛，致水火之剂，以通闭解结，反之于平”。因此，方剂绝不是简单的药物拼凑或堆砌，也并非任何一张处方都可以被称为符合要求的方剂。方剂是一个蕴含着中兽医辨证论治思想的独立整体，它是针对某一动物或某一群动物病证采取的中兽医药物治疗实践活动。方剂的组成过程，不仅是合理选取几味中药将其按一定量组合在一起，它包含着中兽医诊疗实践的每个环节，即诊断、辨证、论治、遣药、调剂、应用等。

中兽医方剂学则是研究和阐明治法与方剂的理论及其临床运用的一门学科，是中兽医学的主要基础学科之一。

中兽医方剂学研究的内容是以中兽医基础理论、兽医中药学等前期基础学科的内容为基础的，因此，方剂学在中兽医基础学科和临床学科之间，起着重要的纽带和桥梁作用，是中兽医学理、法、方、药体系中的重要环节。

中兽医方剂学的任务是通过一定数量常用方剂的讲授，引导学生掌握组方原理和配伍方法，培养学生分析、运用方剂以及临证组方的能力，并为今后学习中兽医学其它临床课程奠定基础。

中兽医方剂的内容十分丰富，本教材选用了一些经典的代表性成方，在学习这些成方时，记住其组成、主治、功效和应用等是基本要求，关键是要分析其组方思路、理论基础、用药技巧，掌握这些方剂的配伍规律和临床应用的变化，同时要举一反三，触类旁通。许多经典方剂，立法精辟，组方严谨。对于这些方剂，应在理解方义的基础上，熟记其组成以及主要的加减和演变，或反过来在记忆其组成的过程中加对方义的理解。前人曾经编撰过一些汤

头歌诀，其中有的概括性强，简明上口，有利于对方剂的记忆和理解，在学习过程中可选择性地背诵。

总论

第一章 方剂学发展简史

人医方剂学的发展经历了 2000 多年的历史，现存的方书，据《全国中医图书联合目录》记载，仅从晋、唐至今已多达 1950 种，至于与方剂有关的医籍就更多。中兽医方剂是在人类同动物疾病作斗争的过程中，不断借鉴人医中药方剂和在此基础上创新发展而形成的。中兽医方剂的发展过程包含在中兽医学发展的过程当中，已具有上千年的历史。

早在原始社会时期，人们就开始利用某些药物来防治疾病，后来又渐渐地把几种药物配合起来，就逐步形成了药方，这就是最初的方剂。用于治疗动物疾病的方剂，是人类开始驯养动物之后，为了和动物疾病作斗争而逐渐形成和创立起来的。在现存史料中，最早记载兽医药方的是汉简。如“流沙坠简”中有一简载写：“治马伤水方：姜、桂、细辛、皂夹、付子各三分，远志五分，桂枝五钱……”。东晋时期，葛洪所撰《肘后备急方》的卷八，即“治牛马六畜水谷疫疠诸病方”，是现存古籍中最早的有关兽医方剂的篇章。公元六世纪，后魏贾思勰撰写了一部《齐民要术》，其中的卷六为畜牧兽医专卷，收录了治牛、马、驴、羊和猪的方剂 40 余个，有单方和复方，并采用了散、膏、煎、酒、薰烟等不同的剂型。

有史料记载，隋代曾出现过中兽医方药专著，但因原书已佚，其内容无从查考。现存最早的中兽医方药专书为唐宋时期的《蕃牧纂验方》和《安骥药方》。《蕃牧纂验方》为宋代王愈所撰，载有 57 个治马验方，除“四时调理”方外，分心、肝、脾、肺、肾及杂症六类。《安骥药方》大约成书于公元九世纪，书中收录医治马病的药方 144 个，并按功效和主治分为 25 类。在唐代，李石所撰《司牧安骥集》是我国第一部中兽医专著，理、法、方药俱备；有的版本还收录了上述《安骥药方》和《蕃牧纂验方》。由于这一时期已经形成了中兽医方剂学的基本理论，并有了一系列成方，因而奠定了中兽医方剂学的基础。

以后，中兽医方剂学的知识得到了不断的丰富和发展。元代卞宝的《痊骥通玄论》，有关于药方的专篇“痊骥通玄注解汤头”，收录方剂 113 个，其中有些方剂吸收了当时中医方剂学的原理和内容，立法和配伍相当精辟。1608 年，明代著名兽医喻本元、喻本亨兄弟合撰的《元亨疗马集》问世。该书收录了治马、牛、驼的药方 400 余个，并有“经验良方”和“使用歌方”两个方剂专篇，还载有关于方剂组成、配伍禁忌等方面的内容。从该书可以看出，到了明代，中兽医方剂的理论与运用已经形成了比较完整的体系。在明代，杨时乔等编撰的《马书》中，关于 16 种蹄病的药方有较好的参考价值。1639 年，徐光启的《农政全书》付梓，其中不仅有治马、牛、羊、猪的药方，还有医犬、猫、鸡的药方 100 余个。同一时期，朝鲜刊行了一部汉文的《新编集成马医方牛医方》，这些，都从各个方面丰富了中兽医方剂学的内容。

到了清代，中兽医学的发展虽然比较缓慢，但在当时出现的一些古籍中，仍不乏中兽医方剂学的内容。周维善编著的《疗马集》(1788 年)载有药方 110 个，称为“疗马百一方”，据认为，其中有些还是家传验方。傅述风著的《养耕集》(1800 年)载有药方 100 多个。

还有《抱犊集》、《牛经备要医方》、《牛经切要》、《相牛心镜要览》、《牛医金鉴》等，其中都有不少医牛病的药方。《驹病集》是现存仅有的一部幼畜科古籍，其中的药方自然具有幼畜科的特点。《猪经大全》中则载有 50 种猪病的防治药方 63 个，是现在所能见到的唯一猪病古典专著。曾经流传于我国西南的《活兽慈舟》(约刊行于 1873 年)内容较全，载有治疗黄牛、水牛、马、猪、羊、犬、猫病的药方 700 多个，这些内容各有特色，都有一定的参考价值。

经过本世纪前半叶中兽医学发展的一段低落时期之后，从 50 年代开始，随着中兽医学的迅速发展；中兽医方剂的整理、应用和研究也取得了长足的进步。1956 年召开了全国民间兽医座谈会，会上交流了许多有价值的验方，会后编纂出版了《中兽医验方汇编》，从而保存了许多知名者中兽医的宝贵经验。以后，在整理古籍、搜集民间兽医验方、扩大方剂应用范围、探讨方剂作用机理、改进剂型等方面，都做了许多工作。70 年代以来，为了系统地总结中兽医方剂学的理论与实践，较完整的现代中兽医方剂学著作相继问世。在中等和高等农业院校中也开设了中兽医方剂学课程。为了使中兽医的成方制剂规范化，1978 年，颁布了《兽药规范》二部(即中药及成方制剂之部)；在此基础上，又制定和颁布了《中华人民共和国兽药典》二部(1990 年版)，其中收载成方制剂 81 个，使兽医中药成方制剂的生产和应用开始有规可循。以后每五年对《中华人民共和国兽药典》修改和补充一次，在 2000 年版中，已收载成方制剂 178 个。至此，中兽医方剂学就形成了隶属于中兽医学的一个较成熟的分支学科。

2005 年国家又组织国内相关部门和专家，对《中华人民共和国兽药典》进行了最近一次的修订，根据当前国内畜牧业发展的实际情况，补充和修改了部分方剂；增设了部分小动物用药；部分药物规定了有关休药期；增设了部分天然植物添加剂等。

随着兽药 GMP 规范的实施和中药 GAP 规范的完善实施，以及人们对食品安全问题的关注，中兽医方剂学将在动物疾病预防控制方面发挥更大的作用，其必将成为中兽医学中一门既具有较强的理论性又具有较强的实用性的分支学科。

第二章 中兽医方剂基本理论

中兽医方剂学是联系中兽医基础理论和临床实践的桥梁和纽带，它与中兽医治则治法、兽医中药等有着密切的关系，要想学好方剂学，必须懂得中兽医基础知识和兽医中药基本知识。

第一节 方剂与中药

中药是中兽医临床治疗疾病的基本材料之一，其种类繁多，功效各异。临床实践活动中，对于一些病因明确单一、病情轻微的病证，可以选取一味中药组成一个简单的处方应用。但

大多数情况下，多采取选用多味中药或中药与西药组合在一起，构成一个复杂的处方应用。其必要性在于单味药物作用的局限性，动物疾病的复杂性，发挥配伍使用的各种优点等。药物组成方剂后，能互相协调，加强疗效，更好地适应复杂病情的需要，并能减少或缓和某些药物的毒性和烈性，消除其不利作用。也就是说，药有个性之特长，方有合群之妙用。

中药，尤其是植物基源性和动物基源性中药，往往含有多种化学成分；即使是矿物基源性中药，其成分也不单一。由多味中药组成的方剂，其化学成分则更加复杂。方剂的复杂成分作用于动物体，往往会产生复杂的组合效应。一个好的中药方剂，既包括辨证论治的基本理论和法则，又反映出用方遣药的丰富经验和灵活技巧。在防治动物疫病的实践中，就是要根据中兽医的这些法则、经验和技巧，寻求药味的最佳配伍组合，从而实现最佳组合效应，以便取得最好的防治效果。因此，组合效应是中药方剂的主要特色和优势所在。

第二节 中兽医治则治法

方剂是在辨证立法的基础上选药配伍而成的。只有首先理解方剂与治则治法的关系，才能正确的遣药组方和运用成方。

治则治法和方剂，都是中兽医学理、法、方、药体系的重要组成部分。临床辨证论治是一个分析问题和解决问题的相关过程，只有辨证正确，治则治法的针对性才能明确和具体，根据治法遣药组方才能获得预期的疗效。因此，治则治法是联系辨证理论和遣药组方的纽带，也是学习和运用方剂不可缺少的基础。

治法，是在辨清证候，审明病因、病机之后，有针对性地采取的治疗法则。早在《黄帝内经》中已有丰富的治法理论记载，如《素问·阴阳应象大论》云：“形不足者，温之以气；精不足者，补之以味。其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中满者，泻之于内；其有邪者，渍形以为汗；其在皮者，汗而发之。”《素问·至真要大论》云：“寒者热之，热者寒之，微者逆之，甚者从之，坚者削之，客者除之，劳者温之，结者散之，留者攻之，燥者濡之，急者缓之，散者收之，损者益之，逸者行之，惊者平之，上之下之，摩之浴之，薄之劫之，开之发之”等均为中医学和中兽医学奠定了治法理论的基础。至汉末，医圣张仲景在“勤求古训，博采众方”的基础上，创造性地使治法和方证融为一体，总结了一整套临床辨证论治的体系。其后，随着历代医家对中医理论和临床实践的不断丰富和总结，使治法内容更加丰富多彩，更能适应各种病证的治疗需要。

中兽医学的治法内容，可以归纳为两个层次。首先，具有一定概括性的、针对某一类病机共性所确立的治法，称为治疗大法，如表证用汗法、寒证用温法、热证用清法、虚证用补法、实证用泻法等，本教材中“常用治法”所讨论的“八法”即属这一层次。其次是针对具体证候所确定的治疗方法，即具体治法。各论中每一具体方剂的“功用”项目即体现了该方的具体治法。在临床运用中，只有精确地把握具体治法，才能保证其在具体病证治疗中有较

强的针对性。

治法不但具有多层次的特点，而且还具有多体系的特点。这是因为中兽医学在长期的发展过程中，形成了临床辨证论治的多种体系，如八纲辨证、脏腑辨证、六经辨证、卫气营血辨证等。由于治法和病机的对应性，因此形成了相应的不同治法体系，如“宣肺止咳”、“滋水涵木”等属于脏腑治法体系，“和解少阳”、“泻下阳明热结”等属于六经治法体系，“清气分热”、“清营凉血”等属于卫气营血治法体系。我们在学习和运用时，必须紧密结合相关病机和辨证体系的基本理论，才能对具体治法以及遣药组方的把握达到切中病机、针对性强的要求。

一 治则

治则，就是治疗动物疾病的法则。它是以四诊所收集的客观资料为依据，在对疾病综合分析和判断的基础上提出的临证治疗规律，是各种证候具体治疗方法的指导原则。

中兽医学的治病法则，包括扶正与祛邪、治病求本、同治与异治，三因制宜和治疗与护养等方面的内容。这些原则，对于指导临床具体立法和处方用药具有重要的意义。

（一）扶正与祛邪

疾病的过程，在一定意义上可以说是正气与邪气双方相互斗争的过程。正邪斗争的胜负，决定着疾病的进退，邪胜则病进，正胜则病退。因此，在治疗法则上也就离不开“扶正”和“祛邪”两个方面，即通过扶助正气或祛除邪气，借以改变正邪双方力量的对比，使疾病向痊愈的方面转化。总的来说，各种治疗措施都是根据扶正和祛邪这两个原则而制定的。

1. 扶正与祛邪的概念及其关系 扶正，就是使用补益正气的方药及加强病畜护养等方法，以扶助机体正气，提高机体抵抗力，达到祛除邪气，战胜疾病，恢复健康的目的。祛邪，就是使用祛除邪气的方药，或采用针灸、手术等方法，以祛除病邪，达到邪去正复的目的。

扶正与祛邪，虽然方法不同，但二者密切相关，相互为用，相辅相成。扶正，能使正气加强，有助于机体抗御和祛除病邪，也就是说扶正是为了更好地祛邪；祛邪，能够排除病邪的侵害和干扰，使邪去正安，也就是说祛邪的目的是为了保存正气以及有利于正气的恢复。因此，从这个意义上可以说“扶正即可以祛邪，祛邪即可以安正”。但由于在疾病过程中，正气是矛盾的主要方面，任何治疗措施都是通过畜体的生理功能而起作用的，因此中兽医学非常重视机体的内在因素，在扶正与祛邪二者之间尤其强调扶助正气。然而，无论是扶正还是祛邪都要运用适当，做到祛邪而不伤正，扶正又不留邪。

2. 扶正与祛邪的运用原则 扶正，适用于以正气虚为主而邪气也不盛的虚证，具体有益气、养血、滋阴、助阳等方法。祛邪，适用于以邪气盛为主而正气也未衰的实证，具体有发汗、攻下、清解、消导等方法。

中兽医学重视机体的内在因素，但并不排除外在因素的致病作用，亦不忽略祛除病邪在治疗上的重要作用。一般在临床运用的时候，须结合邪正盛衰消长的具体情况，根据正邪双方在疾病过程中所占的地位，区别扶正和祛邪的主次、先后，灵活掌握。当病情比较简单，

或是正虚，或是邪实时，单独扶正或祛邪，即可达到治疗目的。但在很多疾病过程中，邪正虚实往往混杂出现，所以在运用中应把“扶正”与“祛邪”两方面辨证地结合起来，根据病畜的具体情况，分别采用“祛邪兼扶正”，“扶正兼祛邪”，“先扶正后祛邪”，“先祛邪后扶正”等方法，才能收到预期的效果。

► **祛邪兼扶正** 适用于邪盛为主，兼有正衰的病证。在处方用药时，应在祛邪的方剂中，稍加一些补益药。如治年老体虚、久病或产后津枯肠燥便秘的当归苁蓉汤就是一个实例。

► **扶正兼祛邪** 适用于正虚为主，兼有留邪的病证。在处方用药时应在补养的方剂中，稍加一些祛邪药。如治疗奶牛前胃弛缓而有食滞时就应采用此法。

► **先扶正后祛邪** 适用于正虚邪不盛，或正虚邪盛而以正虚为主的病证。如此时兼以祛邪，反而更伤正气，只有先扶正，待正气增强后再去祛邪。

► **先祛邪后扶正** 适用于邪盛正不太虚，或邪盛正虚的病证。如此时兼以扶正，反而会有留邪的弊端，故只能先祛邪，然后再扶正。如阳明腑证之热结肠腑，便闭不通，导致化燥化热而阴伤，则须急下存阴，以免热结愈甚而阴津更伤，故应先施以大承气汤泻下热结，待结去后再以养阴生津药物进行调理。

总之，扶正与祛邪是最基本的治则，在临床运用时，要根据病情，灵活掌握，特别是在需要扶正与祛邪同时并用时，应分清主次，有所偏重。

（二）治病求本

本，指疾病的本质；标，指疾病的现象。治病求本，是指在治疗疾病时，必须寻求出疾病的本质，针对本质进行治疗。它是辨证论治的一个基本原则，对于疾病的治疗具有重要的指导意义。如《素问·阴阳应象大论》说：“治病必求于本”。

治病求本的具体内容很多，中兽医提出的“标本缓急”、“正治反治”即体现了这一基本原则。

1. 治标与治本 标与本是一个相对的概念，常用来概括说明事物的本质与现象，因果关系以及病变过程中矛盾的主次关系等。就其在治则中的运用而言，应随疾病过程中的具体情况加以区分。以正邪关系言，则正气为本，邪气为标；就病因与症状言，则病因为本，症状为标；以病之先后言，则先病为本，后病为标；原发病为本，继发病为标；就病位表里言，则脏腑病为本，肌表经络病为标；就本质与现象关系言，则本质是本，现象属标等等。

一般来说，本是疾病的主要矛盾或矛盾的主要方面，起着主导和决定的作用；标是病变的次要矛盾或矛盾的次要方面，处于从属和次要的地位。辨证论治的一个根本原则，就是要抓住疾病的本质，并针对本质进行治疗。例如，马患结症而继发肠胀气时，结症为本，气胀为标；如果病势缓慢，气胀不重，只要破除结症之本，气胀之标也就随之消失。正如《景岳全书·求本论》说：“直取其本，则所生诸病，无不随本皆退”。

但是，在疾病过程中矛盾是错综复杂的，在一定条件下是可以转化的。因此，标和本常有主次轻重的不同，治疗也就相应地有了先后缓急的区分。

► **急则治其标** 指疾病过程中标症紧急，若不及时治疗就会危及患者生命或影响本病治疗时所采取的一种急救治标法。例如，结症继发肠胀气，显然结症是本，胀气是标，但若胀气严重，病势急剧，如不能快速解除，就会危及患者的生命，同时也影响了直肠人手破结，此时的当务之急就应是穿刺放气或用其它办法解除气胀以治标，待气胀缓解后再破结通肠以治本。由此可见，急则治其标仅为权宜急救之法，待危象消除，病势缓解后还必须治本，才能拔除病根。

► **缓则治其本** 指在一般情况下，凡病势缓而不急的，皆需从本论治，即所谓“治病必求于本”，它对指导慢性病的治疗更有意义。如脾虚泄泻之证，若泄泻不甚，无伤津脱液的严重症状，只须健脾补虚，使脾虚之本得治，则泄泻之标自除。

► **标本兼治** 当标病与本病俱重，在时间或条件上又不允许单独治标或单独治本时，应采取标本同治的方法。当然，标本同治，也不是治标与治本不分主次地平均对待，而是仍然要分清主次，有所着重。例如气虚感冒时，先病正气虚为本，后感外邪为标，单纯益气则表邪难去，仅用发汗解表则更伤正气，所以常采用益气为主兼以解表，标本同治的原则。

应当指出，在临床应用时，不能将急则治其标，缓则治其本的原则绝对化，急的时候也未尝不可治本。如亡阳虚脱，急用回阳救逆，就是治本；大出血后，气随血脱之时，急用益气固脱也是治本。同样，缓的时候也不是不可以治标，有时治标反更有利于治本。总之，在辨证论治中，分清疾病的标本缓急，是抓主要矛盾，解决主要问题的一个重要原则。急则先治是基本要求，治病求本才是关键。若标本不明，主次不清，势必影响疗效，甚至延误病机，造成不良后果。

2. 正治与反治

► **正治** 又称逆治，是逆着疾病症状而治的一种治疗法则。逆，是指所采用方药的性质与疾病症状的性质相反。

临床上，大多数疾病的现象与疾病的本质是一致的。如热证表现为热象，寒证表现为寒象，虚证表现为虚象，实证表现为实象。此时，应采用正治法，即采用“热者寒之”、“寒者热之”、“虚者补之”、“实者泻之”的治疗法则。正治含有正规和常规治疗的意思，是临床上常用的治疗方法。

► **反治** 又称从治，是顺从疾病症状而治的一种治疗法则。从，是指所采用方药的性质与疾病症状的性质相同。

临床上，有时会因病情复杂或病势严重，机体不能如常地反映出正邪相争的情况，而出现一些与疾病性质不相符合的假象。如寒证出现热象，热证出现寒象，虚证出现实象，实证出现虚象等。在治疗时，就不能简单地见寒治寒，见热治热，而应透过现象，治其本质。因在此情况下，疾病所表现出的症状与疾病的本质相反，所以采用了和疾病症状性质相同的药物来治疗，但实际上仍是逆着疾病的本质进行治疗。反治法有“热因热用”、“寒因寒用”、“塞因塞用”、“通因通用”等几种不同的具体运用。

热因热用 指用温热性药物治疗具有热象病证的方法。主要适用于阴寒内盛，阳气格拒于外而呈现体表温热，脉大，色红的真寒假热证。因热象是假，而阳虚寒盛才是其本质，故仍以温热药进行治疗。

寒因寒用 指用寒凉性药物治疗具有寒象病证的方法。主要适用于里热极盛，格阴于外，证见四肢厥冷的真热假寒证。因寒象是假，而热盛才是其本质，故仍须用寒凉药物进行治疗。

塞因塞用 指用补塞性药物治疗具有闭塞不通病证的方法。主要适用于真虚假实证。如因中气不足，脾虚不运所致的脘腹胀满，就得用健脾益气，以补开塞的方法来进行治疗。

通因通用 指用通利的药物治疗通泄病证的方法。主要适用于真实假虚证。如由于食积停滞，影响运化所致的腹泻，则不仅不能用止泻药，反而应当用消导泻下药以去其积滞，方能奏效。

从上可以看出，正治法一般适用于病情比较单纯，疾病本质与症状表现相一致的病证；反治法一般适用于病情比较复杂，疾病本质与症状表现不一致的病证。但不管正治、反治，都是紧紧扣住治病求本的根本原则，从疾病的本质来分析，反治法仍不失热以治寒、寒以治热、补以治虚、泻以治实之意。因此，反治法在本质上和正治法是一致的。

此外，还有一种反佐法，也属反治法之范畴。当疾病发展到阴阳格拒的严重阶段而出现假象，或大寒证、大热证进行治疗时，若单纯以热治寒，或以寒治热，往往会发生药物下咽即吐的格拒现象而影响治疗效果。此时，就要用反佐法以起诱导作用，防止疾病对药物的格拒、对抗作用。反佐法的具体运用有两种，一种是药物反佐，就是在临证配方时在大寒剂中佐以少许温热药，或在大热剂中佐以少许寒凉药；另一种是服法反佐，就是热证用寒凉药采取温服法，寒证用温热药采取冷服法。

（三）同治与异治

同治与异治，即异病同治和同病异治。

► **异病同治** 指不同的疾病，由于病机相同或处于同一性质的病变阶段（证候相同），可以采用同一种治法。例如，久泄、久痢、脱肛、阴道脱和子宫脱等病证，凡属气虚下陷者，均可用补中益气的相同方法治疗。又如，在许多不同的传染病过程中，只要出现气分证（大热、大汗、大渴、脉洪大），都可以用清气（清热生津）的方法治疗。

► **同病异治** 指同一种疾病，由于病因、病机以及发展阶段的不同，而采用不同的治法。例如，同为感冒，由于有风寒和风热的不同病因和病机，治疗就有辛温解表和辛凉解表之分。又如，同属外感温热病，由于有卫、气、营、血四个病变阶段（证候不同），治疗也相应地有解表、清气、清营和凉血的不同治法。

（四）三因制宜

三因制宜，包括因时制宜、因地制宜和因畜制宜三个方面。中兽医学认为动物体与外界环境之间有着密切的关系，四时气候、地域环境以及患畜本身的性别、年龄、体质等因素，对于疾病的发生、发展变化与转归，都有着不同程度的影响。因而，在治疗疾病时，就必须

根据这些具体因素，区别对待，采取相应的治疗措施。

► **因时制宜** 就是根据不同季节的气候特点来考虑治疗用药的原则。如春夏季节，气候由温渐热，阳气升发，动物腠理疏松开泄，即使是患外感风寒，也不宜过用辛温发散之品，以免开泄太过，耗伤阳气；而秋冬季节，气候由凉变寒，阴气日增，动物腠理致密，阳气内敛，此时若非大热之证，就当慎用寒凉之品，以防苦寒伤阳。《素问·六气正纪大论篇》说：“用热远热，用温远温，用寒远寒，用凉远凉”就是这个意思。再如，暑邪致病带有明显的季节性，且暑多扶湿，故暑天治病，应注意清暑化湿。

► **因地制宜** 就是根据不同地区的地理环境特点来考虑治疗用药的原则。如南方气候炎热而潮湿，病多湿热或温热，故多用清热化湿之品；北方气候寒冷而干燥，病多风寒或燥证，故常用温热润燥之味。即使是同一种疾病，地域不同，采用的治则可能也不同，如同为感冒，在东南地区，以风热为多，常用辛凉解表之法；而在西北地区，则以风寒居多，常用辛温发汗之法。即使相同的病证，治疗用药也应当考虑不同地域的特点，如外感风寒证，在西北、东北严寒地区，药量可以稍重，而在南方温热地区，药量就应稍轻。

► **因畜制宜** 就是根据动物年龄、性别、体质等不同特点来考虑治疗用药的原则。

年龄 成年动物正气旺盛，体质强健，病多实证，治宜攻邪泻实，药量亦可稍重。老龄动物生机减退，脏腑气血已衰，病多虚证或虚中挟实，治疗时要注意扶正补虚，即令祛邪也勿伤其正。幼龄仔畜生机旺盛，但脏腑娇嫩，气血未充，因而治疗幼仔疾患，忌用峻剂，药量宜轻。此外，幼畜多外感病和胃肠病，故又当重视宣肺散邪和调理脾胃功能。

性别 性别不同，生理、病理特点各异，治疗用药亦各有不同。母畜有经产、妊娠、分娩等特点，治疗时要注意安胎，通经下乳，妊娠禁忌等问题。公畜有精室及性功能等特有病证，治疗多应补肾滋阴。

体质 体质不同，机体的反应性也不相同，病证的属性有别，治法方药也就当有所不同。一般说来，体质强壮者，其病多为实证、热证，其体耐受攻伐，药量稍重亦无妨；体质瘦弱者，其病多为虚证、寒证或虚中挟实，其体不耐克伐，应注意采用温补之剂，即令有邪而挟实，也应攻补兼施。

三因制宜的原则，充分体现了中兽医治病整体观念和在实际应用时的原则性和灵活性。只有把天时气候、地域环境、患畜的年龄性别体质因素，同疾病的病理变化结合起来全面分析，采用适宜的方法，才能取得较好的疗效。

（五）治疗与护养

针药治疗与护理调养，是医治动物疾病不可分割的两个方面。俗话说：“三分治疗，七分护理。”经验证明，对病畜护养的好坏，直接影响治疗效果。《三农记》中指出：“人但知药能治病，而不知调护，无药而治也。”《元亨疗马集·七十二症》中，每症也多有调理一项。例如，提出寒病忌凉，不可寒夜外拴，宜养于暖厩之中；热病忌热，棚内不可过温，宜拴于阴凉之处；伤食者少喂，伤水者少饮，伤热者宜饮凉水，伤冷者宜饮温水；表散之病忌风，

勿拴巷道檐下；四肢拘挛，步行艰难之病，则昼夜放纵；低头难者宜用高槽；肩膊痛者宜用低槽；破伤风患畜，背上宜搭毡毯，养于安静光暗之厩舍，时时给以粒状饲料；患腰瘫腿疾者，必须在卧地多垫软草，不可卧于潮湿之处；患肚痛起卧者，必须专人照料，防止跌滚，凡此种种，都是前人的宝贵经验。说明中兽医对病畜的护养工作向来十分重视，值得我们很好地学习运用。

二 治法

从中兽医学形成和发展的过程来看。治法是在长期临床实践中积累了方药运用经验的基础上，在对动物体生理病理认识的不断丰富、完善过程中，逐步总结而成，是后于方药形成的一种理论。但当治法已由经验上升为理论之后，就成为遣药组方和运用成方的指导原则。例如，某一动物感冒后，经过四诊合参，审证求因，确定其为风寒所致的表寒证后，根据表证当用汗法、治寒当以温法的治疗大法，决定用辛温解表法治疗，选用相应的有效成方加减，或自行选药组成辛温解表剂，如法煎服，以使汗出表解，邪去病愈。否则，辨证与治法不符，组方与治法脱节，必然治疗无效，甚至使病情恶化。由此可见，在临床辨证论治的过程中，辨证的目的在于确定病机，论治的关键在于确立治法，治法是针对病机产生，而方剂必须相应地体现治法。治法是指导遣药组方的原则，方剂是体现和完成治法的主要手段。虽然我们常说“方以药成”，却又首先强调“方从法出，法随证立”，方与法二者之间的关系，是相互为用，密不可分。

除了上述以法组方、以法遣方这两个主要方面以外，方剂和治法的关系，还体现在以法可以类方和以法可以释方两个方面。前者在本教材总论部分方剂的分类中讨论，后者在教材各论方解中体现。上述“以法组方”、“以法遣方”、“以法类方”、“以法释方”这四个方面，就构成了中兽医学历来所强调的“以法统方”的全部内容。

治法，指临证时对某一具体病证所确定的治疗方法，是治则理论在临床中的具体应用。《医学心悟》所说：“论病之源，以内伤外感四字括之。论病之情，以寒、热、虚、实、表、里、阴、阳八字统之。而论治病之方，则以汗、吐、下、和、温、清、补、消八法尽之。盖一法之中，八法备焉，八法之中，百法备焉。” 据此可见，古人将传统中医治疗方法概括为八法，即汗、吐、下、和、温、清、补、消八种药物治疗的基本方法。

（一）汗法 又叫解表法，是运用具有解表发汗作用的药物，以开泄腠理，驱除病邪，解除表证的一种治疗方法。主要用于治疗表证。外邪致病，大多先侵犯肌表，继则由表及里，当病邪在肌表，尚未传里时，应采取发汗解表法，使表邪从汗而解，从而控制疾病的传变，达到早期治疗的目的。由于表证有表寒、表热之分，汗法又分辛温解表和辛凉解表两种。

辛温解表主要由味辛性温的解表药如麻黄、桂枝、紫苏、生姜等组成方剂，适用于表寒证，代表方为麻黄汤、桂枝汤等。

辛凉解表主要由味辛性凉的解表药如薄荷、柴胡、桑叶、菊花等组成方剂，适用于表热证，代表方为银翘散、桑菊饮等。

根据兼证的不同，汗法又有加减之变通。如阳虚者，宜补阳发汗；阴虚者，宜滋阴发汗；兼有湿邪在表的，如风湿证，则应于发汗药中配以祛风除湿药。

（二）吐法 又叫涌吐法或催吐法，是运用具有涌吐性能的药物，使病邪或有毒物质从口中吐出的一种治疗方法。主要适用于误食毒物、痰涎壅盛、食积胃腑等证。代表方为瓜蒂散、盐汤探吐方等。

吐法是一种急救方法，用之得当，收效迅速，用之不当，易伤元气，损伤胃脘。因此，如非急证，只是一般性的食积、痰壅，尽可能用导滞、化痰的方法，特别是马属动物，由于生理特点不易呕吐，更不适用吐法。

（三）下法 又叫攻下法或泻下法，是运用具有泻下通便作用的药物，以攻逐邪实，达到排除体内积滞和积水，以及解除实热壅结的一种治疗方法。主要适用于里实证，凡胃肠燥结、停水、虫积、实热等证，均可以用本法治疗。根据病情的缓急和患病动物体质的强弱，下法通常分攻下、润下和逐水三类。

攻下法也叫峻下法，是使用泻下作用猛烈的药物以泻火、攻逐胃肠内积滞的一种方法。适用于膘肥体壮，病情紧急，粪便秘结，腹痛起卧，脉洪大有力的病畜。代表方为大承气汤。

润下法也叫缓下法，是使用泻下作用较缓和的药物，治疗年老、体弱、久病、产后气血双亏所致津枯肠燥便秘的一种治疗方法。代表方为当归苁蓉汤。

逐水法是使用具有攻逐水湿功能的药物，治疗水饮聚积的实证如胸水、腹水、粪尿不通等的一种治疗方法。代表方是大戟散。

（四）和法 又叫和解法，是运用具有疏通、和解作用的药物，以祛除病邪，扶助正气和调整脏腑间协调关系的一种治疗方法。主要适用于病邪既不在表，又未入里的半表半里证和脏腑气血不和的病证（如肝脾不和）。前者的代表方为小柴胡汤，后者为逍遥散、痛泄要方。

（五）温法 又叫祛寒法或温寒法，是运用具有温热性质的药物，促进和提高机体的功能活动，以祛除体内寒邪，补益阳气的一种治疗方法。主要适用于里寒证或里虚证。根据“寒者热之”的治疗原则，按照寒邪所在的部位及其程度的不同，温法又可分为回阳救逆，温中散寒，温经散寒三种。

回阳救逆 适用于肾阳虚衰，阴寒内盛，阳虚欲脱的病证。代表方为四逆汤。

温中散寒 适用于脾胃阳虚所致之中焦虚寒证。代表方为理中汤。

温经散寒 适用于寒气偏盛，气血凝滞，经络不通，关节活动不利的痹证。代表方为黄芪桂枝五物汤。

（六）清法 又叫清热法，是运用具有寒凉性质的药物，清除体内热邪的一种治疗方法。主要适用于里热证。临床上常把清法分为清热泻火、清热解毒、清热凉血、清热燥湿、清热解暑几种。

清热泻火 适用于热在气分的里热证。由于热邪所在脏腑的不同，选择的方剂也不同，如白虎汤、麻杏甘石汤、龙胆泻肝汤、清胃散等。

清热解毒 适用于热毒亢盛所引起的病证。如疮黄肿毒等。代表方有消黄散、黄连解毒汤等。

清热凉血 适用于温热病邪入于营分、血分的病证。代表方有清营汤、犀角地黄汤等。

清热燥湿 适用于湿热证。根据湿热所在的脏腑不同，选用的方剂也不同，如茵陈蒿汤、白头翁汤、八正散等。

清热解暑 适用于暑热证。代表方为香薷散。

（七）补法 又叫补虚法或补益法，是运用具有营养作用的药物，对畜体阴阳气血不足进行补益的一种治疗方法。适用于一切虚证。因临床上虚证有气虚、血虚、阴虚、阳虚的不同，故补法也就分为了补气、养血、滋阴、助阳四种。

补气适用于气虚证，是运用补气的药物如党参、黄芪、白术等以增强脏腑之气的方法。代表方有四君子汤、参苓白术散、补中益气汤等。因气能生血，故在以补血法治疗血虚时，也应注意补气以生血。

补血适用于血虚证，是运用补血的药物如当归、白芍、阿胶等以促进血液化生的方法。代表方为四物汤、当归补血汤等。

滋阴适用于阴虚证，是运用补阴的药物如熟地、枸杞子、麦冬等以补阴精或增津液的方法。代表方为六味地黄丸。

助阳适用于阳虚证，是运用补阳的药物如巴戟天、淫羊藿、肉苁蓉等以壮脾肾之阳的方法。代表方为肾气散。

气血阴阳是相互联系的，气虚常兼血虚，血虚常导致阴虚，气虚亦常导致阳虚，所以在使用补法时，必须针对病情，全面考虑，灵活运用，才能取得较好的疗效。

脾胃乃后天之本，水谷之海，气血生化之源，所以补气血应以补中焦脾胃为主；肾与命门为水火之脏，是真阴真阳化生之源，所以补阴阳应以补下焦肾与命门为主。

通常情况下，补不宜急，“虚则缓补”。但在特殊情况下，如大出血引起的虚脱症，必须用急补法。

（八）消法 又叫消导法或消散法，是运用具有消散破积作用的药物，以达到消散体内气滞、血瘀、食积等的一种治疗方法。临床上常用的有行气解郁、活血化瘀、消食导滞三种。

行气解郁适用于气滞证。常用方剂如越鞠丸等。

活血化瘀适用于瘀血停滞的瘀血证。常用方剂如桃红四物汤等。

消食导滞适用于胃肠食积，常用方剂如曲蘖散等。

上述八种治法，适用于表里、寒热、虚实等不同的证候。对于多数疾病而言，病情往往比较复杂，单一的治法一般不能满足治疗需要，这种情况下，常需要数种治法配合使用，才能治无遗邪，照顾全局，所以虽为八法，配合运用后则变化多端。即“一法之中，八法备焉，八法之中，百法备焉。”因此，临证处方，必须针对具体病证，灵活运用八法，使之切合病情，方能收到满意的疗效。

第三节 中药的配伍

一、配伍的概念

临床上对于一些病因单一、症状简单、病情轻微的疾病，可以用单味药物进行治疗，不需要药物的搭配。但大多数情况下，由于单味药物的局限性和疾病的复杂性，以及其它方面的要求应将多味中药配合在一起使用，即存在中药的配伍。

配伍是指根据动物病情的需要和药物的性能特点，有目的地将两味及两味以上的药物配合在一起使用。这是中兽医用药的基本形式。

二、配伍七情

前人把单味药的应用同药与药之间的配伍关系称为药物的“七情”。“七情”的提法首见于《神农本草经》。其序例云：“药……有单行者，有相须者，有相使者，有相畏者，有相恶者，有相反者，有相杀者。凡此七情，合和视之。”其中首先谈到“单行”。单行就是指单味药治病。病情比较单纯选用一味针对性较强的药物即能获得疗效，如清金散单用黄芩治轻度的肺热咳血；现代单用鹤草芽驱除绦虫，以及许多行之有效的“单方”等。它符合简便廉验的要求，便于使用和推广。但若病情较重，或病情比较复杂，单味药力量有限，且难全面兼顾治疗要求；有的药物具有毒副作用，单味应用难以避免不良反应，因此往往需要同时使用两种以上的药物。药物配合使用，药与药之间会发生某些相互作用，如有的能增强或降低原有药效，有的能抑制或消除毒副作用，有的则能产生或增强毒副反应。因此，在使用两味以上药物时，必须有所选择，这就提出了药物的配伍关系问题。前人总结的“七情”之中，除单行者外，其余六个方面都是讲配伍关系，现分述如下。

1. 相须 即性能功效相类似的药物配合应用，可以增强原有疗效。如石膏和知母配合，能明显增强清热泻火的治疗效果；大黄与芒硝配合，能明显增强攻下泻热的治疗效果；全蝎与蜈蚣同用，能明显增强止痉定搐的作用。

2. 相使 即在性能功效方面有某些共性，或性能功效虽不相同，但是治疗目的一致的药物配合应用，而以一种药为主，另一种为辅，能提高主要疗效。如补气利水的黄芪与利水健脾的茯苓配合时，茯苓能提高补气药黄芪的利尿功效；黄连配木香治湿热泄痢，腹痛里急，以黄连清热燥湿、解毒止痢为主，木香调中宣滞、行气止痛，可增强黄连治疗湿热泄痢的效果；雷丸驱虫，配伍泻下通便的大黄，可增强雷丸的驱虫效果。

3. 相畏 即一种药物的毒性反应或副作用，能被另一种药物减轻或消除。如生半夏和生南星的毒性或副作用能被生姜减轻或消除，所以说生半夏和生南星畏生姜。

4. 相杀 即一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性或副作用。如生姜能减轻或消除生半夏和生南星的毒性或副作用，所以说生姜杀生半夏和生南星的毒。由此可知，相畏、相杀实际上是同一配伍关系的两种说法。

5. 相恶 既两药合用，一种药物能使另一种药物原有的功效降低，甚至丧失。如人参恶莱菔子，因莱菔子能消弱人参的补气作用。

相恶只是两药的某些方面或某几方面的功效减弱或丧失，并非二药的功效全部相恶。如生姜恶黄芩，只是生姜的温肺、温胃功效与黄芩的清肺、清胃功效互相牵制而疗效降低，但生姜还能开胃治不欲饮食并喜呕之证，黄芩尚可清泄少阳以除热邪，在这些方面，两药并不一定相恶。

6. 相反 既两种药物合用，能产生或增强毒性反应或副作用。如甘草反甘遂，乌头反半夏等。古人将其总结为“十八反”、“十九畏”。

李时珍在《本草纲目》中对“药性七情”的论述“独行者，单方不用辅也；相须者，同类不可离也；相使者，我之佐使也；相畏者，受彼之制也；相杀者，制彼之毒也；相恶者，夺我之能也；相反者，两不相合也。凡此七情，合而视之，当用相须相使者良，勿用相恶相反者。若有毒制宜，可用相畏相杀者，不尔不合用也”。

三、方剂中配伍的目的

药物的功用各有所长，也各有所短，只有通过合理的组织，调其偏性，制其毒性，增强或改变原有功能。消除或缓解其对动物机体的不良因素，发挥其相辅相成或相反相成的综合作用，使各具特性的群药组合成一个新的有机整体，才能符合辨证论治的要求。这种运用药物的组合过程，中兽医学称之为“配伍”。“配”，有组织、搭配之义；“伍”，有队伍、序列之义。徐灵胎说：“药有个性之专长，方有合群之妙用”，“方之与药，似合而实离也，得天地之气，成一物之性，各有功能，可以变易气血，以除疾病，此药之力也。然草木之性与入殊体，入人肠胃，何以能如人所欲，以致其效。圣人为之制方，以调剂之，或用以专攻，或用以兼治，或以相辅者，或以相反者，或以相用者，或以相制者。故方之既成，能使药各全其性，亦能使药各失其性。操纵之法，有大权焉，以方之妙也。”（《医学源流论·方药离合论》）在此，徐氏明确指出了在组药成方的过程中，必须重视“配伍”这个环节。

我们知道，大多数单味中药都具有多功用的特点，在治疗疾病时往往需要发挥其中部分功用；况且，药物既有其治疗作用的一面，也有因其药性偏胜而致不同程度毒、副作用的一面。这就要求我们熟悉并把握其药物功用（包括毒副作用）发挥方向的控制因素、控制方法及运用技巧。这些方法和技巧，在古今医家以小生产方式积累的理论和实践总结中有着丰富的内容。因此，正确、全面地学习和掌握有关配伍知识及技能，掌握历代名方中常用的配伍组合规律，对于今后正确地遣药组方、灵活运用成方、减少临床运用方药的随意性、提高临床动手能力、保证临床疗效等，均有着重要的意义。

运用配伍方法遣药组方，从总体而言，其目的不外增效、减毒两个方面。“用药有利有弊，用方有利无弊”，如何充分发挥药物对治疗疾病有“利”的一面，同时又能控制、减少甚至消除药物对人体有“弊”的一面，这就是方剂学在运用配伍手段时最根本的目的。一般来说，药物通过配伍，可以起到下述作用：

（一）增强药力 功用相近的药物配伍，能增强治疗作用，这种配伍方法在组方运用中较为普遍。如荆芥、防风同用以疏风解表，薄荷、茶叶同用以清利头目，党参、黄芪同用以健脾益气，桃仁、红花同用以活血祛瘀等。

（二）产生协同作用 药物之间在某些方面具有一定的协同作用，常相互需求而增强某疗效。如麻黄和桂枝相配，通过“开腠”和“解肌”协同，比单用麻黄或桂枝方剂的发汗；量明显增强；附子和干姜相配，俗称“附子无姜不热”，体现了先后天脾肾阳气同温，“走不守”和“守而不走”协同，大大提高温阳祛寒作用。

（三）控制多功用单味中药的发挥方向 这是在方剂配伍中十分重要的一个方面。如桂枝具有解表散寒、调和营卫、温经止痛、温经活血、温阳化气、平冲降逆等多种功用，但其具体的功用发挥方向往往受复方中包括配伍环境在内的诸多因素所控制。如前所述，在发汗解表方面，多和麻黄相配；温经止痛方面，往往和细辛相配；调和营卫、阴阳方面，又须与芍药相配；平冲降逆功用，则多与茯苓、甘草相配；温经活血功用，常与丹皮、赤芍相配；温阳化气功用，常须与茯苓、白术相配。又如黄柏具有清热泻火、清热燥湿、清虚热、降虚火等作用，但往往以其分别配伍黄芩、黄连、苍术、知母为前提。川芎具有祛风止痛、活血行气的作用，但祛风止痛多与羌活、细辛、白芷等引经药相配，活血调经多与当归、芍药同用，而行气解郁则又多与香附、苍术相伍。再如柴胡有疏肝理气、升举阳气、发表退热的作用，但调肝多配芍药，升阳多伍升麻，和解少阳则须配黄芩。由此可见，通过配伍，可以控制药物功用的发挥方向，从而减少临床运用方药的随意性。

（四）扩大治疗范围、适应复杂病情 中医药学在长期的发展过程中，经历代医家反复；践总结，产生了不少针对基础病机的基础方剂，如四君子汤、四物汤、二陈汤、平胃散、四逆散等。在临床上通过随证配伍，可以使这些基础方剂不断扩大治疗范围。如四君子汤具有益气健脾的功用，是主治食少便溏、面色萎黄、声低息短、倦怠乏力、脉来虚软等脾胃气虚证的基础方。若由脾虚而生湿，阻滞气机，以致胸脘痞闷不舒，则可相应配伍陈皮，即异功散，功能益气健脾、行气化滞；若脾虚痰湿停滞，出现恶心呕吐、胸脘痞闷、咳嗽痰多稀白，则再配半夏人方，即六君子汤，功能重在健脾气、化痰湿；若在脾胃气虚基础上，因痰阻气滞较重而见纳呆、嗳气、脘腹胀满或疼痛、呕吐泄泻等，则可配伍木香、砂仁，即香砂六君子汤，功能益气健脾、行气化痰。由此可见，通过随证配伍，则可达到不断扩大治疗范围的目的。

（五）控制药物的毒副作用 “是药三分毒”。从中国医学史的相关资料表明，上古时期人们对药物的毒副作用是十分畏惧的，从古代将中药统称为“毒药”，以及“神农尝百草一日而遇七十毒”的传说，到“服药不瞑眩，则厥疾不瘥”的认识，以及臣子为国君试药、儿子为父亲试药的记载，反映了当时运用药物能产生毒副作用的普遍性。但随着中医学的发展和药物运用经验的积累，尤其是方剂学的发展，探索和掌握了控制毒副作用的方法，为后世方药的广泛运用和疗效的提高创造了条件。至西汉后期时，对中药的称谓，由“毒药”改

称为“本草”，这本身就是中医药学划时代进步的标志。这与方剂学中运用配伍方法的成果是分不开的。

通过配伍控制毒副作用，主要反映在两个方面。一是“七情”中“相杀”和“相畏”关系的运用，即一种药物能减轻另一种药物的毒副作用，如生姜能减轻和消除半夏的毒性，砂仁能减轻熟地滋腻碍脾的副作用等；二是多味功用相近药物同时配伍的运用，这种方式既可利用相近功用药物的协同作用，又能有效减轻毒副作用的发生。这是因为功用相近的多味药物同用，可以减少单味药物的用量，而多味药物之间，其副作用的发挥方向往往不尽一致。

应当指出，控制毒副作用的方法，除了上述两个方面外，中医药学中还包含着丰富的方法和内容。如因时、因地、因人制宜，恰如其分的用量控制，特定的炮制方法，道地药材的选择，具体的煎药、服药方法以及恰当的剂型要求等。

四、配伍与方剂的关系

从单味药到配伍应用，是通过很长的实践与认识过程逐渐积累丰富起来的。药物按一定法度加以组合，并确定一定的分量比例，制成适当剂型，即为方剂。方剂是药物配伍的发展，也是药物配伍应用的较高形式。

方剂是一个独立的整体，它体现着对某一病证辨证论治的基本思想，涉及到遣药、调剂、应用等各个环节。而配伍更多强调组方时所选用的两味或多味药物之间的关系。方剂与配伍的关系是整体与局部的关系。方剂包含有配伍，方剂是配伍的发展。配伍是方剂的组成单元，是联系方剂中各位药物的理论基础。好的方剂使配伍优势得到最大的发挥，好的配伍使方剂更加精简而有效。

五、配伍禁忌与妊娠禁忌

药物具有治疗作用和毒副作用两重性，利用前者、避免后者是选药组方的基本原则。后者就是用药禁忌的问题，包括配伍禁忌、妊娠禁忌、服药时的饮食禁忌等内容。

（一）配伍禁忌 在临证用药处方时，为了安全起见，有些药物或配伍关系应当慎用或禁止使用。在长期的医疗实践中，古人积累了许多有关配伍禁忌的经验，主要有“十八反”、“十九畏”等。

十八反：根据历来古文献记载，配伍应用可能对动物产生毒害作用的药物有 18 种，故名“十八反”。即：甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白芍、白及；藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。《元亨疗马集》中有十八反歌诀：“本草明言十八反，逐目从头说与君。人参芍药与沙参，细辛玄参及紫参，苦参丹参并前药，一见藜芦便杀人；白及白芍并半夏，瓜蒌贝母五般真，莫见乌头怕乌啄，逢之一反疾如神；大戟芫花并海藻，甘遂以上反甘草，若还吐逆及翻肠，寻常犯之都不好。蜜蜡莫与葱相睹，石决明休见云母，藜芦莫使酒来浸，人若犯之都是死。”还有一个比较简单的歌诀：“本草明言十八反，半蒌贝芍及攻乌，藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦。”更便于诵读记忆。

十九畏：相畏药物历来认为有 19 种，配合在一起应用时，一种药物能抑制另一种药物

的毒性或烈性，或降低另一药物的功效。习惯上称为“十九畏”。即：硫磺畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛子，丁香畏郁金，川乌、草乌畏犀角，牙硝畏荆三棱，官桂畏赤石脂，人参畏五灵脂。《元亨疗马集》十九畏歌云：“硫磺原是火中精，朴硝一见便相争；水银莫与砒霜见；狼毒最怕密陀僧；巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情；丁香莫与郁金见；牙硝难合荆三棱；川乌草乌不顺犀；人参又忌五灵脂；官桂善能调冷气，石脂相见便蹉跎。大凡修合看顺逆，炮煅炙煨要精微”。

上述十八反及十九畏，一般均作为处方用药的配伍禁忌。据研究，当甘草与甘遂合用时，是否有毒与二者的用量配比有关。甘草的用量若与甘遂相等或大于甘遂，则毒性较大。细辛和藜芦配伍，可导致实验动物中毒死亡；而贝母和半夏分别与乌头配伍，则未见明显毒性增强。在古今方剂中，也有一些应用十八反或十九畏的例子。但一般说来，在临证处方时，如果没有充分的把握，相反及相畏的药物还是应该避免在方剂中配伍，以免导致不良后果。

（二） 妊娠禁忌 在动物妊娠期间，为了保护胎儿的正常发育和母畜的健康，应当禁用或慎用具有堕胎作用或对胎儿有损害作用的药物。属于禁用的多为毒性较大或药性峻烈的药物，如巴豆、水银、大戟、芫花、商陆、牵牛子、斑蝥、三棱、莪术、虻虫、水蛭、蜈蚣、麝香等。属于慎用的药物主要包括祛瘀通经、行气破滞、辛热、滑利等方面的中药，如桃仁、红花、牛膝、丹皮、附子、乌头、干姜、肉桂、瞿麦、芒硝、天南星等。禁用的药物一般不可配入处方，慎用的药物有时可根据病情需要谨慎应用。《元亨疗马集》中载有妊娠禁忌歌：“螾斑水蛭及虻虫，乌头附子配天雄，野葛水银并巴豆，牛膝薏苡与蜈蚣，三棱代赭芫花麝，大戟蛇蛻黄雌雄，牙硝芒硝牡丹桂，槐花牵牛皂角同，半夏南星与通草，瞿麦干姜桃仁通，硃砂干漆蟹爪甲，地胆茅根都不中。”可供参考。

六、药对

药对即指古人在长期的临床实践中总结出来的两味药物的固定搭配。它历经无数次的反复实践，证明有良好的疗效。所以能传之后世，久而不绝，成为现代组方的重要基础。两味药物依据配伍的相须、相使关系，形成一个相对固定的搭配，在组方时往往同时出现在处方中，相互协同，充分发挥治疗效果。

古人常用药对较多，在临床组方时应该学习使用，如按相须构成的药对桃仁、红花，活血调经；乳香、没药，化淤止痛；石膏、知母，清泻阳明；按相使构成的药对如苍术、厚朴，燥湿行气；半夏、陈皮，和中化痰；黄芪、当归，益气补血。药对中还有一寒一热如黄连、吴茱萸，一上一下如防风、防己，一散一敛如细辛、五味子，一走一守如大黄、黄连，一气一血如杏仁、桃仁等特殊搭配关系，有的是性能相反，有的是趋向相背，但同用确能提高疗效，亦属相使范围。

药对，是通过历代医药先贤在长期的临床实践中总结出来的一支中药奇葩。本书在附录中收载部分常用药对，可供组方是参考使用。

第四节 兽医临床实践中方剂的来源

兽医临床实践中，使用方剂多见于两种情况，其一是自拟处方，即根据辨证论治确定治法后，根据组方原则拟定一个处方，这需要大量的临床实践锻炼和丰富的临床组方经验；其二是使用成方，成方是历代兽医的经验结晶，包含着各种中兽医治疗思想和用药技巧，只要合理选用，随证加减，对于初学者或刚刚走向工作岗位的年轻兽医比较容易做到。一些兽医工作者正在积极探索和研究电脑处方，这一组方方式要在临床实践中应用，还需要相当长的时间。

第五节 方剂的命名和分类

方剂的命名和分类，也是中兽医方剂学的一个重要内容。研究和学习它，可以有助于我们对方剂的记忆、理解和应用。

一、命名

许多经典方或成方都有一个方剂名称。一个好的方剂名称，不仅只是方剂的代号，而且可集中反映出方剂的某些内涵，如方剂的主要组成、剂型、功能或主治等。方剂命名的方法有多种：有根据药味组成命名的；有根据功能命名的；有根据主治命名的；也有将两种或多种含义结合起来命名的。其中，以根据药味组成命名和根据功能命名的最常见。现分述如下。

根据药味组成命名。其中，有些方剂的命名概括了方剂的所有药味，如麻黄杏仁甘草石膏汤（简称麻杏甘石汤）、归芪益母汤、枳术丸等；但大多数方剂的命名只反映出一味或几味药，如独活寄生汤、参苓白术散、桂心散、茴香散、橘皮散等；有的则只以全方药味数命名，如二陈汤、三圣散、四贤散、八正散、十黑散等；有的命名则将主要药味名和全方药味数结合起来命名，如四苓散、五苓散、六味地黄丸等。

根据功能命名。其中，有的将功能直接表达出来，如消黄散、清肺散、定痛散、补中益气汤、肥猪散、胃肠活等；有的则采用比喻、形容，甚至夸张词汇，如玉女煎、阳和汤，白虎汤、大青龙汤、玉屏风散等。

根据主治命名。七结散、止咳散、定喘散、肝蛭散、拨云散、烫火散等。

双关含义或多种含义结合命名。如决明散就是主要药味和功能双关；黄连解毒汤、百合固金汤、豆蔻止泻饼、枳实破结散、荆防败毒散、羌活胜湿汤、苏子降气汤等，既点出了主药，又表述了功能；五虎追风散、九龙转江散、十全大补汤、截疟七宝饮等，既指出功能，又标明全方药味数；而跛行镇痛散、和胃消食汤、身痛逐瘀汤等，则体现了功能和主治两方面的含义。

此外，还有其它一些命名形式，一捻金、失笑散、无失丹、马价丸、鸡乐、禽宁散等，分别体现出用量、功效、用药对象等方面的含义。

二、分类

科学明了的方剂分类,对学习和运用方剂很有好处。最早的方剂分类见于《内经》,以病情轻重、病位上下、病势缓急、药味奇偶等为依据,将方剂分为大、小、缓、急、奇、偶、复七类。唐代陈藏器在《本草拾遗》中,将方剂归纳为宣、通、补、泄、轻、重、滑、涩、燥、湿十剂,即:宣可去壅,通行滞,补可扶弱,泄可去闭,轻可去实,重可镇怯,滑可去著,涩可固脱,燥可去湿,湿可润燥。以后又逐步增加,成为十二剂(即十剂加寒、热两剂)、十四剂(再加升、降两剂),以至二十四剂(宣、通、补、泄、轻、重、滑、涩、燥、湿、调、和、解、利、寒、温、暑、火、平、奇、安、缓、淡、清)。明代张景岳认为,“大都方宜从简”。因此,他把方剂的分类方法简化为八阵(补、和、攻、散、寒、热、固、因),即补其不足,调和偏胜,攻其有余,散其外邪,寒凉清热,温热散寒,固其滑脱,因症列方。

清代以后,方剂的分类更加通俗化和实用化。清代汪昂的《医方集解》根据功效将方剂分为补养、发表、涌吐、攻里、表里、和解、理气、理血、祛风、祛寒、清暑、利湿、润燥、泻火、除痰、消导、收涩、杀虫、明目、痈疡、经产、救急等 22 类。程锺龄在《医学心悟》中,则根据八纲提出八法(汗,吐,下,和,温、清、补、消),以概括方剂分类。

在现存中兽医古籍中,多根据脏腑或主治对方剂进行分类。如《安骥药方》分治肺怯病、治慢肺病、治肺病、治膈前痛、治砭喘、治通心经、治热病、治渴、治口疮,治咽喉、治眼、治中风、治腰胯痛、治脾病、治小肠、治气病、治溲、敷贴、炫药、治疮、治瘰,治蹄病、治杂病、治母马方等 24 类;《蕃牧纂验方》分治心部、治肝部、治脾部、治肺部、治肾部、杂治部等;《元亨疗马集》中的“经验良方”分治疮黄、治疗毒、治砭嗽、治起卧、治脏结、治咽喉、治肝部及眼目、治点痛、治心部、治脾部、治肺部、治肾部、杂治部等 13 类。

第三章 方剂的组成

第一节 概述

临床上,每位医者在开具处方时都应有清晰的思路 and 具体步骤。开具一个处方,其前后贯穿了中兽医临床实践的各个环节,具体步骤为运用各种诊断手段,收集疾病的症状或信息;在中兽医学基础理论指导下运用辨证论治方法对上述收集到的疾病或信息进行分析、归纳、总结,最后得出“证”;在中兽医学治则治法指导下对上述“证”制定具体的治法;以治法为依据开始组方;组方的层次结构以传统“君、臣、佐、使”为原则和顺序;方剂中君药是必须的,其他层次结构都根据前面已用药物决定需要与否。对每一层次选择药物的思路:首先在选择药物时明确使用的剂型、途径和对象,因为动物不同于人,当剂型、所选药物有怪味等问题、用药途径不适合用药对象时,即使再经典的处方也难以用于动物来达到治病目的。

在具体选用中药时,充分利用经典药对;充分利用相须、相使的配伍关系;在已经选择了有毒药物时,充分利用相畏、相杀的配伍关系来克制药物的毒副作用;选药配伍过程中杜绝相恶、相反配伍关系出现在处方中;选药结束后检查全方是否涉及“十八反”、“十九畏”“妊娠禁忌”之配伍用药,如果有,则应调整替换。确定方剂中每味中药的用量,调整比例分量。注明使用剂型、使用方法、使用时限、服药禁忌。最后即依方遣药,制剂使用,观察疗效,总结提高。

第二节 组方的依据

组方的依据即立法则,就是拟定或组成方剂所依据的治疗大法或原则。方剂是中兽医学的重要组成部分,它是中兽医理论与实践的结合点,只有在辨证立法的基础上才能合理运用。方从属于治法,治法是处方的依据。例如治疗冷肠泄泻,根据辨证确立暖肠利水之法,处方用药就要以此为依据,既可以选用桂心散加减,也可以在五苓散的基础上化裁,或选用其它方剂。但无论使用何方,都不能违背暖肠利水的治法。所以,在治疗疾病时,“方”可以不定,而“法”必须确定。只有这样,才能使治法落实到处方上,达到合理有效的治疗目的。即所谓“方从法立,以法统方”。

临床实践中,不论自拟处方、选用成方,甚或电脑处方,都必须遵循“方从法立,以法统方”组方思路。

第三节 方剂的基本构成

除单方外,方剂一般均由若干味药物组成。组成一个方剂,不是把药物进行简单地堆砌,也不是单纯地将药效相加,而是根据病情需要,在辨证立法的基础上,按照一定的组织原则,选择适当的药物组合而成。在构成方剂时,要做到把握主证,抓住病因,同时兼顾次要证候和协调药物之间的各种关系。因此我们在组方时在辨证立法的指导下,应先针对病因和主证选药,再针对次要证候选药,其次选用一些起协调关系的药物。传统中兽医将此组方思路概括为组方的君、臣、佐、使。它概括了方剂的结构和药物配伍的主从关系,也是自拟处方的基本思路和基本原则。《黄帝内经·素问》中说:“主病之谓君,佐君之谓臣,应臣之谓使。”

君药:是针对病因或主证起主要治疗作用的药物,又称主药。

臣药:是辅助君药,以加强治疗作用的药物,又称辅药。

佐药:有三方面的作用,一是用于治疗兼证或次要证候;二是制约君药的毒性或烈性。即“因主药之偏而为监制之用”的意思;三是反佐,用于因病势拒药须加以从治者。即“因病气之甚而为从治之用”,如在温热剂中加入少量寒凉药,或于寒凉剂中加入少许温热药。以消除病势拒药“格拒不纳”的现象。

使药:指方中的引经药,或协调、缓和药性的药物。

以主治风寒表实证的麻黄汤为例，方中麻黄辛温发汗，解表散寒，为君药；桂枝辛温通阳以助麻黄发汗散寒，为臣药；杏仁降泄肺气以助麻黄平喘，为佐药；甘草调和诸药，为使药。

一般来说，君药用量多，药力大，其它药的用量和药力则相对较小。甚至有人认为，药量的多寡是区分君、臣、佐、使的主要依据。如李东垣在《脾胃论》中说：“君药分量最多，臣药次之，佐药又次之，不可令臣过于君。君臣有序，相互宣摄，则可以御邪除病矣。”

至于一个方剂中，君、臣、佐、使各药药味的多少，《黄帝内经·素问》中说：“君一臣二，制之小也；君一臣三佐五，制之中也；君一臣三佐九，制之大也。”但并非定数，应根据辨证立法的需要而灵活配伍。

组方时君臣佐使的层次框架，是为了使处方者在组方时注意药物的配伍和主次关系，并非死板格式。有些方剂，若所需药味很少，其中的君药或臣药本身可兼有佐使作用，则不需再另配伍佐使药。有些方剂，根据病情需要，只须区分药味的主次即可，不必都按君臣佐使的结构排列。如二妙散（苍术、黄柏）只有两味药，独参汤只有一味药。

在分析成方时也应该注意，不要局限于用君臣佐使的框架去分析。有些处方用这种分析方法不一定符合组方者最初的思路。另外也应该注意对于同一方剂中一些药物可以看作不同的角色，或君，或臣，或佐，或使。

第四节 成方的使用变化

在临证实践中，往往应用已有成方，但无论古方今方，常常不能一成不变地原方照用，而应根据病情轻重缓急，以及动物种类、体质、年龄等的不同，灵活化裁，加减应用，只有这样，才能做到“师其法而不泥其方”。正如《医学源流论》中所说：“按病用药，药虽切中，而立方无法，谓之有药无方；或守一方以治病，方虽良善，而其有一二味与病不相关者，谓之有方无药。”又说：“欲用古方，必先审病者所患之症，悉与古方前所列之症皆合，更与方中所用之药无一不与所观之症相合，然后施用。否则必须加减。无可加减，则另择一方。”方剂的加减变化主要包括药味加减、用量增损、方剂合并、剂型变化等几种方式。

（一）药味增减的变化

指在主证未变，兼证不同的情况下，方中主药仍然不变，但根据病情，适当增添或减去一些次要药味，也称随证加减。如郁金散是治疗马肠黄的基础方，临床上常根据具体病情加减使用。若热甚，宜减去原方中的诃子，以免湿热滞留，加金银花、连翘，以增强清热解毒之功；若腹痛重，加乳香、没药、延胡索，以活血止痛；若水泻不止，则去原方中的大黄，加猪苓、茯苓、泽泻、乌梅，以增强利水止泻的功能。若主证已变，则应重新立法组方。

（二）药物配伍的变化

指方剂中主药不变，而改变与之相配伍的药物。其功能和主治也相应地发生变化。以麻

黄为例，配桂枝，组成麻黄汤，能发汗解表，主治风寒表实证；若配石膏，组成麻杏甘石汤，则由辛温散寒之剂变为辛凉清热之剂，解表清里，主治表邪未解、里热已炽之证。

（三）药量增减的变化

指方中的药物不变，只增减药物的用量，可以改变方剂的药力或治疗范围，甚至也可改变方剂的功能和主治。如治疗肺热咳喘的麻杏甘石汤，若麻黄用量小而石膏用量大时，方剂的功能重在清泄肺中郁热，宜用于身热有汗者；若增加麻黄用量而减少石膏用量，则方剂的功能重在发汗解表，宜用于身热无汗者。又如小承气汤和厚朴三物汤，同是由大黄、枳实、厚朴三味药物组成，但方剂中药物之间的比例不同，功能和主治也有差异。小承气汤中重用大黄，功能泻热通便，主治阳明腑实证；厚朴三物汤重用厚朴，功能行气除满，主治气滞腹胀。

（四）数方合并

当病情复杂，主、兼各证均有其代表性方剂时，可将两个或两个以上的方剂合并成一个方使用，以扩大方剂的功能，增强疗效。如四君子汤补气，四物汤补血，由两方合并而成的八珍汤则是气血双补之剂。又如平胃散燥湿运脾，五苓散健脾利水，由两方合并而成的胃苓汤则具健脾燥湿和利水止泻之功，用于治疗泄泻，效果更好。再如在卫气营血辨证中，卫气同病可用银翘散合白虎汤加减；营卫合邪可用银翘散合清营汤加减；气营同病可用白虎汤合清营汤加减。

（五）剂型的变化

同一方剂，由于剂型不同，功效也有变化。一般注射剂、汤剂和散剂作用较快，药力较峻，适用于病情较重或较急者；丸剂作用较慢，药力较缓，适用于病情较轻或较缓者。

（六）药物的替代

一般来说，性味功效相近的药物可以相互代替。这对于来源稀少、价格昂贵，或一时紧缺的药物是十分必要的措施。如以黄芩、黄柏代替川黄连，以党参代替人参，水牛角代替犀角，山羊角代替羚羊角，珍珠母代替珍珠，草红花代替藏红花，乳香、没药代替血竭，人工牛黄代替天然牛黄等等。在选择代用药物时，应注意将用量做相应的改变，力薄者量宜大，力厚者量宜少。某些药效广泛的药物，可选用几种不同的药物替代。如山萸肉补肝益肾，敛汗涩精，可用女贞子、枸杞子或菟丝子代之以补肝益肾，金樱子或五味子代之以敛汗涩精。

以上方剂的变化可以单独应用，也可以合并应用。遣药组方既有严格的原则性，又有极大的灵活性。只有掌握了这些特点，才能制裁随心，用利除弊，以应临床实践中的无穷之变。

第四章 方剂的调剂

第一节 概述

中药调剂系指调剂人员根据医师处方，按照配方程序和原则，及时、准确地调配和发售药剂的一项操作技术。中药调剂是中医药学的重要组成部分，在古籍中“合药分剂”、“合和”、“合剂”等均属中药调剂范畴。

中药调剂工作可分为中药饮片调剂及中成药调剂。中药调剂具有临时调配的特点，并且所涉及的内容广泛，它与中兽医学基础、兽医中药学、中兽医方剂学、中药鉴定学、中药炮制学、中药制剂学等学科关系极为密切。中药调剂质量的好坏，直接影响着治疗效果和用药安全，因此，调剂人员应掌握有关中兽医处方的知识，调剂工作制度，中药斗谱排列原则及中药的配伍变化等基本知识。

第二节 处方

一、处方的概念与种类

(一) 处方的概念

处方是医疗和药剂配制的重要书面文件。狭义的处方是指兽医师诊断患畜病情后，为其预防和治疗需要而写给药房配发药剂的文件。广义地讲，凡制备任何一种药剂的书面文件，均可称为处方。

狭义的处方又称医师处方，包括临床兽医师开写的中药处方和西药处方。医师处方是医师对患畜治病用药的凭证，是药房调配药剂和给患畜用药的指导，以及计算医疗药品费用的依据。因此处方在法律上、技术上和经济上具有重要意义。要求兽医师和药剂人员在处方上签字，以示对开写处方及调剂处方所负的法律及技术责任。

(二) 处方的种类

1. **法定处方** 系指《中国药典》、《局颁药品标准》(或《部颁药品标准》)所收载的处方，具有法律的约束力。在兽医临床现在有些资料也有法定处方与非法定处方的提法，但目前兽医临床实践中划分不像人医临床严格。

2. **协议处方** 系指医院医师与药房根据临床需要，互相协商所制定的处方。它可以大量配制成医院制剂，减少患畜主人给动物治病用药等候调配取药的时间。协议处方药剂的制备必须经上级主管部门批准，并只限于本单位使用。协议处方虽然主要是人医医院中常采取的处方形式，但在一些较大的兽医院中也经常采用协议处方。

3. **医师处方** 系指兽医师对患畜治病用药的书面文件。医师处方应按人医临床对医师处方的要求一样在药房发药后应留存一定的时间，以便查考；处方留存期满登记后，由单位负责人批准销毁。

4. **经方** 系指《伤寒论》、《金匱要略》等经典医籍中所记载的处方。

5. **古方** 系泛指古典医籍中记载的处方。

6. **时方** 从清代至今出现的处方称时方。

7. **单方、验方和秘方** 单方一般是比较简单的处方，往往只有 1~2 味药。验方是民间和医师积累的经验处方，简单有效。秘方一般是指过去秘而不传的单方和验方。这些单方、验方和秘方中有不少是确有特殊疗效的，应注意发掘、整理和提高。

二、医师处方的内容与特点

（一）处方的内容

完整的兽医师处方应包括以下各项。

1. **处方前记** 包括医院名称、畜主姓名、畜主的地址、联系方式等，病畜的名称（宠物往往有自己的名称）、种属、性别、年龄，处方日期，门诊号或住院号及病例号等。

2. **处方正文** 这是处方的主要部分，包括药物的名称、规格、数量和用法等。药物名称一般用中文书写。毒性药品应写全名，普通药可用缩写名，但缩写不得引起误解。数量一律用阿拉伯数字，剂量单位用公制及通用的国际单位。处方不得涂改，必要时由处方医师在涂改处签字。毒性药品、麻醉药品等更应该严格遵照执行。

3. **处方后记** 包括兽医师签名，调剂人员签名及复核人员签名。处方写成后必须由兽医师签字或盖章，方能生效。调剂人员配毕处方后须由复核人员查验，双签名后方可将药品发出。

（二）处方的特点

1. 中药处方的特点

(1) 处方正文中所用的中药按“君、臣、佐、使”及药引子的顺序书写。

(2) 饮片、中成药、西药三类药品，分别开写处方，不得在同方上书写。

(3) 中药处方中有正名、别名、“并开”及“脚注”。处方药名应用正名，若用别名或“并开”须书写清楚。“脚注”往往是注明对饮片的特殊炮制要求及对煎药法的要求。饮片处方一般以单日剂量书写，同时注明总剂数。

(4) 中成药处方书写法同西药处方。

2. 西药处方的特点

(1) 西药处方均以 Rp 起头，来源于拉丁文 Recipe，意“取”，即“取下列药品”。

(2) 处方中各种药物按其作用性质依次排列。

主药：系起主要作用的药物。

辅药：系辅助或加强主药作用的药物，以及纠正其副作用的药物。

矫味药：系改善主药或辅药气味的物质。

赋形剂：系赋予药物以适当的形态和体积的物质，以便于应用。

目前临床医师处方绝大多数应用药物制剂。其剂量书写方法有：单剂量法，即写出一次用量，一日次数及总日数；总剂量法，即写出总剂量，并写出一次用量及一日次数。

（3）服用方法：通常以 S i g.（拉丁文 Signare 的缩写）为标志。服用方法指示语一般用拉丁文缩写。

(三) 处方格式范例

××动物医院处方笺

畜主姓名	×××	畜别	♀	体 重	75kg
动物种类	猪	年龄	5 月	病例号	000508

茵 陈 30g 栀子 30g 大黄 15g

石菖蒲 30g 黄芩 30g 金钱草 30g

水煎候温服用
每日一剂
连用 5 剂

兽医签名	×××	时间	2005 年 9 月 1 日
司 药	×××	费用	

(四) 处方中的并开与脚注

1. 并开

并开药物系指处方中 2～3 味中药同开在一起。药物并开大致有来两种情况：一是疗效基本相同的药物，如“二冬”即指天冬和麦冬，都具有养阴、益胃、清心肺作用；“二活”即指羌活和独活，都具有祛风胜湿、止痛作用；“焦三仙”即指焦神曲、焦山楂、焦麦芽，均有消食健胃作用。二是药物配伍时可产生协同作用，如“知柏”即知母和黄柏，其配伍能增强滋阴降火作用。

处方常见并开的药物与处方应付，见表

品名	处方应付	品名	处方应付
二冬	天冬 麦冬	苏子叶	苏子 苏叶
二门冬	天门冬 麦门冬	龙齿骨	龙齿 龙骨
二术	苍术 白术	红白豆蔻	红豆蔻 白豆蔻
苍白术	苍术 白术	谷麦芽	谷芽 麦芽
二母	知母 浙贝母	生熟谷麦芽	生炒谷芽 生炒麦芽
知贝母	知母 浙贝母	生熟谷稻芽	生炒谷芽 生炒稻芽
二蒺藜	白蒺藜 沙苑子	炒曲麦	炒神曲 炒麦芽
潼白蒺藜	白蒺藜 沙苑子	炒稻麦	炒稻芽 炒麦芽

知柏	知母 黄柏	焦曲麦	焦神曲 焦麦芽
盐知柏	盐知母 盐黄柏	牛炒蒲黄	生蒲黄 炒蒲黄
炒知柏	盐炒知母 盐炒黄柏	焦楂麦	焦山楂 焦麦芽
酒知柏	酒知母 酒黄柏	生熟枣仁	生枣仁 炒枣仁
砂蔻仁	砂仁 蔻仁	干良姜	干姜 良姜
砂蔻皮	砂仁壳 紫蔻壳	腹皮子	大腹皮 生槟榔
二地	生地熟地	川草乌	川乌 草乌
生熟地	生地熟地	桃杏仁	桃仁 杏仁
二活	羌活 独活	二甲	龟板 鳖甲
羌独活	羌活 独活	全荆芥	荆芥 芥穗
二风藤	青风藤 海风藤	桑枝叶	桑枝桑叶
青海风藤	青风藤 海风藤	冬瓜皮子	冬瓜皮 冬瓜子
杭赤芍	赤芍 白芍	生熟苡米	生苡米 炒苡米
二丑	黑丑 白丑	生熟大黄	生大黄 熟大黄
二公丁	蒲公英 紫地丁	生龙牡	生龙骨 生牡蛎
二决明	石决明 草决明	龙牡	煅龙骨 煅牡蛎
忍冬花藤	金银花 金银藤	猪茯苓	猪苓 茯苓
二花藤	金银花 金银藤	赤猪苓	赤苓 茯苓
南北沙参	南沙参 北沙参	青陈皮	青皮 陈皮
荆防	荆芥 防风	棱术	三棱 莪术
全紫苏	苏叶 苏梗 苏子	全藿香	藿香 藿香叶 藿香梗
苏子梗	苏子 苏梗	乳没	炙乳香炙没药

2. 脚注

脚注 系指医师开处方时在某味药的右上角或右下角所加的注解。其作用是简明指示调剂人员对该饮片采取的不同的处理方法。脚注内容一般包括炮制法、煎药法、服用法等。常用的脚注术语有、打碎、炒制、先煎、后下、另煎、包煎、烊化、捣汁、冲服等。

第五章 方剂的使用

第一节 剂型

将方剂制成适宜的形式叫剂型。剂型是根据方药的性质、病情的需要、用药的方法和动物的采食特性等确定的。《神农本草经》中说：“药性有宜丸者，宜散者，宜水煮者，宜酒渍者，宜膏煎者，亦有一物兼宜者，亦有不可入汤酒者，并随药性，不得违越。”病情不同，

所需的剂型也不同，如病急者宜汤，病缓者宜丸；疮疡湿者宜贴，干枯者宜涂膏等。在使用方法上，灌服宜用散剂或汤剂，直肠给药宜用汤剂或栓剂等。不同的动物，采食特性不同，所用剂型也不同，如禽类可用药砂，鱼类多用药饵等等。现将兽医临床常用剂型分述如下。

（一）散剂

散剂是动物最常用的一种剂型。是一味或多味中药混合制成的粉末状制剂。有内服散剂和外用散剂之分。内服散剂常用开水调成糊状，或加水稍煎，候温灌服；也可混在饲料中喂服。内服散剂在胃肠中能较快地被吸收。常用的内服散剂如消黄散、清肺散、平胃散、郁金散、千金散、桂心散等。外用散剂一般应研成细末或极细末，多用于疮面或患部的掺撒、敷贴，或用于点眼、吹鼻等。如桃花散、生肌散、雄黄散、拨云散、吹鼻散、青黛散、冰硼散等。《元亨疗马集》和《中华人民共和国兽药典·二部》(2000 版)中所载的方剂大多为散剂。

（二）汤剂

汤剂又称煎剂。一味或多味药物的饮片加水煎煮后，去渣而得的液体制剂。包括内服汤剂和外用汤剂。内服汤剂容易被吸收，发挥药效快，适用于急病或重病。如白虎汤、通肠芍药汤、补中益气汤、麻杏甘石汤等。当经口灌服困难时，某些内服汤剂也可采用保留灌肠的方法投药。外用汤剂可用于洗治疮疡、洗敷肿痛等，如防风汤等。

（三）注射剂

注射剂是指中药经提取、配制、灌封、灭菌等步骤制成的液体或粉末状制剂，供直接或加注射用水溶解后注射用。注射剂具有剂量准确、作用迅速、给药方便、药物不受消化液和食物的影响，能直接进入动物体组织等优点。是一种兽医临床上受欢迎的剂型。但在目前，许多中药注射剂存在有提取困难、稳定性差等缺点，故其制备和应用均受到一定限制。

（四）中西合剂

中西合方制剂，是一种新兴的特殊的组合制剂，也是中西医结合的一种重要形式。20 世纪初以来，中西医合方一直吸引着人们去进行大胆而谨慎地尝试。清末民初著名中医张锡纯就曾将石膏与阿司匹林配伍在一起，用于治疗感冒发热，方名就叫石膏阿司匹林汤。近半个世纪以来，用于防治动物疾病的中西药合方逐渐增多。例如：治猪“寒包火”证的阿石枣汤(石膏、生姜、大枣、甘草、阿司匹林，实际上是张锡纯方的加味)；治羔羊痢疾的胡黄连 10 味(胡黄连、石榴皮、干姜、防风、黄柏、秦皮、白头翁、苯乙哌啶、硫酸阿托品、盐酸吗啉双胍)；用于防治禽霍乱和沙门氏菌病的禽药片(由一见喜 100g、藿香、木香各 50g、胡黄连、乌梅各 42g、黄柏 35g、苍术、半边莲、大黄、SMD、土霉素各 30g、白芷 25 g、TMP6g 组成，加适量淀粉制成 1 000 片)；用于治疗草鱼出血病的仙珠呋喃合剂(仙鹤草 250g、紫珠草 100g、板蓝根 500~700g、呋喃唑酮 5g，中药煎汤，呋喃唑酮混于精饲料或面糊中，共同拌青饲料喂 50kg 鱼 5~7 天)等。

（五）微粉（超微粉）

超微粉碎技术是在粉体学基础上，随着粉碎工艺的不断改进、粉碎理论及相关学科的

突破性进展、新型粉碎设备的相继出现而发展起来的一门新技术。对超微粉碎的系统研究国外开始于 20 世纪 60 年代，我国开始于 20 世纪 80 年代。超微粉碎技术是一门跨学科、跨行业的高新技术，是在现代科学技术综合化的趋势下，由相关学科如机械、物理、化学、光学、电子、电磁学、机械力化学、理论力学、流体力学、空气动力学、计算机控制等交叉形成的，是材料科学的一个重要组成部分。

国家“十五”医药经济发展规划中，将超微粉碎技术列为“科技兴药”战略的内容之一，以发展传统的粉碎技术，大力推进技术进步，实现医药工业结构优化、升级，提升中药品质。纳米钙的问世表明化学药物的纳米技术以及纳米产品已获得了较大的突破。可见，药物的微型化是今后药物发展的趋势，而药物的超微粉碎是药物微型化的基础技术之一。

中药粉碎通常以细度(粒径)作为评价粉碎效果的标准。近年来，针对中药植物药材细胞结构差异大、加工成微粉的难易程度不同，因而仅通过控制药材粉碎粒径不能反映不同种类药材粉碎的实际情况，从提高植物药材有效成分提取率角度考虑，提出了中药细胞级粉碎的概念。

中药细胞级粉碎是以打破中药细胞壁为目的的粉碎作业。经细胞级微粉碎作业所获得的中药微粉称为细胞级中药微粉，以细胞级中药微粉为基础制成的中药称为细胞级微粉中药，简称微粉中药。

中药超微粉及中药超微粉碎技术是现代中药研究的热点，目前兽医临床实践中真正应用的超微粉并不多，但随着超微粉碎技术的不断完善，微粉中药将会越来越多。此可能为中药应用带来革命性改变。

（六）其它剂型

除了上述兽医临床常用剂型之外，还有丸剂、片剂、丹剂、膏剂、锭剂、酒剂、口服液、胶剂、曲剂、霜剂、茶剂、糖浆剂、露剂、油剂、灸剂、气雾剂、薰烟剂、膜剂、栓剂、灌注剂、海绵剂、胶囊剂，以及用于禽类的药砂，用于鱼类的药饵等。两种或两种以上的剂型合在一起(如散剂和汤剂混合)，有时也称为合剂。

第二节 剂量

方剂的用量，包括全方总用量和方剂中每味药物的用量。

全方总用量与动物品种、体型、年龄、体质、病情及方药的性质等诸因素有关。由于动物种类较多，体型差异很大，故剂量大小非常悬殊。现将不同种类和年龄动物用药剂量之间的比例列表如下，以供参考。

表 1 不同种类动物用药剂量比例

动 物 种 类	用药剂量比例
马 (体重 300kg 左右)	1

黄牛	（体重 300kg 左右）	1~1 1/4
水牛	（体重 500kg 左右）	1~1 1/2
驴	（体重 150kg 左右）	1/3~1/2
羊	（体重 40 kg 左右）	1/6~1/5
猪	（体重 60 kg 左右）	1/8~1/5
犬	（体重 15 kg 左右）	1/16~1/10
猫	（体重 4 kg 左右）	1/32~1/20
鸡	（体重 1.5kg 左右）	1/40~1/20

表 2 不同年龄动物用药剂量比例

动物种类	年龄	用药剂量比例
马	2~19 岁	1
	19 岁以上	1/2~3/4
	1~2 岁	1/8~1/2
	1 岁以下	1/16~1/8
牛	2~14 岁	1
	14 岁以上	1/2~3/4
	1~2 岁	1/8~1/2
	1 岁以下	1/16~1/8
猪	10 个月以上	1
	6~10 个月	3/4~1
	3~6 个月	1/4~3/4
	1~3 个月	1/8~1/4
羊	1 岁以上	1
	6~12 个月	1/4~1
	1~6 个月	1/10~1/4

方剂中每一味药的用量，应当以兽医中药学或兽药典中所载的剂量为基础， 并根据病情的需要、药物在方剂中所起的作用以及方剂中药味的多少来决定。一般来说，君药或起主要治疗作用的药味用量要较大，佐使药或起次要作用的药味用量要较小；方中药味越多，则每味药的用量相对要小，反之亦然。

方剂中每味药物的用量应该在该味药物名称的右下方用法定的剂量单位（克）标出。个别药物可用个、枚、毫升等单位标示。

第三节 用法

根据用药的目的、病患的性质和部位，以及制剂的作用特点等不同，方剂的用法和给药途径多种多样，大体上可分为经口给药和非经口给药两大类。

经口给药 又称内服、口服、灌服(流体状制剂)或投服(丸剂、片剂等)以及舐服等。药物作用于胃肠道或经胃肠吸收后发挥治疗作用。用导管经口或鼻插入食道或胃投灌药也属于经口给药。

非经口给药 是指除经口给药之外的各种给药方式，如注射和注入、敷撒、喷涂、吸入、包埋纳置(如卡耳、肛门或阴道纳栓)、药浴、点眼、吹鼻、灌肠、笼舍熏蒸、鱼虾类水体用药等。

群体用药 随着我国规模化和集约化畜牧业的发展，群体用药的方式越来越多地被采用。所谓群体用药，就是为了防治群发性疫病，或为了提高动物的生产性能，所采用的批量集体用药。有些动物(如鸡、鱼、蜂、蚕)或群体数量很大，或个体很小，难以逐个给药，也只好采用群体用药法。中药方剂的群体用药，目前较普遍的是饲料添加剂。即将药物拌入饲料中或溶解于饮水中给动物服用。此外，在动物所处的环境(如动物房舍空间、养鱼水体)中施药，使环境中的每个动物都能接触到药物，也是一种群体给药方法。

饲料添加剂 中药饲料添加剂是指以中兽医理论为指导辅以饲养和饲料工业等学科理论技术而制成的纯天然物饲料添加剂。该类添加剂最突出的优点是以提高动物生产性能和饲料利用率为目标，而以确保人体健康为最终目的的天然物的饲料添加剂。

早在公元前二世纪，西汉刘安所著的《淮南子·万毕术》一书中就记载有“麻盐肥豚豕法”：“取麻子三升，捣千余杵，煮为羹；以盐一升，著中；和以糠三斛。饲豚，则肥也。”其中的麻子和盐，就是混饲药剂，也可以说是最初的饲料添加剂。以后的漫长时间里，陆续积累了一些资料。从这些资料中所记载的混饲药剂来看，其目的无非是增强动物体质和育肥，或防治动物疾病。然而都只不过是一些零散经验，应用也不多。20世纪中叶以后，前苏联、日本等国开始从天然产物及其加工品中寻找饲料添加剂。

我国70年代末以后逐渐对此加以重视，开展了较为广泛的应用与研究，发展很快。据初步统计，到目前为止，用来作为饲料添加剂的中药已逾200种。虽然总的看来大多数还停留在试验和探索阶段，但由于中药作为饲料添加剂，具有毒副作用小、不易在食用动物产品中造成有毒残留等优势，其应用和研究势头方兴未艾。

中药作为饲料添加剂，绝大多数为散剂。有单方散剂，也有复方散剂。复方中，有的组成均为天然产物；也有的既含有天然产物，又含有非天然产物。

目前试用和生产的中药饲料添加剂中，有的还采用了预混剂(Premix)的形式。也就是天然产物或其提取物预先与某种载体均匀混合而制成的添加剂。

从应用对象而言,包括食用畜产动物(如猪、鸡、奶牛)、皮毛动物(如羊、狐、貉)、伴侣动物(犬、猫)以及鱼、虾、蜂、蚕等。从应用目的而言,有增加动物产品产量、改进动物产品质量、保障动物健康,以及其他功效等。现分述如下

现代科学试验证明,中药添加剂含有多种氨基酸、维生素、微量元素等物质,能增进机体新陈代谢,促进蛋白质和酶的合成,从而促进生长,提高繁殖力和生产性能,防治疾病,提高饲料报酬及畜禽鱼虾产品的数量和质量,增加饲养效益。

目前中药在兽医临床上仍以散、汤剂经口用药为主。汤、散剂的一般用法如下。

1. 灌药的时间 它与药物的疗效有一定关系。除急病、重病需尽快地用药外,一般来说,空腹或草前灌服则药物吸收较快,而且可以直接作用于胃肠,这对于急病、脾胃病或虫积时,比较适宜;而在饱腹或草后灌药,则药的吸收较慢,所以对于慢性病或灌服刺激性较大的药物以及补养药比较合适。

2. 灌服的次数一般是每天灌服 1~2 次,但在急症时可灌多次。

3. 药液的温度一般治热性病的清热药宜凉服,而治寒性病的热性药宜温服。此外,在冬季可稍温,夏季宜稍凉。

4. 煎药器具 以砂锅、瓦罐或搪瓷器为好,但大量煎煮时,也可以用铝锅。

服药时的饮食禁忌 饮食禁忌简称食忌,也就是通常所说的忌口。在古代文献上有常山忌葱;地黄、何首乌忌葱、蒜、萝卜;茯苓忌醋;鳖甲忌苋菜,以及蜜反生葱等记载。这说明服用某些药时不可同吃某些食物。另外,由于疾病的关系,在服药期间,凡属生冷、粘腻、腥臭等不易消化及有特殊刺激性的食物,都应根据需要予以避免。

第六章 类方概述

一、促进动物产品产量方

这一类方剂是指以促进生长,加快催肥,促进产蛋,增加奶产量,促进鹿茸生长等为主要用途的方剂。从这类方剂的药味组成来看,大体通过以下几方面的作用来达到促进增产的目的。

补充营养:如一些促进动物产品产量方中的麦饭石、蜂花粉、松针等,就是分别给动物补充微量元素、氨基酸、维生素为主要作用而促进增产的。

增进食欲:通过增进食欲来达到促进生长和增产的目的,是此类方剂很常见的理法。配方中常用的中药有健脾理气类(如白术、苍术、陈皮、甘草、党参),消食导滞类(如麦芽、神曲、山楂、槟榔、芒硝),芳香调味类(如香附、肉桂、小茴香、肉豆蔻、甘草、辣椒、艾叶)等。

减少消耗:在处方中应用一些安神镇惊药(如酸枣仁、洋金花)、降低基础代谢药(如昆布、海藻)等,可使动物安静,减少活动,从而达到促进增重和催肥的目的。

抗御疾病:主要是在方剂中配伍能提高动物体非特异性免疫功能的中药,如黄芪、党参、

甘草、当归、何首乌、淫羊藿、猪苓、刺五加等。动物的非特异性免疫功能增强后，就可以减少某些疫病的发生，或减轻疫病对动物产品生产带来的损失，从而达到促进增产的目的。

改善动物产品品质方

这一类方剂是指以提高动物产品的质量为主要功用的方剂。如配有红辣椒、松针等的方剂用于蛋鸡，可使所产蛋的蛋黄颜色加深；配有大蒜的方剂用于肉鸡，可改善鸡肉品质；用杜仲配成的方剂用于饲喂人工养殖的鳗鱼，可使加热烹饪后的鳗鱼肌肉不再松散，烤制成的鱼块与天然鳗鱼完全一样。

通过应用某些中药方剂，还可以提高食用畜产品的营养价值或医疗保健价值。如降胆固醇散用于蛋鸡，可降低鸡蛋中胆固醇的含量；鸡的饲料中添加含海藻的方剂后，所产蛋的蛋黄颜色深，含碘量增加，而且薄壳率降低。海藻用于奶牛，牛奶中的含碘量明显增加。

此外，有些中药方剂还具有一定的美化宠物和提高竞技动物的竞技能力的作用。如令宠物犬、猫的被毛光泽，使赛马的速度提高，使绿毛龟的培毛加快等。

二、防治传染性疫病方

防治传染性疫病(细菌性疾病、病毒性疾病以及某些寄生虫病)的方剂，往往采用扶正祛邪、标本兼顾等组合性治疗法则，其作用大体包括以下几方面。

抗病原：一些中药对传染性疾病的病原(细菌、病毒、寄生虫)有抑制或驱杀作用。常用的如清热解毒药中的板蓝根、金银花、连翘、黄连、黄芩、大青叶，驱虫药中的贯众、槟榔、南瓜子，以及其他中药类的大黄、柴胡、常山、青蒿、苍术、黄芪、甘草、丹皮等。

增强免疫功能：不少中药(主要是益气类、滋阴类、助阳类)有提高免疫功能，增强动物机体抵抗力的作用，从而减少某些传染性疾病的发病率。

防治并发症和继发感染：有些传染性疾病的危害，不仅在于这种疾病本身，而且在于因这种病所导致的并发症或继发感染。有的方剂对原发病可能作用不大，而对并发症和继发感染往往能产生良好疗效，有的甚至是使患病动物康复或原发病不显临床症状的主要措施。

缓解症状。促进病变恢复：有些方剂虽然不能对传染性疫病的病原起直接抑杀作用，但能调整机体，缓解症状，促进病变恢复。如对某些传染性疾病的呼吸道症状、胃肠功能紊乱、机体虚弱等，应用适当的中药方调理，往往能收到良好疗效。

减少应激，延缓发病：某些传染性疫病有较长的潜伏期，是否发病，何时发病，与许多因素有关。其中，应激往往是导致传染性疫病显现或恶化的重要因素。因此，综合防治，配合中药方调理，减少应激，就可以延缓某些传染性疫病的显现或防止其恶化。

三、治疗内科病证方

此类方剂，往往以脏腑为中心，结合病证特点，分别寒热虚实立法。分述如下。

治疗心经病证方：心的主要生理功能是主血脉、藏神。心病则血脉运行失常，神明紊乱。故治疗心经病证的方剂，其作用大体包括安神开窍和调整血脉运行两方面。心病的寒热虚实之中，以实热证为多，故其治疗方剂中常用苦寒药。

治疗肺经病证方：肺的主要生理功能是主气，司呼吸。肺有病往往以咳嗽、气喘为主要症状。肺性宣降，肺病多燥热。故治疗肺经病的方剂，其作用大多具有宣肺、降气和轻扬、清润的特点。

治疗脾和胃肠病证方：脾的主要生理功能是运化；胃肠的主要生理功能是受纳和传导。二者的功能密不可分。脾被称为后天之本和五脏之母，故治疗脾胃病的方剂是一类重要而应用较多的方剂。脾与胃(肠)因各具有不同的特性，病证表现和治疗法则也有区别。一般说来，脾病为多虚、多湿、多降，治法宜补、宜燥、宜升；而胃(肠)病多实、多燥、多升，治法宜泻、宜润、宜降。因此，治疗脾胃(肠)病的方剂应特别处理好上述相反相成的关系。即所谓：“治中焦如衡，非平不安。”

治疗肝胆病证方：肝的主要生理功能是藏血，主疏泄。其特点是体阴用阳：肝血为阴，故肝体为阴；肝病的表现又是多郁易亢，故其用为阳。因此，治疗肝胆病的方剂往往具有两方面的作用：一是滋涵以养肝血之阴，一是疏泄镇潜以平肝气之亢。

治疗肾和膀胱病证方：肾的主要生理功能是藏精、主水。肾被喻为生命之根，先天之本。肾精不可耗泻，除膀胱实热等之外，其病多虚，故其治疗方剂多以培补为主。肾阴虚者，方宜补阴；肾阳虚者，方宜助阳。正如《医宗必读》中说：“治先天根本，则有水火之分。水不足者，用六味丸壮水之源以制阳光；火不足者，用八味丸益火之主以消阴翳。”因阴阳互根，水火相济，故治疗肾阴虚或肾阳虚的方剂又往往采用补阴配阳或补阳配阴的治法。

在实践中，内科病证还常常呈现多种脏腑兼证，如肺脾两虚(土不生金)、肝肾阴虚(水不涵木)、肝脾不和(木乘土)等。故治疗内科病的方剂又有补脾益肺(培土生金)、肝肾同治(滋水涵木)、调和肝脾(扶土抑木)等多脏兼顾的治法。

四、治疗外科及伤科病证方

生于动物体表的病证叫外科病，一般称为疮疡疔毒。治疗外科病证的方剂有内服(内治)和外用(外治)两种。内治方的立法不外消、托、补。消法用于疮疡初起，使其得到消散，以免酿脓破溃，故有“以消为贵”之说。托法多用于疮疡中期，托脓外透，防止毒邪内陷。补法适用于疮疡后期，扶助正气以祛余邪，并促进生肌收口。外治方是治疗外科病的重要方剂，有的外治方可配合内治方提高疗效；有的外科病只用外治方即可收到良好疗效。

伤科又称损伤专科。伤科病证是指外力作用所致的骨、关节及皮肉、筋腱的损伤，以及内脏损伤。伤科病证的治疗统称为“理伤续断”。包括理伤正骨手法和治伤续断方剂两方面。治疗伤科病证的方剂也分内治方和外治方。内治方以活血祛瘀为主，适当配伍行气、止血、清热等方面的药味。外治方以活血祛瘀，消肿止痛为治则。如皮肉已破，则宜用具有止血、定痛、生肌、收口等作用的外治方。

五、治疗胎产病证方

母畜胎前产后病证的主要病理是气血失调和肝脾肾三脏功能失常。所以，治疗胎产病证的方剂常常以调气血、健脾胃、养肝肾为主要法则。

治疗胎前病证的方剂，多以养血固胎为主(常用的安胎药如黄芩、砂仁、续断、苏叶)，调理脾胃为佐。妊娠期间，往往胎气偏旺，用药宜稍偏凉，忌辛热燥烈。故有“胎前宜凉”之说。

治疗产后病证的方剂，多从气血两虚考虑，稍用温补较当。且产后不仅多虚，也易致瘀，治疗既要补虚，又要祛瘀(温通)。故有“产后宜温”之说。

六、治疗幼畜病证方

新生幼畜，为稚阴稚阳之体，其脏腑娇嫩，形气未充；然生机旺盛，发育迅速。其发病，以感寒的伤乳之证最多。且易寒易热，易虚易实，变化迅速。但由于其脏气清灵，随拨随应，故治疗容易收效。临床应用方剂治疗幼畜病证时应注意以下几点：(1)新生幼畜勿轻服药，因药性偏，易损其元气之太和；(2)注意呵护稚嫩之正气，故常以补药为先，祛邪切勿伤正；(3)哺乳幼畜，常需调母，母病子病，母安子安。有时子难服药，可令其母服之，药从乳传，其效也佳。

第七章 比较方剂学概述

动物的种类不同，其生理、病理和药理也会有较大的差异。因此，在立法制方时也应考虑到这些差异。在中兽医方剂发展的很长一段时期中，方剂的理法要点主要是立足于马而借鉴于人的；后来，也主要扩大到牛、骆驼、羊、猪，以及少量应用于鸡、犬、猫等其他动物。近年来，由于动物养殖业的迅速发展和养殖业结构的变化，中兽医方剂使用对象也随着发生很大变化；用于鸡的方剂发展很快；用于鱼虾类的方剂受到重视；用于蜜蜂、家蚕等虫类养殖业的方剂也逐渐兴起。而对于这些动物，不可能完全照搬过去主要用于马、牛等的方剂，必须建立各自适用的方剂理法。在这方面，成熟的理论和实践不多，还有待进一步研究和探索。下面只能就用于不同种类动物的方剂作一些比较性提示。

(一) 用于哺乳动物的方剂

多种哺乳动物虽然具有某些共性，但不同哺乳动物之间差别很大。因此，对于不同的哺乳动物，处方用药有时差别也很大。例如：健康牛羊等反刍动物有反刍和嗳气的特有生理现象。有人就问：中兽医学的理论是“胃气宜降”，而牛的反刍与嗳气似乎有悖于这一理论，对此如何解释？从现有的文献中还找不到答案。尽管理论上不好解释，但中兽医还是早已注意到了牛的这种生理现象，而且在临床实践中积累了保护和恢复反刍与嗳气这一特殊生理功能的经验。例如，在治疗牛病的方剂中，往往要比治疗马病时更多应用草果仁、枳壳、槟榔之类的中药，就是为了这一目的。人类养殖的反刍动物还有牦牛、鹿等，它们除了具有反刍动物的共性外，又具有各自的特点，其用药特色也值得进一步进行比较研究。

犬、猫的生理解剖比牛马更接近于人，但也与人不同。如犬不出汗，能否采用解表的治法，解表剂对犬是否起作用，就成了问题。又如，猫与马不同，极易呕吐；有时，猫的呕吐只是一种保护反应，而不是严重的病态。根据犬猫的生理和病理特点，人们也摸索到了一些

用中药治疗其疾病经验。如治疗犬猫病，尤其是治疗猫病时，常用乌药，就是长期以来积累的经验。早在《本草纲目》中就特别指出：乌药主治“猫犬百病”。

（二）用于禽类的方剂

在中兽医古籍中，有关禽类的方剂很少，因而需要探索的问题更多。如鸡的体温较高，无牙齿、不咀嚼。这或许是目前常将助阳类与消导类中药用于鸡的缘故。禽类的消化道相对较短，也不能消化纤维素，故中药散剂用于鸡往往会影响其药效发挥。实践证明，有些中药方剂用于鸡，煎汤加在饮水中要比散剂喂服疗效好。另外，出于消化生理的需要，禽类有啄食砂砾的习惯。据此，人们特别研制了用于禽(尤其是鸽)的保健砂类方剂。其功用是增进食欲，促进生长，防治疫病。有许多保健砂的配方中，就加有龙胆草、穿心莲、甘草等中药。这是方剂用于禽类保健的一种独特方式。

（三）用于鱼类的方剂

在实际防治鱼病的方剂中，常用大黄、虎杖、辣蓼、五倍子等收涩类中药。有人认为，这可能与食物在鱼类消化道停留时间较短有关。鱼类生活在水体中，某些防治鱼病的方剂施放在水体中产生效果，这又是用于鱼类方剂的一个用法特点。

除鱼类外，现已养殖的水生动物多种多样。不同种属的水生动物，其病理及治疗也不相同。如鳖，对一些常用药物(如生石灰、漂白粉等)的敏感性低于鱼类；而对孔雀石绿却很敏感，对食盐的耐受力也低。因此，应用上述药物防治鱼病和鳖病时，要注意采用不同的剂量或浓度。

（四）用于虫类的方剂

这里主要指的是用于防治蜜蜂病、家蚕病的方剂，以及用于防治人工养殖蝎子、蟋蟀等虫类动物疾病的方剂。

虽然虫类疾病的病因学、病理学、治疗学目前尚缺乏系统资料，但由于蜂、蚕等养殖业发展的需要，中兽医学在虫类疫病的防治方面也有所涉足。如：用于防治蜂病的中药糖浆(常用金银花、贯众、虎杖、甘草等)、单味或复方中药喷粉剂(常用硫磺、雄黄、石灰等)、薰烟剂(常用硫磺等)，用于防治蟋蟀病的中药喂服剂茯苓奶以及中药洗浴剂等。

研究表明，蜜蜂、家蚕等虫类缺乏畜禽等动物所具有的免疫系统，故在防治它们的疫病时，增强和调节免疫功能的方剂就不如用在其他动物起作用。

各 论

第八章 解表方

在中兽医汗法指导下，以解表药为主组成，具有发汗解表作用，用以治疗表证为主的方剂，称解表方。

因表证有表寒与表热的不同，故解表方也有辛温解表方和辛凉解表方之分。

辛温解表方：适用于外感风寒引起的表寒证。病的初期一般以荆芥、防风为主药；病情较重者，可用麻黄、桂枝为主药；对于表虚证，则应在辛温解表药中配用白芍等，以敛阴止汗，防止耗伤正气。

辛凉解表方：适用于外感风热引起的表热证。若为风热伤肺的轻证，可以疏散风热的桑叶、菊花、薄荷等为主药；若发热明显，则应配清热解毒的银花、连翘、牛蒡子等。

临床常见表证证型：最常见表证的类型有外感风寒表实；外感风热表实；外感风寒表虚；外感风热表虚；表里俱热等。针对不同类型的证型确立治法时，应注意：外感风寒表实，以解表发汗为主，考虑控制兼证；外感风寒表虚，驱邪扶正兼顾，驱邪为主，兼顾固表敛阴，以防发汗伤正；外感风寒挟湿，发汗解表，祛风除湿并重。湿伤肌表，多肌肉强硬，酸痛，考虑镇痛。外感风热里虚，扶正祛邪兼顾，注意区分气血阴阳之虚，对证选药；注意解表和补虚之先后。外感风热表实或温热病初起，以辛凉解表为主，临床常配合清热药，同时控制兼证；对于一些疫疠之气，及早采取中西药结合控制，以防表热入里；表里俱热者，注意表里同解，或先表后里，避免表邪内陷。

解表方使用注意事项：使用解表方，必须先辨明寒热虚实，及单一证型或错杂证型；发汗程度，应以微汗即可，以防大汗伤津亡阴；用解表方后，动物腠理毛孔开张，应避风以防它邪乘隙而入；对汗腺不发达的动物，使用解表方时应考虑其机理和效果；对于患畜本身阴血不足或心脏已有疾病者，慎用汗法。

麻黄汤(《伤寒论》)

【组成】 麻黄(去节)45g 桂枝 45g 杏仁 60g 炙甘草 20g

水煎，候温灌服；或为细末，稍煎，候温灌服。

【功效】 发汗解表，宣肺平喘。

【主治】 外感风寒表实证。证见恶寒发热，无汗咳喘，苔薄白，脉浮紧。

【方解】 本方是辛温解表的代表方。风寒表实证乃寒邪束表，肺气失于宣降所致。治宜发汗解表，宣肺平喘。方中麻黄辛温，能发汗解表以散风寒，又能宣利肺气以平咳喘，为主药；桂枝发汗解肌，温通经脉，与麻黄合用则发表之力大增，并能解除肢体疼痛，为辅药；杏仁宣降肺气，助麻黄止咳平喘，为佐药；甘草协调诸药，为使药。四药同用，共收发汗解表、宣肺平喘之效。

【应用】 本方用于风寒表实证。临床上常以本方加减治疗感冒、流感和急性气管炎等属于风寒表实证者。本方去桂枝，加生姜，名三拗汤(《和剂局方》)，功能宣肺止咳，主治外感风寒，咳嗽痰多；若倍用麻黄、桂枝，加石膏、生姜、大枣，名大青龙汤(《伤寒论》)，功能发汗解表，清热除烦，主治风寒表实证兼有里热而见发热恶寒、寒热俱重、无汗而烦躁者。

本方为发汗之峻剂，凡表虚自汗、外感风热、体虚外感、产后血虚等不宜应用。本方不宜久服，一经出汗，即应停药。

【方歌】 麻黄汤中用桂枝 杏仁甘草四般施 发热恶寒流清涕 风寒无汗服之宜

【参考】 本方具有解热、促进腺体分泌、镇咳祛痰和扩张支气管等作用。三拗汤有较强的平喘作用，效果优于单味麻黄或麻黄碱。

桂枝汤(《伤寒论》)

【组成】 桂枝 45g 白芍 45g 炙甘草 45g 生姜 60g 大枣 60g
水煎，候温灌服；或为细末，稍煎，候温灌服。

【功效】 解肌发表，调和营卫。

【主治】 外感风寒表虚证。证见恶风发热，汗出，鼻流清涕，舌苔薄白，脉浮缓。

【方解】 本方证系因风寒之邪客于肌表，营卫不和所致。治宜解肌发表，调和营卫。方中桂枝解肌发表为主药；辅以白芍敛阴和营，使桂枝辛散风寒又不致伤阴，桂、芍二药配伍，一散一收，使营卫调和，表邪得解；生姜助桂枝散风寒，大枣助白芍和营卫，共为佐药；甘草调和诸药，为使药。诸药相合，共奏解肌发表，调和营卫之功。

【应用】 本方主要用于外感风寒表虚证，对流感、外感性腹痛、产后发热等均有良效。若喘咳，可加厚朴、杏仁，以平喘止咳，名桂枝加厚朴杏子汤(《伤寒论》)；本方倍用芍药，加饴糖，名小建中汤(《伤寒论》)，治虚寒腹痛；再加黄芪，名黄芪建中汤(《金匮要略》)，治疗气虚而腹痛者。

本方重在解肌发表，调和营卫，与专于发汗的方剂不同，只适用于外感风寒的表虚证。表实无汗者不宜应用，表热证也当忌用。

【方歌】 风寒表虚桂枝汤 调和营卫用此方 桂枝芍药同甘草 再加大枣与生姜

荆防败毒散(《摄生众妙方》)

【组成】 荆芥 30g 防风 30g 羌活 25g 独活 25g 柴胡 25g
前胡 25g 桔梗 30g 枳壳 25g 茯苓 45g 甘草 15g 川芎 20g
为末，开水冲调，候温灌服，或煎汤灌服。

【功效】 发汗解表，散寒除湿。

【主治】 外感挟湿的表寒证。证见发热无汗，恶寒颤抖，皮紧肉硬，肢体疼痛，咳嗽，舌苔白腻，脉浮。

【方解】 本方证系因外感风寒湿邪所致。治宜发汗解表，散寒除湿。方中荆芥、防风发散肌表风寒，羌活、独活祛除全身风湿，四药共用以解表祛邪为主药；川芎散风止痛，

柴胡助荆芥、防风疏解表邪，茯苓渗湿健脾，均为辅药；枳壳理气宽胸，前胡、桔梗宣肺止咳为佐药；甘草益气和缓，调和诸药为使药。诸药相合，共奏发汗解表，散寒祛湿之效。

【应用】 本方是治疗感冒的常用方，对于时疫、痢疾、疮疡而挟湿的表寒证均可酌情应用。如无湿证，可去独活；若兼气虚，可加党参。本方辛温解表作用较强，对于风热表证及湿而兼热者，不宜应用。

【方歌】 荆防败毒草苓芎 羌独柴前枳桔同 风寒挟湿致畜病 解表祛湿有良功

【备注】 《中华人民共和国兽药典·二部》(2000 版) 收录的荆防败毒散加薄荷一味。

【参考】 本方对流感病毒有一定的抑制作用。

发汗散(《元亨疗马集》)

【组成】 麻黄 25g 升麻 20g 当归 30g 川芎 30g 葛根 20g
白芍 20g 党参(原方为人参) 30g 紫荆皮 15g 香附 15g
为末，开水冲，候温加葱白 3 根、生姜 15g、白酒 60ml，同调灌服。

【功效】 表散风寒，补气活血。

【主治】 气血不足的外感风寒证。证见恶寒颤抖，发热无汗，咳嗽流涕，体瘦食少，脉浮。

【方解】 本方证系因患畜体质素虚，气血不足，又感受风寒所致。由于正气不足，不能鼓邪外出，故治宜补益与散寒药并用。方中麻黄散寒解表为主药；党参、当归、川芎、白芍益气补血，为辅药；葛根解肌表热，升麻解表升阳，二药合用，助麻黄散解表邪；紫荆皮、香附二药合用活血理气，为佐药。且芍药能和营敛阴，防麻黄发散太过。诸药合用，共奏表散风寒，补气活血之效。

【应用】 本方是扶正解表之剂，为治疗牛体虚风寒感冒的主方。咳嗽严重者，加冬花、杏仁祛痰止咳；腹胀者，加莱菔子、草果理气消胀；大便秘结者，加大黄、芒硝泻肠通便。

【方歌】 发汗散是元亨方 麻升葛芍酒葱姜 归芍紫荆参香附 畜患感冒效力强

银翘散(《温病条辨》)

【组成】 银花 60g 连翘 45g 淡豆豉 30g 桔梗 25g 荆芥 30g
淡竹叶 20g 薄荷 30g 牛蒡子 45g 芦根 30g 甘草 20g
为末，开水冲调，候温灌服，或煎汤服。

【功效】 辛凉解表，清热解毒。

【主治】 外感风热或温病初起。证见发热无汗或微汗，微恶风寒，口渴咽痛，咳嗽，舌苔薄白或薄黄，脉浮数。

【方解】 本方证乃外感温邪所致。温病初起，邪在卫分，故治宜辛凉解表，清热解毒。方中金银花、连翘清热解毒，辛凉透表为主药；薄荷、荆芥穗、淡豆豉发散表邪，助主药透热外出，为辅药；牛蒡子、桔梗、甘草合用能宣肺祛痰、利咽止咳，芦根、竹叶清热生津止渴，治疗兼证，为佐使药。诸药相合，共奏辛凉透表，清热解毒之功。

【应用】 本方由清热解毒药与解表药组成，是辛凉解表的主要方剂，常用于治疗各种家畜的风热感冒或温病初起，也用于治疗流感、急性咽喉炎、支气管炎、肺炎及某些感染性疾病初期而见有表热证者。本方防治禽霍乱有效。发热甚者，加栀子、黄芩、石膏以清热；津伤口渴甚者，加天花粉生津止渴；咽喉肿痛甚者，加马勃、射干、板蓝根以利咽消肿；痈疮初起，有风热表证者，应酌加紫花地丁、蒲公英等以增强清热解毒之力。

【方歌】 银翘散主上焦疴 竹叶荆牛豉薄荷 甘桔芦根凉解法 风温初感此方卓

【参考】 本方有较强的解热、抗炎和抗过敏作用，能明显地抑制组织胺引起的毛细血管通透性增高，但对 5-羟色胺和前列腺素引起的作用较弱。现代研究表明，本方具有广谱抗菌和明显的抗病毒作用。

防风通圣散(《宣明论》)

【组成】 防风 15g 荆芥 15g 连翘 15g 麻黄 15g 薄荷 15g
当归 15g 川芎 15g 白芍(炒) 15g 白术 15g 栀子(炒) 15g
大黄(酒蒸) 15g 芒硝 15g 生石膏 30g 黄芩 30g 桔梗 30g
滑石 60g 甘草 60g

为末，开水冲调，候温灌服，或水煎服。

【功效】 解表通里，疏风清热。

【主治】 外感风邪，内有蕴热，表里俱实之证。证见恶寒发热，口干舌燥，咽喉不利，便秘尿赤，舌苔黄腻，脉洪数或弦滑。

【方解】 本方证为外感表邪，内有实热，表里俱实之证，故治宜解表泻下，清泄里热。方中麻黄、防风、荆芥、薄荷疏风解表，使风热之邪从汗而解；大黄、芒硝泄热通便，栀子、滑石清热利湿，使里热从二便而除；配伍石膏、黄芩、连翘、桔梗清解肺胃之热；更以当归、川芎、白芍养血和血，白术、甘草、生姜健脾和胃。以上各药合用，有解表、泻下、清热之功，实为汗、下、清三法并用，上下分消，表里同治之剂。本方在泻散之中又有温养，故汗不伤表，下不伤里。

【应用】 本方适用于外感风邪，内有蕴热的表里俱实之证。使用时应根据具体情况加减化裁。如恶寒不重，可酌减解表药；发热不甚，可减石膏；有汗者，可去麻黄；若无便秘，可减去芒硝之类泻下药。

【方歌】 防风通圣大黄硝 荆芥麻黄栀芍翘 甘桔芎归膏滑石 薄荷芩术力偏饶

第七章 清热方

以清热药为主组成，具有清热泻火、凉血解毒等作用，用以治疗里热证的一类方剂，称为清热方。属于“八法”中的“清法”。

里热证，有气分、血分之分，实热、虚热之别，脏腑偏胜之殊，以及湿热、暑热之异。因而清热剂又可分为清泄气分、清营凉血、清热解毒、清脏腑热、清热燥湿、清热解暑以及清虚热等类。

清泄气分方：适用于热在气分的病证。多以石膏、知母之类清泄肺、胃为主。

清营凉血方：适用于邪热侵入营血的病证。多以水牛角、生地、玄参、丹皮、赤芍等清营凉血为主。

清热解毒方：适用于瘟疫、毒痢、疮痈等热毒证。多以银花、连翘、栀子、黄连、黄柏、大青叶、板蓝根、蒲公英、紫花地丁、射干、山豆根等清热解毒为主。

清脏腑热方：适用于热邪偏盛于某一脏腑的病证，根据各个脏腑热胜的特点，用药有所不同。

清热解暑方：适用于暑热炎天，心经壅热，高热倦怠的暑热证，常以香薷之类发散暑邪为主。

清热燥湿方：适用于湿热内盛的黄疸、热淋等证。多以黄芩、黄连、黄柏、栀子等清热燥湿为主。

清虚热方：适用于暮热早凉，潮热骨蒸，低热不退的虚热证。常以鳖甲、青蒿、丹皮、地骨皮等退虚热为主。

使用清热剂时，应先辨明里热的真假。如真热假寒，当用清热法；真寒假热，则应使用温里回阳之剂。屡用清热剂而热仍不退者，属阴虚火旺之证，当用滋阴壮水之法，使阴复而热自退。此外，使用清热剂，还应根据病情轻重和患者体质强弱来选药定量，避免因使用寒凉药太过而损伤脾胃阳气。

白虎汤（《伤寒论》）

【组成】 石膏（打碎先煎）250g 知母 45g 甘草 25g 粳米 45g
水煎至米熟汤成，去渣温服。

【功效】 清热生津。

【主治】 阳明经证或气分热盛。证见高热大汗，口干舌燥，大渴贪饮，脉洪大有力。

【方解】 本方为治阳明经热盛或气分实热的代表方。方中石膏辛甘大寒，清阳明气分实热而除烦，为主药；知母苦寒质润，清热润燥，为辅药；甘草、粳米益胃养阴，且又能缓

和石膏、知母寒凉伤胃之弊，共为佐使药。四药合用，有清热生津之效。

【应用】 本方用于治疗阳明经证或气分实热证。如乙型脑炎、中暑、肺炎等热性病而有上述见证者，均可在本方基础上加减应用。本方加人参，名人参白虎汤（《伤寒论》），用于伤寒表证已解，热盛于里，气津两伤，口干，汗多，脉浮大无力者。本方加玄参、犀角，名化斑汤（《温病条辨》），清热解毒，滋阴凉血，主治温病发斑。

【方歌】 石膏知母白虎汤 再加甘草粳米襄 热蒸汗出兼烦渴 气耗津伤人参尝

【参考】 白虎汤有显著的解热作用，其解热效果和血钙水平增加有关。如去钙白虎汤，因其不增加血钙浓度而无退热作用。芒果甙被认为是知母解热的有效成分。据研究，本方对大肠杆菌及葡萄球菌作抑菌试验，无论原液或浓缩液均无抑制作用。但用本方治疗感染乙型脑炎病毒的小鼠，能提高存活率，与对照组比较有显著差异。

清营汤（《温病条辨》）

【组成】 犀角 10g（锉细末冲服，可用 10 倍量水牛角代） 生地 60g 玄参 45g
竹叶心 15g 银花 45g 连翘 30g 黄连 25g 丹参 30g 麦冬 45g
为末，开水冲调，候凉灌服，或水煎服。

【功效】 清营解毒，透热养阴。

【主治】 热邪初入营分。证见高热，口渴或不渴，烦躁或时有神昏，舌红口干，或见斑疹隐现，脉细数。

【方解】 本方专为温热病邪由气分传入营分而设。热入营分，治宜清泄营分之热。方中以犀角清解营分热毒为主药；热盛伤阴，故以生地、玄参、麦冬养阴清热，为辅药；又因热邪初入营分，气分热邪尚未解尽，根据“入营犹可透热转气”的理论，佐以黄连、银花、连翘、竹叶心清解气分热毒，使营分邪热转出气分而解，防止邪热进一步内陷，体现了气营两清的治法；丹参助主药清热凉血，还能活血散瘀，防止血与热结，且又能引导诸药入心经以清热，为使药。诸药相合，共奏清营解毒，透热养阴之功。

【应用】 本方用于治疗温热病邪由气分初入营分之证，是清营透气的代表方。凡脑炎、败血症而有上述见证者，均可酌情加减应用。若气分热重而营分热轻，应重用银花、连翘、黄连、竹叶心，并相应减少犀角、生地、玄参的用量。

【方歌】 清营汤治热传营 脉数舌绛辨分明 犀地丹玄麦凉血 银翘连竹气亦清

犀角地黄汤（《千金方》）

【组成】 犀角 10g（用 10 倍量水牛角代） 生地 150g 白芍 60g 丹皮 45g
为末，开水冲调，候凉灌服，或水煎服。

【功效】 清热解毒，凉血散瘀。

【主治】 温热病之血分证或热入血分，有热甚动血，热扰心营见证者。

【方解】 本方所治为温热之邪燔于血分。血分热毒炽盛，可出现动血伤阴及热扰心神等证，故方中以犀角清营凉血，清热解毒，为主药；生地养阴清热，凉血止血，助主药解血分热毒，为辅药；芍药（伤阴甚者用白芍，瘀血重者用赤芍）、丹皮清热凉血，活血散瘀，共为佐使药。四药合用，清热之中兼以养阴，使热清血宁而不耗血，凉血之中兼以散瘀，使血止而不留瘀。

【应用】 本方为治热入血分之各种出血证的重要方剂，临床应用时可随证加减。鼻衄者，加白茅根、侧柏叶以凉血止血；便血者，加地榆、槐花以清肠止血；尿血者，加白茅根、小蓟以利尿止血；心火盛者，加黄连、黑栀子以清心泻火。

【方歌】 犀角地黄芍药丹 热在血分服之安

【参考】 本方有抑制血小板聚集、抗凝和抗血栓形成作用，对急性弥散性血管内凝血(DIC)的发生有一定的防治效果。本方还具有显著的解热、镇静和抗惊厥作用。

黄连解毒汤(《外台秘要》)

【组成】 黄连 30g 黄芩 60g 黄柏 60g 栀子 45g

为末，开水冲调，候温灌服，或煎汤服。

【功效】 泻火解毒。

【主治】 三焦热盛或疮疡肿毒。证见大热烦躁，甚则发狂，或见发斑，以及外科疮疡肿毒等。

【方解】 本方证乃热毒壅盛所致，治宜泻火解毒。方中黄连泻心火，兼泻中焦之火，为主药；黄芩泻上焦之火，黄柏泻下焦之火，栀子通泻三焦之火，且导热下行从膀胱而出，共为辅药。四药合用，苦寒直折，使邪去而热毒解。

【应用】 本方为泻火解毒之要方，适用于三焦火邪壅盛之证，但以津液未伤为宜。可用于败血症、脓毒血症、痢疾、肺炎及各种急性炎症等属于火毒炽盛者。本方去黄柏、栀子，加大黄名泻心汤(《金匮要略》)，功效似本方而尤适用于口舌生疮、胃肠积热；本方还可用于治疗疮疡肿毒，不但可以内服，还可以调敷外用。

【方歌】 黄连解毒汤四味 黄柏黄芩栀子配 大热狂躁火炽盛 疮疡肿毒皆可退

【参考】 本方水煎液对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌等有明显的抗菌作用，各药之间在抗菌作用上有协同作用。细菌对本方不易产生耐药性。据研究，本方具有一定的抗菌、解毒、耐缺氧、抗自由基作用，对胃粘膜有保护作用。

蒙名“西拉汤”，藏名“巴来布苏木汤”。

【组成】 梔子 200g 诃子 200g 川楝子 200g

为末，开水冲调，候温灌服，或煎汤服。

【功效】 清热解毒。

【主治】 三焦热盛，疮黄肿毒，脏腑实热。

【方解】 本方为治一切热证的基础方。方中梔子性寒凉，清泻三焦实热，凉血解毒为主药；诃子味涩清热为辅药；川楝子味苦清热为佐使药。三药合用，共奏清热解毒之效。

【应用】 本方可用于治疗一切热证。若食欲不振，粪便干燥，加芒硝；热泻或肺热咳嗽，加连翘、拳参、木通、麦冬；幼畜红痢，加制胆粉；白痢，加酒炒红花、红糖；羊痘，加苦参、杏仁、甘草、绿豆粉。

【方歌】 三子散用梔诃楝 三焦热盛泻之安

清瘟败毒饮(《疫疹一得》)

【组成】 石膏(先煎)120g 知母 30g 犀角 6g(锉细末冲服，可用 10 倍量水牛角代) 生地 30g 丹皮 20g 玄参 25g 赤芍 25g 黄 连 20g 梔子 30g 黄芩 25g 连翘 30g 桔梗 25g 竹 叶 25g 甘草 15g

为末，开水冲调，候温灌服，或煎汤服。

【功效】 清气凉血，泻下解毒。

【主治】 热毒炽盛，气血两燔。证见大热躁动，渴饮，昏狂，发斑，舌绛，脉数。

【方解】 本方所治乃热毒充斥，气血两燔之证。本方可看做是由白虎汤、黄连解毒汤、清营汤三方加减化裁而成。方中重用石膏、知母大清气分热，为主药；犀角、生地、丹皮、玄参、赤芍清营凉血解毒，黄连、梔子、黄芩、连翘通泻三焦火热为辅药；竹叶清心利尿，导热下行，桔梗载药上行，共为佐药；使以甘草清热解毒，调和诸药。各药配合，气血两清作用颇强，可使热毒迅速清除。

【应用】 适用于温热疫毒及一切火热之证。凡丹毒、脑炎、败血症等属于气血两燔者，均可酌情加减应用。若见惊厥抽搐，可加僵蚕、石菖蒲、钩藤等；热毒炽盛发斑紫暗者，可加银花、大青叶、紫草等；若粪干便秘，加大黄、芒硝；气喘，加枳壳、瓜蒌。

【方歌】 清瘟败毒地连芩 丹石梔甘竹叶寻 犀角玄翘知芍桔 清邪泻毒亦滋阴

【参考】 本方可明显降低伤寒杆菌引起的家兔发热。若经直肠给药，则解热效果更加明显。现代研究表明，本方对内毒素诱发的实验动物温病气血两燔证有治疗作用，能明显抑制发热，改善血象变化，降低死亡率，延长存活时间；病理形态学观察表明，本方有保护内

脏器官、减轻病理损害的作用。

五味消毒饮(《医宗金鉴》)

【组成】 金银花 60g 野菊花 60g 蒲公英 60g 紫花地丁 60g 紫背天葵 30g
为末，开水冲调，候温灌服，或煎汤服。

【功效】 清热解毒，消疮散痈。

【主治】 各种疮痈肿毒。证见局部红肿热痛，身热，口色红，脉数。

【方解】 疮痈肿毒系因动物感受湿热火毒，或内生积热，热毒浸淫肌肤所致，治宜清热解毒。方中金银花清热解毒，消散痈肿为主药；紫花地丁、紫背天葵、蒲公英、野菊花清热解毒，消散疮痈肿毒，均为辅佐药。诸药合用，共同发挥清热解毒，消疮散痈的功效。

【应用】 本方是治疗疮痈肿毒的常用方剂，适用于疮痈肿毒初起，红肿热痛者。若热重，可加连翘、黄芩；肿甚，加防风、蝉蜕；血热毒盛，加赤芍、丹皮、生地。此外，本方还可外用调敷患部，鲜品效果更好。

【方歌】 五味消毒蒲公英 银花野菊紫地丁 配上天葵解热毒 疮痈肿毒可真灵

【参考】 据《中成药研究》1986 年第 12 期报道，以每千克体重 55g 本方水煎剂给小鼠灌胃，观察腹腔注射细菌悬液后 24 小时内动物死亡情况，以判断其体内抗菌效果。预防组于注射菌液前 1 天给药，治疗组于注射菌液的同时给药。结果：预防组 8 只动物死亡 7 只，治疗组 10 只动物死亡 6 只，与对照组比较差异显著，与土霉素组比较无显著差异。

消黄散(《元亨疗马集》)

【组成】 知母 30g 浙贝 25g 黄芩 25g 连翘 25g 黄连 30g
大黄 30g 栀子 30g 芒硝 60~150g 黄药子 30g 白药子 30g
郁金 30g 甘草 15g

煎汤或为末，开水冲调，候温加蜂蜜 120g、鸡蛋清 4 个，同调灌服。

【功效】 清热泻火，凉血解毒。

【主治】 三焦热盛、热毒、黄肿。

【方解】 本方为治马热毒黄肿而设。方中知母、浙贝、黄芩、连翘清心肺之火于上焦；黄连、大黄清胃肠之热于中焦；栀子通泻三焦之火，导热下行人于小肠；芒硝泻火热走大肠；黄药子、白药子、郁金清热凉血；甘草调和诸药而解毒，为使药。各药相合，共成清热泻火，凉血解毒之功。

【应用】 为治马火热壅盛之剂。凡属火热内实，疮黄肿毒，肺热气喘等证，均可酌情应用。本方去甘草，加桔梗，治马胸黄。

【方歌】 消黄知贝二子芩 黄连连翘共郁金 栀子大黄朴硝草 火热壅毒总能清

【备注】 《元亨疗马集》中，还有几个类似方。如治“马遍身黄”的消黄散(本方去黄连，加防风、黄芩、蝉蜕)，治“马心经积热”的消黄散(大黄、知母、甘草、瓜蒌、朴硝、黄柏、栀子)，治“马热毒、槽结、喉骨胀、咽水草难病”的济世消黄散(本方去连翘，加冬花、黄柏、秦艽)等。《中华人民共和国兽药典·二部》(2000 版)收录的消黄散(本方去连翘、黄连、栀子、芒硝)，功能、主治和本方相同。

真人活命饮(《医方集解》)

【组成】 金银花 90g 当归 25g 陈皮 25g 防风 20g 白芷 20g 甘草 15g
浙贝母 20g 天花粉 20g 乳香 15g 没药 15g 皂角刺 15g
穿山甲(蛤粉炒)30g
水煎取汁，候温加黄酒 120ml 灌服。

【功效】 清热解毒，消肿排脓，活血止痛。

【主治】 疮痈肿毒属于阳证者。

【方解】 本方为治阳证疮痈肿毒初起的要方。本方证多因热毒蕴结，局部气血痰湿瘀滞而成。治宜清热解毒，理气活血，消肿止痛，使热毒消解，气血畅通，则肿消痛止。方中金银花清热解毒，是治疮痈的要药，为主药；防风、白芷除湿祛风，并能排脓消肿，当归、乳香、没药活血散瘀，消肿定痛，为辅药；花粉、贝母清痰散结消肿，陈皮理气行滞以助消肿，均为佐药；使以穿山甲、皂刺善走能散，贯穿经络，直达病所，而溃痈破坚，甘草以清热解毒，加酒以助药势，增强活血通络作用，使药力速达病所。

【应用】 用于疮痈肿毒、局部红肿热痛。脓未成者，服之能消；脓已成者，可速使外溃(疮已溃或属于阴证者，不能服用)。若热毒盛，可加清热解毒药蒲公英、紫花地丁、野菊花、连翘、黄连等；痛不甚，可减乳香、没药；脓未成，可减少穿山甲及皂角刺的用量。

【方歌】 真人活命金银花 防芷归陈甘草加 贝母蒺根兼乳没 山甲皂刺酒煎佳

【备注】 《外科发挥》中尚有仙方活命饮一方，只比本方多赤芍一味，其功用、主治均与本方相同。现代研究表明，本方对乙型链球菌有高度抑制作用，对葡萄球菌抑制作用也很强。本方还可使实验动物的全血比粘度与还原全血比粘度的比值明显降低，并显著缩短红细胞电泳时间，但对血细胞压积和血沉无明显影响。实验还证明，本方改善血液流变性的机制是通过抑制红细胞聚集能力、提高红细胞变形能力以及提高红细胞表面负电荷密度来实现的。

公英散(《中兽医治疗学》)

【组成】 蒲公英 60g 银花 60g 连翘 60g 丝瓜络 30g 通草 25g

芙蓉叶 25g 浙贝母 30g

为末，开水冲调，候温灌服，或拌人饲料喂服。

【功效】 清热解毒，消肿散痈。

【主治】 乳痈初起，局部红肿热痛。

【方解】 本方证系因湿热毒气熏蒸乳房而生痈，或因乳汁蓄留，阻塞经络引起乳房胀满所致。方中蒲公英清热解毒，消痈散结为主药；配合银花、连翘、芙蓉叶清热解毒，丝瓜络、通草通络消肿，浙贝母消肿散痈，均为辅佐药。诸药合用，共成清热解毒，消肿散痈之功。

【应用】 本方用治乳痈初起，凡急性乳房炎红肿热痛者，均可用本方酌情加减。

【方歌】 公英散用金银花 连翘芙蓉浙贝母 加上通草丝瓜络 乳痈初起选此方

苇茎汤（《千金方》）

【组成】 苇茎 150g 冬瓜仁 120g 薏苡仁 150g 桃仁 45g

水煎去渣，候温灌服；或苇茎煎汤，药研末冲服。

【功效】 清肺化痰，祛瘀排脓。

【主治】 肺痈。证见发热咳嗽，痰黄臭或带脓血，口干舌红，苔黄腻，脉滑数。

【方解】 肺痈多为痰热郁结于肺，蕴蓄成痈所致，当以清热化痰，祛瘀排脓为治则。方中苇茎（芦根）为疗肺痈之要药，能清肺泄热，为主药；辅以冬瓜仁祛瘀排脓；桃仁活血化痰，薏苡仁利湿排脓，共为佐使药。四药合用，具有清热化痰，祛瘀排脓之效。

【应用】 本方为治肺痈的常用方。用本方治疗肺脓疡、大叶性肺炎，初起能消，脓成能排。但其清热解毒之力尚嫌不足，使用时可配清热解毒药，以增强疗效。初起，可加蒲公英、银花、连翘、鱼腥草、薄荷、牛蒡子；脓成，可加贝母、桔梗、生甘草等以增强其化痰排脓之效。

【方歌】 苇茎汤出千金方 桃仁薏苡冬瓜仁 郁热肺脏成痈毒 甘寒清热上焦宁

龙胆泻肝汤（《医宗金鉴》）

【组成】 龙胆草（酒炒）45g 黄芩（炒）30g 栀子（酒炒）30g 泽泻 30g
木通 30g 车前子 20g 当归（酒炒）25g 柴胡 30g 甘草 15g
生地（酒洗）45g

水煎服或为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 泻肝胆实火，清三焦湿热。

【主治】 肝火上炎或湿热下注。证见目赤肿痛，尿淋浊、涩痛，阴肿等。

【方解】 本方证乃肝胆实火上炎，或肝经湿热下注所致。方中以龙胆草泻肝经实火，除下焦湿热为主药；辅以栀子、黄芩泻火清热，助龙胆草清肝胆实火，泽泻、木通、车前子利尿，引湿热从尿而出，以助龙胆草清利肝胆湿热；当归活血，生地养血，柴胡疏肝均为佐药；甘草调和诸药，为使药。诸药合用，泻中有补，清中有养，既能泻肝火，清湿热，又能养阴血。

【应用】 本方适用于肝胆实火上炎，或肝经湿热下注所致的各种病证，如急性结膜炎、胆囊炎、急性湿疹、尿路感染、睾丸炎等。治疗急性结膜炎，可加菊花、白蒺藜；治疗急性尿路感染，可加篇蓄、金钱草等。

【方歌】 龙胆泻肝栀芩柴 生地车前泽泻偕 木通甘草当归合 肝经湿热力能排

【参考】 本方有显著保肝利胆和利尿作用。现代研究表明，本方有消炎、抑菌，提高免疫功能等作用，还能抑制某些过敏反应。

清肺散（《元亨疗马集》）

【组成】 板蓝根 90g 葶苈子 50g 甘草 25g 浙贝母 50g 桔梗 30g
为末，开水冲调，加蜂蜜 120g，候温灌服。

【功效】 清肺平喘，化痰止咳。

【主治】 肺热咳喘，咽喉肿痛。证见气促喘粗，咳嗽，口干，舌红等。

【方解】 本方证为肺热壅滞，气失宣降所致的肺热气喘。方中以贝母、葶苈子清热定喘为主药；辅以桔梗开宣肺气而祛痰，使升降调和而喘咳自消；板蓝根、甘草清热解毒，蜂蜜清肺止咳，润燥解毒，均为佐使药。诸药合用，共奏清肺平喘之效。

【应用】 本方适用于马的肺热喘咳。支气管炎、肺炎等均可加减使用。若热盛痰多，可加知母、瓜蒌、桑白皮、黄白药子等；喘甚，可加苏子、杏仁、紫菀等；肺燥干咳，可加沙参、麦冬、天花粉等。

【方歌】 桔贝板蓝一处播 甜葶甘草共相随 蜂蜜为引同调灌 肺热喘粗服可愈

郁金散（《元亨疗马集》）

【组成】 郁金 30g 诃子 15g 黄芩 30g 大黄 60g 黄连 30g
栀子 30g 白芍 15g 黄柏 30g
为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 清热解毒，涩肠止泻。

【主治】 肠黄。证见泄泻腹痛，荡泻如水，泻粪腥臭，舌红苔黄，渴欲饮水，脉数。

【方解】 本方所治乃马热毒炽盛，积于大肠而引起的肠黄。方中郁金清热凉血，行气

散瘀，为主药；黄连、黄芩、黄柏、栀子清三焦郁火兼化湿热，为辅药；白芍、诃子敛阴涩肠而止泻，更以大黄清血热，下积滞，推陈致新，共为佐药。诸药合用，具有清热解毒，涩肠止泻之功。

【应用】 本方是治马急性肠炎的基础方，临床上可根据病情加减使用。肠炎初期，内有热毒积滞，应重用大黄，加芒硝、枳壳、厚朴，少用或不用诃子、白芍，以防留邪于内；如果热毒盛，应加银花、连翘；腹痛甚，加乳香、没药；黄疸重，则应重用栀子，并加茵陈；热毒已解，泄泻不止者，则可重用诃子、白芍，并加乌梅、石榴皮，少用或不用大黄。

本方如果与白头翁汤配合使用，效果更好。

【方歌】 郁金散中黄柏芩 黄连大黄栀子寻 白芍更加诃子肉 肠炎热泻此方珍

白头翁汤(《伤寒论》)

【组成】 白头翁 60g 黄柏 30g 黄连 45g 秦皮 60g

为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 清热解毒，凉血止痢。

【主治】 热毒血痢。证见里急后重，泻痢频繁，或大便脓血，发热，渴欲饮水，舌红苔黄，脉弦数。

【方解】 本方证为热毒熏灼肠胃，深陷血分所致。方中白头翁清热解毒、凉血，清大肠血热而专治热毒血痢，为主药；黄连、黄柏、秦皮助主药清热解毒，燥湿止痢，共为辅佐药。合而用之，可清热解毒，凉血止痢。

【应用】 本方为治热毒血痢之要方，常用于细菌性痢疾和阿米巴痢疾。对体弱血虚的患畜，加阿胶、甘草以养血滋阴，名白头翁加甘草阿胶汤(《金匱要略》)；本方去秦皮，加黄芩、枳壳、砂仁、厚朴、苍术、猪苓、泽泻，名三黄加白散(《中兽医治疗学》)，清热燥湿作用更强；若高热，粪少且带黏液或脓血者，减砂仁、苍术，加生地、花粉、大黄、芒硝等。

【方歌】 白头翁汤治热痢 黄连黄柏与秦皮 味苦性寒清肠热 坚阴止痢称良剂

【参考】 白头翁有抗阿米巴原虫的作用，黄连有抗致病性细菌的作用。因此，用本方治疗阿米巴痢疾时，宜重用白头翁；而治疗细菌性痢疾时，宜重用黄连。据研究，无论在体内或体外，本方对志贺氏、宋内氏及弗氏痢疾杆菌，均有抑制作用，并可促进机体机能，增强抗病能力。

通肠芍药汤(《牛经备要医方》)

【组成】 大黄 60g 槟榔 30g 山楂 60g 芍药 30g 木香 25g 黄连 10g

黄芩 45g 玄明粉 150g 枳实 30g

为末，开水冲调，候温灌服或水煎服。

【功效】 清热燥湿，行气导滞。

【主治】 湿热积滞，肠黄泻痢。

【方解】 本方所治为牛湿热下痢、腹痛后重之证。方中黄连、黄芩清热燥湿解毒，为主药；辅以大黄、玄明粉泄热通肠，清除胃肠湿热积滞；芍药散瘀行血，“行血则便脓自愈”，木香、槟榔、枳实、山楂均能调气，“气调则后重自除”，共为佐药。诸药合用，可清热燥湿，行气导滞。

【应用】 用于牛痢疾，欲泻不泻，点滴难出，日泻多次，粪色赤白或粉红如水，不食水草，肚腹胀满。

【方歌】 通肠芍药黄连芩 大黄更加玄明粉 木香槟榔枳山楂 牛患痢疾此方珍

止痢散(《中兽医方剂》)

【组成】 雄黄 40g 滑石 150g 藿香 110g

为末，开水冲服。仔猪每服 2~4g。

【功效】 清热解毒，化湿止痢。

【主治】 仔猪白痢。证见里急后重，粪稀量少，味腥臭，其色灰暗或灰黄，并混有胶冻样物等。

【方解】 痢疾多因外感火毒湿热，或因饲料腐败，食后火毒湿热侵扰胃肠所致。方中以雄黄燥湿解毒，为主药；辅以滑石清热渗湿止泻；以藿香化湿行气和胃止泻，为佐药。合而用之，有清热解毒、化湿止痢之功。

【应用】 本方为治痢疾的有效方剂。适用于仔猪白痢、黄痢，猪胃肠炎，雏鸡白痢等。

【方歌】 止痢散中用雄黄 藿香滑石组成方 凡属仔猪幼雏痢 用之皆见效力彰

香薷散(《元亨疗马集》)

【组成】 香薷 60g 黄芩 45g 黄连 30g 甘草 15g 柴胡 25g

当归 30g 连翘 30g 天花粉 60g 栀子 30g

为末，开水冲调，候温加蜂蜜 60g，同调灌服。

【功效】 清心解暑，养血生津。

【主治】 伤暑。证见发热气促，精神倦怠，四肢无力，眼闭不睁，口干，舌红，粪干，尿短赤，脉数。

【方解】 本方为治伤暑之剂。暑病皆因负重奔走太急，上受烈日暴晒，下受暑气熏蒸，

以致邪热积于心胸，气血壅热而发。治宜清心解暑，养血生津。方中香薷解表祛暑化湿，是治夏季伤暑表证的要药，为主药；辅以黄芩、黄连、栀子、连翘、柴胡通泻诸经之火；暑热最易耗气伤津，故以当归、花粉养血生津为佐药；甘草和中解毒，蜂蜜清心肺而润肠，皆为使药。诸药相合，成为清热解暑，养血生津之剂。

【应用】 用于慢性中暑。若高热不退，加石膏、知母、薄荷、菊花等；昏迷抽搐，加石菖蒲、钩藤等；津液大伤，加生地、玄参、麦冬、五味子等。

【方歌】 香薷散用芩连草 栀子花粉归柴翘 蜂蜜为引相和灌 伤暑脉洪功效高

茵陈蒿汤（《伤寒论》）

【组成】 茵陈蒿 250g 栀子 60g 大黄 45g
水煎服。

【功效】 清热，利湿，退黄。

【主治】 湿热黄疸。证见结膜、口色皆黄，鲜明如橘色，尿短赤，苔黄腻，脉滑数等。

【方解】 本方证为湿热与瘀热蕴结于里而成的阳黄证，治宜清热利湿。方中茵陈利胆清热，去湿除黄为主药；辅以栀子清利三焦湿热，使湿热由小便而出；大黄通泄郁热，使湿热由粪便而下，为佐药；三药均为苦寒之品，能清热利湿，使湿热从二便排出，则黄疸自退。

【应用】 本方是治疗湿热黄疸的基础方，凡属阳证、实证、热证者，均可加减使用。本方去栀子、大黄，加干姜、附子、甘草等药，名“茵陈四逆汤”（《玉机微义》），可治阴黄证。

【方歌】 茵陈蒿汤治阳黄 栀子大黄组成方

【参考】 本方对四氯化碳等多种实验性肝损伤有较好的保护作用，并能促进胆汁的分泌和排泄。茵陈、栀子和大黄各药单独使用时，利胆作用不明显。大黄和茵陈合用时，利胆作用明显增强。药理实验证实，本方有明显的利胆和催胆作用。但拆方实验表明，单味茵陈和山栀均仅能轻度收缩胆囊，大黄则无作用；山栀与茵陈配伍，亦仅出现轻度利胆作用；而山栀和茵陈分别与大黄配伍，则均有较明显的利胆、催胆作用。又据研究，茵陈蒿汤加茅根对乙型肝炎抗原具有抑制作用，但除大黄外，其他三药均呈阴性结果，说明其阳性作用是由于大黄的影响。本方能非常显著地降低血清谷丙转氨酶和谷草转氨酶，对血清胆红素的作用则较轻微。此外，山栀子的乙醇、正丁醇和三氯甲烷—甲醇 3 种溶剂的提取物，具有良好的降低血清胆红素、谷丙转氨酶和谷草转氨酶的作用；肝组织病理学观察亦发现有一定疗效。山栀子的有效成分经鉴定为去羟栀子甙。单味茵陈蒿或大黄的作用则不明显。

洗心散（《元亨疗马集》）

【组成】 天花粉 25g 黄芩 45g 黄连 30g 连翘 30g 茯神 20g
黄柏 30g 桔梗 25g 栀子 30g 牛蒡子 45g 木通 20g 白芷 15g
为末，开水冲调，候温加鸡蛋清 4 个，同调灌服。

【功效】 清热，泻火，解毒。

【主治】 心经积热，口舌生疮。证见舌红，舌体肿胀溃烂，口内垂涎，草料难咽。

【方解】 本方系由黄连解毒汤加味而来，为治心热舌疮之剂。心经积热，上攻于舌，致使舌体肿胀，破溃成疮，治宜清热，泻火，解毒。方中黄连、黄芩、黄柏、栀子通泻三焦火，导热下行，为主药；辅以连翘助主药泻火解毒；牛蒡子、白芷消肿止痛，茯神安心神，天花粉清热生津，木通清心火、利尿，皆为佐药；桔梗排脓消肿，并载药上达病所，为使药。诸药合用，共奏泻火解毒、散瘀消肿之效。

【应用】 用于心经积热所致舌体肿胀或溃破成疮的病证。临床上常与外用方冰硼散或青黛散同用治疗口炎，疗效显著。

【方歌】 洗心花粉及芩连 翘柏栀桔茯神兼 白芷木通牛蒡子 心热舌疮服之痊

青蒿鳖甲汤（《温病条辨》）

【组成】 青蒿 45g 鳖甲 90g 生地 60g 知母 45g 丹皮 60g
水煎服。

【功效】 养阴透热。

【主治】 温热病后期，阴液耗伤，邪留于阴分。证见低热不退，夜热早凉，口干舌红少苔，脉细数。

【方解】 本方所治为温病后期，余热留恋阴分的虚热证。治宜养阴透热。方中鳖甲直入阴分，以滋阴退虚热，青蒿透热邪外出，皆为主药；生地、知母养阴，助鳖甲退虚热，丹皮助青蒿以透泄阴分之伏热，共为辅佐药。诸药相合，有养阴透热之功。

【应用】 本方为治虚热常用之剂。凡温热病后期，阴液已伤，邪留阴分者，均可酌情加减使用。如阴虚火旺，低热不退，可酌加地骨皮、石斛等以退虚热；治疗结核病或其它原因引起的低烧而属于阴虚者，可加地骨皮、玄参、麦冬等。

【方歌】 青蒿鳖甲地知丹 养阴透热服之安

第八章 泻下方

以泻下药为主组成，具有通导大便、排除胃肠积滞、荡涤实热、攻逐水饮作用，以治疗里实证的方剂，称为泻下方，又叫做攻里方。属“八法”中的“下法”。

根据病邪性质的不同及畜体的体质情况的差异，泻下剂常分为攻下、润下和峻泻逐水几

类。临床应用时，必须根据动物正气的强弱，邪气的盛衰，而选择适当的泻下剂。

攻下剂：泻下作用猛烈，适用于正气未衰的里实证。常以大黄、芒硝等为主药。

润下剂：泻下作用和缓，适用于体虚便秘之证。常以火麻仁、郁李仁、肉苁蓉等为主药。

逐水剂：泻下作用峻烈，仅适用于水肿或水饮停聚而体质强壮者。常以牵牛子、续随子、大戟等为主药。

泻下剂大多药性峻猛，凡孕畜、产后、老弱以及伤津亡血者，均应慎用。必要时，可考虑攻补兼施，或先攻后补。对于表证未解、里实未成者，不宜使用泻下剂。如表证未解而里实已盛，宜先解表，后治里，或表里双解。又因泻下剂易伤胃气，应得效即止，切勿过投。

大承气汤(《伤寒论》)

【组成】 大黄 60g(后下) 芒硝 180g 厚朴 30g 枳实 30g

水煎服或为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 攻下热结，破结通肠。

【主治】 结症，便秘。证见粪便秘结，腹部胀满，二便不通，口干、舌燥，苔厚，脉沉实。

【方解】 本方证乃大肠气机阻滞，肠道胀满燥实所致的粪便燥结不通，治宜行气破结。方中大黄苦寒泻热通便，为主药；辅以芒硝咸寒软坚润燥；厚朴、枳实行气散结，消痞除满，并助大黄、芒硝加速积滞的排泄，共为佐药。四药相合，有峻下热结，承顺胃气下行之功。

【应用】 本方适用于阳明腑实证，患畜主要表现为实热便秘，以“痞、满、燥、实”为本证特点。“痞、满”指腹部胀满，“燥、实”指燥粪结于肠道，腹痛拒按。临床应用时，可根据病情在本方基础上加减化裁。本方去芒硝，名小承气汤(《伤寒论》)，主治证候为仅具痞、满、实三证而无燥证者；去枳实、厚朴，加炙甘草，名调胃承气汤(《伤寒论》)，主治燥热内结之证，配甘草乃取其和中调胃，下不伤正；若病程较长，导致热结阴亏，可用原方去枳实、厚朴，加生地、玄参、麦冬，名增液承气汤(《温病条辨》)。

【方歌】 大承气中用硝黄 枳实厚朴共成方 结症起卧需急下 加入槟榔力更强

【参考】 本方的有效成分是大黄中的蒽醌类物质。如果煎煮时间过长，蒽醌类物质遭到破坏，其泻下作用就会减弱。现代研究表明，本方有明显的泻下作用，且原方较单用泻下药或单用行气药的泻下作用强。药理实验表明，本方能降低实验性肠梗阻时肠粘膜中的组织胺，使血浆去甲肾上腺素显著降低，明显抑制结肠平滑肌 Ca 内流，对血管活性肠肽呈双向调节作用，增加胃电波幅。研究表明，本方具有增强胃肠道蠕动和增加肠管容积从而引起泻下的作用，静脉给药则无此作用。此外，本方还具有改善肠道血液循环和降低毛细血管通透性，以及促进胆囊收缩，使胆道口括约肌放松、胆汁分泌增加等作用。实验还表明，本方的不同煎法中，以经典煎法(先煎枳实、厚朴，后人大黄再煎，最后溶入芒硝)制出的药液作用

最强。

无失丹(《痊骥通玄论》)

【组成】 木香 25g 槟榔 20g 青皮 35g 大黄 75g 芒硝 200g
牵牛子 45g 荆三棱 25g 木通 20g 郁李仁 60g
水煎服或为末内服。

【功效】 泻下通肠。

【主治】 结症，便秘。

【方解】 本方为主治马属动物大肠粪结之剂。方中大黄、芒硝破结通肠，为主药；牵牛子、槟榔攻逐峻泻，郁李仁润下滑肠，助主药攻逐泻下，皆为辅药；木香、青皮、三棱理气消滞，木通利尿降火，均为佐使药。诸药合用，共成攻逐泻下之功。

【应用】 凡马属动物大结肠便秘，或小结肠便秘，均可酌情加减应用。若继发腹胀，可加莱菔子、厚朴、砂仁等以理气消胀；久病体虚者，加党参、当归、甘草、大枣以扶助正气；伤津甚者，加玄参、麦冬、生地等以滋阴润燥。本方功效与大承气汤相近，但攻逐泻下之力更强。

【方歌】 无失丹中用槟榔 青丑木香棱硝黄 木通郁李和葱酒 枳实便秘能推荡

马价丸(《痊骥通玄论》)

【组成】 大黄 60g 五灵脂 60g 牵牛 60g 木通 60g 续随子 60g
甘遂 60g 滑石 60g 大戟 60g 瞿麦 60g 香附子 60 个
巴豆 200 粒

为末，醋和为三十丸，每次用一丸，温开水化开灌服，或酌情适当调整剂量作散剂冲服。

【功效】 峻泻通肠，理气止痛。

【主治】 马属动物中结。证见粪结不通，肚腹胀满，疼痛起卧等。

【方解】 马患中结，结粪难下，故宜峻泻猛攻。方中以巴豆峻泻通畅，为主药；大黄、牵牛、续随子、甘遂、大戟助巴豆攻逐泻下，滑石滑肠通便，皆为辅药；五灵脂、香附理气止痛，木通、瞿麦导热下行，均为佐使药。诸药相合，有峻泻通肠，理气止痛之效。

【应用】 对马、骡大结肠或小结肠便秘，可酌情使用。

【方歌】 马价丸中黄灵牵 续随木通滑石添 巴豆香附瞿戟遂 马患中结服之痊

【备注】 古籍中有多方是以马价丸为方名的。如《安骥药方》中的马价丸，由猪牙皂角、瞿麦、牵牛子、郁李仁、老鼠粪、榆白皮、续随子、紫芫花等组成。《痊骥通玄论》中

的马价丸又方，只有五灵脂、巴豆、黑牵牛三味药物。在《元亨疗马集》中有三个马价丸，除上方及无失丹外，另一个马价丸系由续随子、膩粉、滑石、木通、牵牛子、酥油、大黄、芒硝、生油等组成。以上各方虽组成有所不同，但均能治疗马中结。

猪膏散(《元亨疗马集》)

【组成】 滑石 60g 牵牛子 30g 大黄 60g 官桂 15g 甘遂 25g
大戟 25g 续随子 30g 白芷 10g 地榆皮 60g 甘草 25g
为末，热调猪油 250g、蜂蜜 100g，一次灌服。

【功效】 润燥滑肠，消积导滞。

【主治】 牛百叶干。证见身瘦毛枯，食欲、反刍停止，腹缩粪紧，鼻镜无汗，口色淡红，脉象沉涩等。

【方解】 本方证的发生多因过多饲喂粗硬干饲料，饮水不足，胃中津液耗损过多，使百叶干枯。方中以大黄涤荡胃肠，为主药；大戟、甘遂、续随子、牵牛子、滑石破坚消积，通利二便，猪油、蜂蜜润燥滑肠，皆为辅药；佐以白芷、官桂理气，且官桂尚能温阳补土，以防攻逐太过，地榆可止胃痛、解毒；甘草协调药性为使。诸药相合，共成润燥攻下之功。

【应用】 本方主要用于治疗牛百叶干。百叶干为本虚标实之证，本方服后能润燥攻下，待瓣胃积滞解除后，可根据病情，再施以补法。本方对牛瘤胃积食、便秘也有较好的疗效。

【参考】 方中大戟、甘遂与甘草虽是“反药”，但临床应用未见毒副作用。

当归苁蓉汤(《中兽医治疗学》)

【组成】 当归 180g 肉苁蓉 90g 番泻叶 45g 广木香 12g 厚朴 45g
炒枳壳 30g 醋香附 45g 瞿麦 15g 通草 12g 六曲 60g
水煎取汁，候温加麻油 250~500g，同调灌服。

【功效】 润燥滑肠，理气通便。

【主治】 老弱、久病、体虚患畜之便秘。

【方解】 本方原为治疗马大肠燥结的润下剂。方中以当归补血润肠，肉苁蓉补肾润肠，共为主药；辅以番泻叶泻热通便，麻油润肠通下，木香、香附、厚朴、枳壳通行滞气，助主药理气通便；瞿麦、通草利尿以清燥粪所化之热，皆为佐药。

【应用】 本方药性平和，马的一般结症都可应用，但偏重于治疗老弱久病、胎产家畜的结症。用时可随证加减，体瘦气虚者加黄芪；孕畜去瞿麦、通草，加白芍。

【方歌】 当归苁蓉汤木香 泻叶枳朴瞿麦尝 通草香附和麻油 大肠燥结功效良

第九章 消导方

以消导药为主组成，具有消食化积功能，以治疗积滞痞块的一类方剂，称为消导方。属“八法”中的“消法”。

消导方应用甚为广泛，凡由气、血、痰、湿、食等壅滞而成的积滞痞块，均可用之。本节内容主要讨论消食导滞方面的方剂。消导方与泻下剂方有消除有形实邪的作用，但在临床运用上，两者有所不同。泻下方一般用于急性有形实邪，是猛攻急下的方剂；消导方一般用于慢性的积滞胀满，属渐消缓散的方剂。

水谷停滞，往往因脾失健运，胃失和降而逐渐产生，家畜出现食欲减退、肚腹胀满等症。除重用山楂、六曲、麦芽等消导药外，还需配伍行气宽中及理气健脾的药物。如积滞郁而化热，则宜配伍清热药；若积滞兼寒，宜配伍祛寒药等。消导方虽较泻下方作用缓和，然而毕竟是克伐之剂，对于脾胃虚弱、气血不足而邪已实者，还须配伍补益药物，消补兼施。

曲蘖散（《元亨疗马集》）

【组成】 六曲 60g 麦芽 30g 山楂 30g 厚朴 25g 枳壳 25g 陈皮 25g
苍术 25g 青皮 25g 甘草 15g

共为末，开水冲，候温加生油 60g，白萝卜一个，同调灌服。

【功效】 消积化谷，破气宽肠。

【主治】 料伤。证见精神倦怠，眼闭头抵，拘行束步，四足如攢，口色鲜红，脉洪大。

【方解】 本方证乃喂饲无节，造成脾胃失职，宿谷积于胃肠的肚腹胀满，治宜消积化谷，破气宽肠。方中用六曲、山楂、麦芽消食化谷为主药；辅以青皮、厚朴、枳壳、萝卜行气宽肠，助主药消胀；陈皮、苍术理气健脾，使脾气得升，胃气得降，运化复常，皆为佐药；甘草和中协调诸药，为使药。

【应用】 用于治疗马、牛料伤。若脾胃虚弱而草谷不消，则去青皮、六曲、苍术，加白术、茯苓、木香、党参、山药、砂仁等以补气健脾。

【方歌】 曲蘖散楂厚朴依 枳壳苍术青陈皮 麻油甘草生萝卜 马牛料伤服之宜

保和丸（《丹溪心法》）

【组成】 山楂 60g 六曲 60g 半夏 30g 茯苓 30g 陈皮 30g 连翘 30g
莱菔子 30g

共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 消食和胃，清热利湿。

【主治】 食积停滞。证见肚腹胀满，食欲不振，嗳气酸臭，或大便失常，舌苔厚腻，脉滑等。

【方解】 本方证多因饲养管理不当，动物贪食过多，肠胃受伤，水谷停积于胃肠所致，宜用平和之品，消而化之。方中山楂、六曲消食导滞为主药；辅以莱菔子消食下气，宽胸利膈，以增强主药消导作用；由于积滞往往化热生湿，故用陈皮、半夏、茯苓化湿和胃，连翘清热散结，共为佐使药。诸药相合，而有和胃消食之功。

【应用】 治一切食积。若食积较甚，加麦芽、枳实、槟榔等以行气消胀；热盛，加黄连、黄柏以清热泻火；便秘，加大黄、芒硝、槟榔以通便导滞。本方加白术，名大安丸（《丹溪心法》）。能消食补脾，主治脾虚食滞不化，粪便溏薄等证。

【方歌】 保和六曲和山楂 苓夏陈翘菔子加 能消食积能和胃 再入麦芽效更佳

木香导滞丸（《松崖医经》）

【组成】 木香 20g 槟榔 20g 枳实 45g 大黄 60g 六曲 45g 茯苓 30g
黄芩 20g 黄连 15g 白术 20g 泽泻 15g
为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 调气导滞，清热利湿。

【主治】 湿热、食积所致的下痢后重。

【方解】 本方证是由于食积与湿热互结于肠胃，气机受阻所致。方中以枳实破气消积导滞，大黄荡涤实结，为主药；辅以木香、槟榔下气导滞，黄芩、黄连清热燥湿；茯苓、白术、泽泻六曲渗湿和中，均为佐使药。各药配合，积滞可去，湿热能清。

【应用】 本方为调气导滞与清热利湿并用之剂，专治湿热积滞所致的下痢后重、腹胀、泄泻等证。

【方歌】 木香导滞首大黄 枳实芩连曲术襄 茯苓泽泻与槟榔 湿热积滞服之康

第十章 和解方

根据调和的原则组方，具有和解表里、调畅气机的作用，用于治疗少阳病或肝脾、肠胃不和等病证的方剂，叫做和解方。属“八法”中的“和法”。

和解方原为治疗少阳胆经病证而设，然而肝胆关系密切，病理上常相互影响，并往往累及脾胃，故其适应证还包括肝脾不和、胃肠不和等病证。

服用和解剂应注意适应证。凡属邪在肌表，或表邪已入里者，不宜使用和解剂，以免引邪入里或延误治疗；脏腑极虚、气血不足之寒热，不宜使用和解剂。

小柴胡汤(《伤寒论》)

【组成】 柴胡 45g 黄芩 45g 党参 45g 制半夏 30g 炙甘草 15g
生姜 20g 大枣 60g

水煎服或为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 和解少阳，扶正祛邪，解热。

【主治】 少阳病。证见寒热往来，饥不欲食，口津少，反胃呕吐，脉弦。

【方解】 本方证为外感寒邪传入少阳的半表半里证，非汗、下、吐法之所宜，惟以和解少阳之法为妥。方中用柴胡清解少阳之邪，疏解气机，为主药；黄芩清泄少阳之郁热，为辅药，若寒重于热，可加大柴胡用量，热重于寒，则加大黄芩用量，二药合用，能解除寒热往来；党参、甘草、大枣能扶正和中，并防止邪气内侵，半夏、生姜和胃止呕，且生姜还能助柴胡散表邪，同时姜枣配合既能调和营卫，输布津液，又能助半夏和胃止呕，共为佐使药。各药相合，可和解少阳，扶正祛邪。

【应用】 本方为治伤寒之邪传入少阳的代表方。也可用于体虚及母畜产后或发情期间外感寒邪。

【方歌】 小柴胡汤和解供 半夏党参甘草从 更用黄芩加姜枣 少阳经病此方宗

【参考】 本方具有保肝和解热作用。药理研究表明，本方具有显著的解热、抗炎、保肝、利胆、镇痛、解痉、镇静、抗惊、镇咳、祛痰、增强非特异性抗感染免疫、抑制变态反应等作用。解热、抗炎、促进抗感染免疫等，可缓解寒热往来之证；抗炎、保肝、利胆、解痉、镇痛等，可缓解胸胁苦满之证；镇静、抗惊、促进消化液分泌等，有助于不欲饮食和心烦喜呕症状的改善。

逍遥散(《和剂局方》)

【组成】 柴胡 45g 当归 45g 白芍 45g 白术 45g 茯苓 45g
炙甘草 20g 煨生姜 15g 薄荷 10g

水煎服或为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 疏肝解郁，健脾养血。

【主治】 肝郁血虚，肝脾不和。证见口干食少，神疲力乏，或寒热往来，舌淡红，脉弦虚。

【方解】 本方所治为肝郁血虚、脾失健运所引起的肝脾不和之证。治宜疏肝解郁，健脾养血。方中柴胡疏肝解郁，当归、白芍补血养肝，三药配合，补肝体而养肝用，为主药；茯苓、白术补中理脾，为辅药；煨姜、薄荷助全方疏肝理脾，炙甘草补中健脾并调和诸药，

为使。诸药相合，疏肝解郁，健脾养血。

【应用】 本方是疏肝理脾的常用方。凡肝脏疾患、胃炎、母畜性周期不调以及乳房胀痛等属于肝郁血虚，肝脾不和者，均可用本方加减治疗。若肝郁血虚发热，加栀子、丹皮以增加疏肝解热作用，名丹栀逍遥散（《内科摘要》）；若血虚较甚，加生地或熟地，增强补血功能，名黑逍遥散（《医略六书》）；若脾虚较甚，加党参、大枣以补气健中。

【方歌】 逍遥散用芍归柴 苓术甘草薄荷偕 解郁疏肝脾亦理 丹栀加入热能排

四逆散（《伤寒论》）

【组成】 柴胡 60g 炒枳实 60g 芍药 60g 炙甘草 60g
为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 透解郁热，调和肝脾。

【主治】 热厥证。证见四肢厥逆，身热，腹痛，泄泻后重，脉弦。

【方解】 本方所治之热厥证乃肝气郁结，气机不利，阳郁于里，不能布达四肢所致，故以透解郁热，舒畅气机为治则。方中柴胡疏肝解郁，使阳气透达肌表，兼调寒热，白芍养肝敛阴，和里止痛，柴、芍相配一散一收，共为主药；枳实下气破结，与柴胡相配，一升一降，以升清降浊，为佐药；甘草为使，调和诸药。四药相合，能透解郁热，调和肝脾。

【应用】 本方为疏肝理气的基础方。凡消化道疾病属于肝脾不和者，均可酌情选用。若食滞不消，可加麦芽、山楂；若黏膜黄染，可加郁金、茵陈；气滞较甚，可加香附、木香、陈皮。本方加川芎、香附，枳实改枳壳，名柴胡疏肝散（《景岳全书》），可用于慢性胃炎。

【方歌】 四逆散非四逆汤 柴甘枳芍共煎尝 阳郁厥逆腹胀痛 泄热疏肝效力彰

第十一章 化痰止咳平喘方

以化痰、止咳、平喘药为主组成，具有消除痰涎、缓解或制止咳喘的作用，用以治疗肺经疾病的方剂，称为化痰止咳平喘方。

咳嗽与痰、喘在病机上关系密切，咳嗽每多挟痰，而痰多亦每致咳嗽，久咳则肺气上逆而作喘，三者可互为因果。在治法上，化痰、止咳、平喘常配合应用。因此，将化痰止咳、平喘的方剂归为一类。

痰病的成因很多，素有“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”之说。如脾不健运，湿聚成痰者，治宜燥湿化痰；火热内郁，炼液为痰者，治宜清化热痰；肺燥阴虚，灼津为痰者，治宜润肺化痰；肺寒留饮者，治宜温阳化痰等。《景岳全书》云：“五脏之病，虽俱能生痰，然无不由乎脾肾。”因此，治疗时不能单攻其痰，应重视治其生痰之本，即所谓“善治痰者，治其生痰之源”。

此外，痰随气升降，气堕则痰聚，气顺则痰消，故在祛痰止咳剂中，每配伍理气药物。如《证治准绳》说：“善治痰者，不治痰而治气，气顺则一身津液亦随气而顺矣。”

二陈汤（《和剂局方》）

【组成】 制半夏 45g 陈皮(原方用橘红)50g 茯苓 30g 炙甘草 15g

水煎服或为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 燥湿化痰，理气和中。

【主治】 湿痰咳嗽，呕吐，腹胀。证见咳嗽痰多、色白，舌苔白润。

【方解】 本方证乃脾失健运，湿邪凝聚，气机阻滞所致。治宜燥湿化痰，理气和中。方中半夏燥湿化痰，降逆止呕为主药；气顺则痰降，气化则痰消，故辅以陈皮理气化痰；又因痰由湿生，脾复健运则湿可化，湿去则痰消，故以茯苓健脾利湿为佐；使以甘草和中健脾，协调诸药。四药合用，具有燥湿化痰，理气和中之功。

【应用】 本方为治疗以湿痰为主的多种痰证的基础方，多用于治疗因脾阳不足，运化失职，水湿凝聚成痰所引起的咳嗽、呕吐等证。本方加紫苏、杏仁、前胡、桔梗、枳壳可治风寒咳嗽；加党参、白芍可治脾胃虚弱、食少便溏、湿咳等证；本方加沙参、麦冬、芍药、丹皮、贝母、杏仁、蜂蜜，名沙参散，治劳伤咳嗽、久咳不止(慢性气管炎)。

【方歌】 二陈汤用夏和陈 益以甘草和茯苓 利气调中兼去湿 痰湿咳嗽此方珍

半夏散（《元亨疗马集》）

【组成】 半夏 30g 升麻 45g 防风 25g 桔矾 45g 生姜 30g

为末，开水冲，候温加蜂蜜 60g，同调灌服。

【功效】 燥湿化痰，平胃止呕。

【主治】 马肺寒吐沫。证见吐沫垂涎，有时频频空口咀嚼，口鼻俱凉，精神倦怠，口色青白，脉象沉迟。

【方解】 本方证为脾阳受损，胃失和降，湿聚成饮，寒饮犯肺，与肺气凝结而成痰饮所致。方中半夏温化寒痰，桔矾燥湿利痰，为主药；防风、升麻理脾助阳，增强脾运化水湿的功能，为辅药；生姜温中和胃止呕，既助半夏降逆，又可制半夏之毒，为佐药；蜂蜜协调诸药，为使药。

【应用】 用于马的肺寒吐沫。若寒重腹胀者，可加木香、草豆蔻。

【方歌】 半夏散姜升防矾 肺寒吐沫服之安

止嗽散（《医学心悟》）

【组成】 荆芥 30g 桔梗 30g 紫菀 30g 百部 30g 白前 30g 陈皮 10g
甘草 6g

为末，开水冲，候温灌服。

【功效】 止咳化痰，疏风解表。

【主治】 外感咳嗽。证见咳嗽痰多，日久不愈，舌苔白，脉浮缓。

【方解】 本方证为风寒外感，肺气被郁，气逆痰升所致。治宜止咳、化痰、解表。本方以止咳为主，化痰、解表为辅，故名止嗽散。方中百部、紫菀、白前、陈皮理气化痰、止咳为主辅药；荆芥、桔梗疏风宣肺，甘草和中化痰，协调诸药。各药相合，共具宣肺止咳之功。

【应用】 本方为治外感咳嗽的常用方，用于外感风寒咳嗽，以咳嗽不畅、痰多为主证。若恶寒发热，偏重于表证者，可加防风、苏叶、生姜等以发散风寒；若外邪已去，见有热候者，去荆芥，加黄芩、栀子、连翘等以清热。

【方歌】 止嗽散用桔梗前 荆菀陈草百部联 一般咳嗽能通用 随证加减效更全

款冬花散（《元亨疗马集》）

【组成】 款冬花 60g 黄药子 60g 僵蚕 30g 郁金 30g
白芍 60g 玄参 60g

水煎服，或共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 滋阴降火，止咳平喘。

【主治】 阴虚肺热。证见咳嗽气急，咽喉肿痛。

【方解】 本方证系由阴虚肺热，津液耗伤，燥痰阻肺而致。方中款冬花润肺化痰，止咳平喘玄参养阴润肺，清热祛痰为主药；辅以白芍养阴清热，助主药滋阴降火；肺火上炎而致咽喉肿痛，故佐以黄药子、郁金、僵蚕利咽喉，消肿痛；蜂蜜润肺清热，协调诸药，为使药。

【应用】 用于阴虚火旺引起的咳嗽气急，咽喉肿痛。若见有表证者，可加桑叶、薄荷；火盛咳剧者，可加桑白皮、枇杷叶等。

【方歌】 肺燥咳嗽冬花散 黄药郁金加僵蚕 玄参白芍蜜调灌 滋阴止咳能平喘

麻杏石甘汤（《伤寒论》）

【组成】 麻黄 30g 杏仁 30g 炙甘草 30g 石膏（打碎先煎）150g

为末，开水冲调，候温灌服，或煎汤服。

【功效】 辛凉泄热，宣肺平喘。

【主治】 肺热气喘。证见咳嗽喘急，发热有汗或无汗，口干渴，舌红，苔薄白或黄，脉浮滑而数。

【方解】 本方证之形成，多为外感风邪，化热犯肺所致。治宜宣肺，清热，平喘。方中麻黄辛苦宣肺解表平喘，为主药；辅以大剂量石膏，辛凉宣泄，二药配合，发散肺经郁热而平喘；杏仁宣降肺气，助麻黄止咳平喘，为佐药；甘草协调诸药，为使药。四药合用，则有宣肺，清热平喘之效。

【应用】 本方是治疗肺热气喘的常用方剂，使用时以喘急身热为依据。若热甚可加黄芩、栀子、连翘、银花；若兼有咳嗽者，可加贝母、桔梗等。

【方歌】 平喘麻杏甘石汤 四药组成法度良 辛凉宣泄能清肺 清热平喘效力彰

【参考】 本方可抑制肥大细胞脱颗粒释放组织胺引起的平滑肌痉挛，其平喘作用可能与此有关。现代研究表明，本方有退热、提高免疫功能等作用。用于退热时，方中的有机、无机两类成分还有协同功效。

苏子降气汤（《和剂局方》）

【组成】 苏子 60g 制半夏 30g 前胡 45g 厚朴 30g 陈皮 45g
肉桂 15g 当归 45g 生姜 10g 炙甘草 15g
水煎服。

【功效】 降气平喘，温肾纳气。

【主治】 上实下虚的喘咳证。证见痰涎壅盛，咳喘气短，舌苔白滑等。

【方解】 本方所治为上实下虚的咳喘证。“上实”是指痰涎壅盛于肺，肺气不得宣畅，升降失常，气逆于上，则为喘咳；“下虚”是指肾阳虚，肾不纳气，则上下不相接续，以致气急而短，呼多吸少，发生喘咳。治宜降气，化痰，平喘，以治上实为主，下虚为辅。方中用苏子降气平喘为主药；辅以陈皮、半夏、前胡、厚朴、生姜化痰止咳，理气降逆，以疏通上实，加入肉桂温肾以助纳气，而治下虚；咳喘患者，久病多虚，在化痰止咳平喘的大队药物中，配当归养血补虚，且缓和本方药物的温燥之性为佐药；甘草和中，协调诸药为使药。综观本方，肺肾同治，而以治肺为主；上实下虚同治，而以降气化痰治上实为主。

【应用】 临床上常用于治疗慢性气管炎、支气管肺炎、轻度肺气肿属痰涎壅盛，肾气不足者。方中入沉香，去肉桂，则温肾之力减弱，而降气平喘之力增强；若兼有气虚，可加党参、五味子；若兼有风寒表证，应减去肉桂、当归，加入麻黄、杏仁等，以疏散风寒。全方药性偏温燥，故肺肾两虚或肺热咳喘者，均不宜应用。

【方歌】 苏子降气橘半宜 前归桂朴草姜依 上实下虚痰喘嗽 或入沉香去桂施

清燥救肺汤(《医门法律》)

【组成】 石膏(煅)75g 桑叶 45g 麦冬 30g 阿胶(烔化)15g 胡麻仁 15g
杏仁(炒)30g 枇杷叶(去毛蜜炙)25g 党参 30g 甘草 15g
水煎服。

【功效】 清肺润燥。

【主治】 温燥伤肺。证见发热，干咳无痰，咽干口渴，无舌苔。

【方解】 本方所治多为温燥伤肺，气阴两伤之证，当以甘寒之品清肺燥，滋肺阴。方中以石膏清肺之燥热，桑叶宣肺止咳，为主药；以麦冬、胡麻仁、阿胶润肺滋阴，为辅药；又以党参益气培土生津，杏仁、枇杷叶降逆化痰止咳，共为佐药；甘草协调诸药，为使药。诸药相合，清肺润燥。

【应用】 本方为轻宣润燥之剂，用于治疗温燥伤肺之证，如急性支气管炎、咳嗽无痰或痰液黏稠者。若阴虚血热，加生地以养阴清热；痰多，加贝母、瓜蒌以清润化痰。

【方歌】 清燥救肺参草杷 石膏胶杏麦胡麻 经霜收下冬桑叶 清燥润肺效可佳

百合散(《痊骥通玄论》)

【组成】 百合 45g 贝母 30g 大黄 30g 甘草 20g 天花粉 45g
为末，加蜂蜜 120g、荞面 60g、萝卜汤一碗，水适量冲调，候温灌服。

【功效】 滋阴清热，润肺化痰。

【主治】 肺壅鼻脓。证见喘粗鼻咋，连声咳嗽，鼻孔流脓，掀吊毛焦，口色红，脉洪数。

【方解】 《元亨疗马集》说：“良马鼻中流白脓，多因奔走热攻胸”，故治宜清热润肺化痰。方中百合、贝母滋阴清热，润肺化痰，为主药；辅以天花粉、萝卜润肺理气化痰；荞面降气，大黄清热，均为佐药；甘草、蜂蜜和中润肺止咳为使药。诸药相合，使肺气肃，痰涎消散，咳嗽自止。

【应用】 本方为治疗肺热鼻流脓涕的常用方，用于治疗化脓性鼻炎。若上焦热盛，加黄芩、栀子、黄连、柴胡以清热解毒；咽喉敏感，加玄参以养阴生津。

【方歌】 百合散治鼻出脓 花粉大黄贝甘同 蜂蜜荞面萝卜汤 降火清痰此方雄

辛夷散(《中兽医治疗学》)

【组成】 辛夷 60g 酒知母 30g 酒黄柏 30g 沙参 30g 木香 15g
郁金 30g 明矾 20g

为末，开水冲服，候温灌服。

【功效】 清热滋阴，疏风通窍。

【主治】 脑额鼻脓。证见涕液稀白或呈豆腐渣样，恶臭，鼻部肿胀，叩之呈浊音，多为一侧性。

【方解】 本方证为脑额鼻脓。额窦鼻腔受外伤或六淫之邪侵袭，邪毒郁积，化而成脓。方中辛夷上通额窦鼻腔，疏散邪毒为主药；辅以知母、黄柏酒浸上行而清热解毒；沙参养阴润肺，郁金活血化瘀，木香调理气机，明矾收敛固涩，均为佐药。诸药相合，清热滋阴，疏风通窍。

【应用】 本方为治脑额鼻脓的专用方。凡鼻窦炎、副鼻窦炎、上颌窦蓄脓属肺热上蒸者，均可酌情加减运用。病初有热者，可加荆芥、薄荷、桑叶等以疏散风热；热盛者，加银花、连翘、蒲公英等以清热解毒；脓多而腥臭者，加桔梗、贝母等以排脓散结；鼻骨肿痛者，加乳香、没药，或骨碎补、姜黄、红花、土鳖虫活血散瘀消肿。

【方歌】 辛夷散治脑额方 酒炒知柏沙参良 木香郁金和明矾 诸药相合效力彰

第十二章 温里方

以温热药为主组成，具有温中散寒，回阳救逆，温经通脉等作用，用于治疗里寒证的一类方剂，称为温里方或祛寒方。属“八法”中的“温法”。

寒证，有表寒和里寒之别。表寒证当用辛温解表方治疗，已在解表方中论述，本节专论治疗里寒证的方剂。

里寒证的形成，不外乎寒邪直中与寒从内生两个方面，根据“寒者热之”的原则，应以温里祛寒的药物治疗。由于寒邪所侵脏腑经络的不同，以及病情轻重缓急的差异，温里方可分为温中散寒、回阳救逆、温经散寒三类。又因寒邪易伤阳气，故本类方剂中还经常配伍助阳补气的药物。

温中散寒方：常以干姜、吴茱萸等药物为主组成，适用于中焦脾胃虚寒证。

回阳救逆方：常以附子、肉桂、干姜等药物为主组成，适用于脾肾阳虚、心肾阳虚之阴寒重证。

温经散寒方：由温经散寒的桂枝、细辛和养血和血的当归、熟地、白芍等药物组成，适用于寒凝经脉的痹证。

温里方多由辛热温燥之品组成，应用时应首先辨明寒热真假，真热假寒决非所适；其次，对阴虚或失血动物，当注意用量，切不可过量。

理中汤（《伤寒论》）

【组成】 党参 60g 干姜 60g 炙甘草 60g 白术 60g

水煎服，或共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 补气健脾，温中散寒。

【主治】 脾胃虚寒证。证见慢草不食，腹痛泄泻，完谷不化，口不渴，口色淡白，脉象沉细或沉迟。

【方解】 本方为温中散寒的代表方。脾主运化而升清阳，胃主受纳而降浊。脾胃虚寒，升降失职，故出现食欲减退、腹痛泄泻等症。治宜温中祛寒，补气健脾，助运化而复升降。方中干姜辛热温中焦脾胃而祛里寒，为主药；党参甘温，益气健脾，助干姜振脾胃之升降，为辅药；脾虚则生湿，以白术燥湿健脾，为佐药；炙甘草益气和中而调诸药，为使药。四药合用，温中焦之阳，补脾胃之虚，复升降之常，升清降浊，共奏“理中”之效。

【应用】 本方是治疗脾胃虚寒的代表方剂。对于脾胃虚寒引起的慢草不食、腹痛泄泻等均可应用，如慢性胃肠炎、胃及十二指肠溃疡等属脾胃虚寒者。寒甚者，重用干姜；虚甚者，重用党参；呕吐者，加生姜、吴茱萸；泄泻甚者，加肉豆蔻、诃子。本方加附子，名附子理中汤（《和剂局方》），温阳祛寒，益气健脾，主治脾胃虚寒，腹痛，泄泻，四肢厥逆，拘急等。

【方歌】 理中汤主理中乡 甘草党参术干姜 腹痛泄泻阴寒盛 祛寒健脾是妙方

【参考】 药理研究证明，该方能降低胃液中游离盐酸浓度，从而减轻对黏膜的侵蚀和减少胃蛋白酶激活，促进醋酸型胃溃疡愈合，促进黏膜细胞再生修复，从而发挥抗溃疡作用。本方还具有调整肾上腺皮质功能、提高中枢神经系统兴奋性、促进骨髓造血机能、提高基础代谢率等作用。现代研究表明，本方能明显抑制正常小鼠及大黄所致脾虚小鼠、新斯的明负荷小鼠的小肠推进运动，能拮抗乙酰胆碱、氯化钡引起的肠管强直性收缩；但对肾上腺素所致的肠管运动抑制无明显作用。本方还对实验性胃溃疡的愈合有明显促进作用。

吴茱萸汤（《伤寒论》）

【组成】 吴茱萸 30g 党参 30g 大枣 20g 生姜 30g

共为末，开水冲调，候温灌服，或煎汤服。

【功效】 温肝暖胃，降逆止呕。

【主治】 肝胃虚寒证。证见肚腹疼痛，呕吐呃气，口吐涎沫，舌淡苔白滑，脉细迟。

【方解】 本方为肝胃虚寒而设。方中吴茱萸温胃散寒，开郁化滞，下气降逆，为主药；党参补虚益胃，为辅药；生姜为止呕圣药，散寒温胃，降浊阴，消痰涎，为佐药；大枣甘缓和中，助吴茱萸、党参温胃补虚，为使药。诸药合用，共奏温中散寒，益胃降逆之功。

【应用】 本方为治疗肝胃虚寒而呕吐严重的常用方剂：临床以肚腹疼痛，口吐涎沫，呕吐严重，四肢不温，口淡不渴，舌苔白滑，脉迟细为特征。呕吐甚，可加半夏、砂仁以增

强降逆止呕之功；阴寒甚，宜加干姜、附子等。凡呃逆严重者，应予冷服。有些动物服药后症状反而加剧，此为正常服药反应，约半小时后消失。

现代兽医临床常用于慢性胃炎、妊娠呕吐及原因不明的呕吐等属于脾胃虚寒者。

【参考】 药理研究表明，本方具有兴奋中枢神经、对胃酸缺乏性胃炎能使胃酸增高、和胃镇吐等作用。

茴香散（《元亨疗马集》）

【组成】 茴香 30g 肉桂 20g 槟榔 10g 白术 25g 巴戟天 25g 当归 30g
牵牛子 10g 藁本 25g 白附子 15g 川楝子 25g 肉豆蔻 15g
萆澄茄 20g 木通 20g

共为末，开水冲调，候温加炒盐 30g，醋 60ml，同调灌服。

【功效】 温肾散寒，祛湿止痛。

【主治】 风寒湿邪引起的腰胯疼痛。

【方解】 本方为治疗寒伤腰胯的常用方剂。方中茴香散寒理气，善入腰肾祛风寒邪气为主药。肉桂、萆澄茄、肉豆蔻温肾除寒，暖脾和中，行气止痛；巴戟天补肾壮阳，强筋骨，祛风湿；白术健脾燥湿；藁本、牵牛子、槟榔、木通祛风利湿，共为辅药。白附子、川楝子祛风止痛；当归活血止痛，同为佐药。盐、酒为引，入肾而活络为使药。诸药合用，温肾散寒，祛风除湿，通经止痛。

【应用】 本方以温肾散寒为主，临床用于治疗寒邪偏胜的寒伤腰胯疼痛。若湿邪偏重，加羌活、独活、秦艽、苍术等。《元亨疗马集》中有金铃散（肉桂、茴香、没药、当归、槟榔、防风、荆芥、肉苁蓉、木通、川楝子、肉豆蔻、萆澄茄、白附子），温肾祛湿，活血止痛，临证可与本方互参。

【方歌】 茴香散槟术肉桂 木通巴戟牵牛归 藁本白附川楝子 肉蔻澄茄共同播

【备注】《元亨疗马集》中名为茴香散的方剂尚有多，其组成和功能大致相近。《蕃牧纂验方》四时调理方中的茴香散（茴香、川楝子、青皮、陈皮、当归、芍药、荷叶、厚朴、元胡、牵牛、木通、益智仁各 15g），理气散寒，温肾活血，也可用于寒伤腰胯，与本方功能相近。

温脾散（《元亨疗马集》）

【组成】 当归 25g 厚朴 25g 陈皮 25g 青皮 25g 苍术 25g
益智仁 30g 牵牛子 15g 细辛 10g 甘草 20g

共为末，开水冲，候温加葱一把，醋 120ml，同调灌服，或煎汤服。

【功效】 温中散寒，理气活血。

【主治】 脾胃寒冷、冷痛等。证见腹痛剧烈，不时起卧，频频摆尾，前蹄刨地，肠鸣如雷，泻粪如水，鼻寒耳冷，口色青黄，口津滑利，脉象沉迟。

【方解】 本方为治马伤水冷痛的方剂。冷痛为冷热相击所导致的腹痛起卧之证，治宜暖肠逐水，调和气血，清利小便。方中益智仁、细辛温中祛寒，寒既祛则病因除，故为主药。青皮、陈皮、厚朴理气宽中；当归活血，气血调和则腹痛可止，共为辅药。苍术燥湿健脾；牵牛子逐水，二药配合温肠逐水，为佐药。甘草缓中，调和诸药；葱温中通阳；醋活血止痛，共为使药。诸药合用，共奏温中散寒、理气活血、止痛之效。

【应用】 用于治疗冷痛。一般在原方基础上加减使用。

【方歌】 温脾散治冷水伤 肠鸣起卧痛难当 青陈术朴当归草 细辛益智葱醋帮

【备注】 《元亨疗马集》另一温脾散(茴香、苍术、厚朴、防风、枳壳、芍药、细辛、陈皮、青皮、甘草、当归、姜、酒)治疗牛的水伤病，作用与本方相近。

益智散(《元亨疗马集》)

【组成】 益智仁 30g 肉豆蔻 25g 广木香 10g 五味子 20g 槟榔 10g
草果 25g 细辛 10g 青皮 25g 厚朴 30g 当归 25g
川芎 15g 白术 30g 官桂 20g 砂仁 15g 芍药 30g
白芷 15g 枳壳 25g 甘草 15g 生姜 10g 大枣 30g
共为末，开水冲调，候温加醋 120ml 灌服；或水煎，候温加醋 120ml 灌服。

【功效】 温脾暖胃，行气降逆。

【主治】 马翻胃吐草。证见精神倦怠，四肢无力，鼻浮面肿，毛焦肱吊。

【方解】 本方证多因外感内伤，脾胃受寒，脾虚不能运化水谷精微，胃寒不能腐熟水谷所致。治宜温中健脾，行气降逆。方中益智仁温中健脾为主药；官桂、肉豆蔻、砂仁、白芷、细辛、五味子助主药温中散寒为辅药；木香、厚朴、槟榔、青皮、草果、枳壳理气导滞，行气降逆，当归、川芎、芍药养血敛阴，白术健脾燥湿，共为佐药；甘草补气兼调和诸药，大枣甘缓和中，生姜散寒，食醋活血通经，皆为使药。各药相合，共奏温中散寒、行气健脾之效。

【应用】 用于马翻胃吐草及其它脾胃虚寒证。本方中辛散药物较多，临床应用时可减去白芷、细辛。体弱消瘦者，加党参、黄芪以补气扶正。翻胃吐草或骨软症状显著者，可酌加龙骨、牡蛎、苍术等。

【方歌】 翻胃吐草益智散 芎归芍蔻味术甘 木香槟榔辛果桂 青砂朴芷壳同煎

【备注】 《司牧安骥集》中也有益智散(槟榔、肉豆蔻、桂心、厚朴、当归、益智仁、芍药、木香、五味子、白芷、细辛、青皮、枳壳、蜜、酒)，主治马的五劳七伤，骑损起卧，

头垂向地，鼻冷，亦治伤水冷痛，功能与本方相近。《元亨疗马集》中另有益智散，其组成、功效及主治与《司牧安骥集》中的益智散完全相同。

桂心散(《元亨疗马集》)

【组成】 桂心 20g 青皮 15g 益智仁 20g 白术 30g 厚朴 20g
干姜 25g 当归 20g 陈皮 30g 砂仁 15g 五味子 15g
肉豆蔻 15g 炙甘草 15g

共为末，开水冲调，候温加炒盐 15g、青葱 3 根、酒 60ml 灌服，或水煎汁，候温灌服。

【功效】 温中散寒，健脾理气。

【主治】 脾胃阴寒所致的吐涎不食，腹痛，肠鸣泄泻等证。

【方解】 本方为治马脾胃阴寒的方剂。脾胃阴寒皆因久渴失饮，空腹饮冷水太过，或食冰冻草料，或寒邪直中，阴寒之气积于脏腑，寒湿流注脾经，传于胃，脾胃合之阴冷，土衰火弱不能运化所致。治宜温中散寒，健脾理气。方中桂心温中散寒，暖胃，为主药。干姜、砂仁、益智仁、肉豆蔻助主药温中散寒，增强温脾暖胃之力，为辅药。白术、五味子、厚朴健脾燥湿；青皮、陈皮、当归理气活血，共为佐药。甘草健脾和中，协调诸药，为使药。各药合用，温中散寒，健脾燥湿，活血理气。

【应用】 凡冷肠泄泻、胃寒草少、伤水腹痛者均可加减应用。若慢草不食重者，可加三仙各 30g；泄泻重者，可加猪苓 20g、泽泻 30g，去厚朴、当归；冷痛严重者，可加木香 15g，去五味子、肉豆蔻。

【方歌】 温脾暖胃桂心散 青陈术朴益智仁 姜砂归草五味蔻 炒盐大葱白酒饮

【备注】 《元亨疗马集》中还有桂心散(桂心、厚朴、当归、细辛、青皮、牵牛子、陈皮、桑白皮)，主治马冷饮过多，伤脾作泻，作用与本方相似。《司牧安骥集》的桂心散(牛蒡子、桂心、甘草、酒、猪脂)治乳痈，与本方有别。

四逆汤(《伤寒论》)

【组成】 熟附子 45g 干姜 45g 炙甘草 30g
水煎服，或共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 回阳救逆。

【主治】 少阴病或太阳病误汗亡阳。证见四肢厥逆，恶寒倦卧，神疲力乏，呕吐不渴，腹痛泄泻，舌淡苔白，脉沉微细。

【方解】 本方为肾阳衰微，阴寒内盛而设，是回阳救逆的代表方剂。四肢为诸阳之本，

肾阳为一身阳气之根。阳气不足，阴寒内盛，阳气不能敷布周身，故四肢厥冷；脾。肾阳衰，故呕吐，腹痛泄泻，下利清谷；阴盛阳衰，则神疲力乏，恶寒倦卧；阳气虚衰，不能鼓动血液运行，则见脉象沉微。当此阳衰证急之时，非用大辛大热纯阳之品不能破阴寒而复阳气。方中附子大辛大热，祛散寒邪，救命门火衰，为回阳救逆第一要药，为君药。“附子无干姜则不热”，干姜温脾散寒，助附子回阳救逆，为臣药。炙甘草和中益气，并缓和姜、附燥烈之性。三药合用，药简效宏，有回阳救逆之功。

【应用】 本方剂以四肢厥冷、神疲力乏、舌苔淡白、脉微沉细为应用要点。临床实践中，若因急性胃肠炎、大汗、大泻、阳虚阴盛而致的四肢厥逆，均可用本方治疗。若正虚体衰，加入人参或党参，名四逆加入参汤（《伤寒论》），以益气复阴与回阳救逆兼顾。

现代临床常用于急性心衰、休克、急慢性胃肠炎吐泻失水过多，或急性病大汗出而见休克等属阴盛阳衰者。

本方中皆为纯阳药物，若为阳热郁闭、邪热内陷之真热假寒四肢厥冷者，则不宜应用。

【方歌】 四逆汤中草附姜 四肢厥冷急煎尝 腹痛吐泻脉沉微 救逆回阳赖此方

【参考】 现代药理研究证明，本方具有强心、抗休克、升压等作用，能够兴奋心脏及胃肠功能，促进血液循环而治疗新陈代谢机能低下或衰竭的虚脱。

丁香散（《元亨疗马集》）

【组成】 丁香 30g 汉防己 45g 当归 30g 茴香 60g 官桂 20g
麻黄 20g 川乌 20g 元胡 20g 羌活 30g

共为末，开水冲调，候温加葱一把、温酒 120ml，同调灌服，亦可水煎服。

【功效】 温肾壮阳，祛风除湿。

【主治】 内肾积冷，腰胯疼痛。

【方解】 本方为治内肾积冷，腰胯疼痛之剂。寒性收引主痛，内肾积冷，气滞不行，则腰胯疼痛。治宜温肾壮阳，祛风除湿。方中丁香、官桂、川乌温肾壮阳，为主药。麻黄解表散寒为辅药。茴香、羌活暖肾祛风湿；元胡活血通经，行气止痛，共为佐药。葱、酒通阳活血，为使药。诸药合用，共奏温肾壮阳，祛风除湿之效。

【应用】 寒伤腰胯疼痛。凡因肾受风寒湿邪所致腰胯疼痛诸证，均可加减应用。

【方歌】 丁香散中防己当 川乌元胡桂麻羌 茴香葱酒同调服 逐冷发表肾家康

阳和汤（《外科证治全生集》）

【组成】 熟地 90g 白芥子 15g 肉桂 15g 鹿角胶 25g 炮姜 10g
麻黄 10g 生甘草 20g

水煎服，或共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 温阳补血，散寒通滞。

【主治】 阴疽疮疡。证见患处漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，不渴，舌苔淡白，脉沉细。

【方解】 本方为治疗外科阴疽的著名方剂。阴疽常因素体阳虚，阴寒之邪乘虚侵袭，阻于筋骨血脉之中，致血虚寒凝痰滞而成。治宜温阳补血，散寒通滞。方中重用熟地，温补肝肾，滋阴养血，为主药。鹿角胶补肾填精，强筋壮骨，为辅药。麻黄辛温宣散，发越阳气；白芥子祛痰除湿，内外宣通，二药合用可宣通气血，使熟地、鹿角胶补而不滞；炮姜、肉桂均入血分，温经散寒，皆为佐药。生甘草清热解毒，调和诸药为使药。诸药合用，共奏补阴血，温阳气，解寒凝，消痰滞之功，使精血充盛，阴破阳和，则阴疽自愈。

【应用】 本方为治疗阴证疮疡的常用方剂。以患处漫肿不红，舌淡脉细为应用要点。若兼气虚，加党参、黄芪以益气补血；阴寒甚者，酌加附子等以助其温阳散寒。

现代临床常用于治疗骨结核、腹膜结核、慢性骨髓炎、肌肉深部脓肿、慢性淋巴结炎、风湿性关节炎等属血虚寒凝者。

本方中药多温燥，凡痈肿疮疡属于阳证、阴虚有热或阴疽久溃者，均不宜使用。方中麻黄阴疽未溃者可用，已溃者不宜。

【方歌】 阳和汤方治阴疽 麻桂鹿胶炮姜地 甘草白芥同煎服 温补通滞疮自愈

【参考】 现代药理研究证明，本方有强心利尿、扩张血管、抑制血小板聚集、增加白细胞数量、激素样作用及保肝、利胆、抑菌、抗甲状腺功能亢进和调节性腺等作用。

参附汤（《校注妇人良方》）

【组成】 人参 45g 制附子 30g

水煎服，或研末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 回阳，益气，救脱。

【主治】 阳衰气脱，元气大亏。证见汗出肢冷，呼吸微弱，脉微欲绝。

【方解】 本方是急治由阳衰气脱所致四肢厥逆、汗出气短、呼吸微弱、脉微欲绝的名方。阳衰气脱，一则不能温通四肢而致四肢厥冷，二则不能鼓动血液运行而致脉微。因元气大伤，故见冷汗自出，气息微弱。治宜温阳，益气，固脱。方中人参甘温，大补后天之元气；附子辛热，温壮先天之元阳。二药相须为用，上救心阳，下温命门，共收挽垂危于顷刻，扶阳气于将亡之捷效，为挽救垂危之良方。

【应用】 本方为回阳固脱的代表方。以四肢厥逆，呼吸微弱，汗出脉微为应用要点。凡大病虚极欲脱、产后或痈肿疮疡溃久及手术失血等血脱亡阳者，均可应用。

目前临床多用于休克及心力衰竭、心律失常而致四肢厥冷，脉微欲绝，大汗不止等阳衰

气脱之证。

本方与四逆汤均为回阳救逆之剂，主治阴盛阳衰之四逆证，但四逆汤所治病在脾肾，阳虽衰而气未脱；而本方所治病及心肾，阳衰气脱，证情严重。

【方歌】 参附汤是急救方 补气回阳效力强

【参考】 本方有明显改善心功能及强心抗休克的作用，对血压呈双向调节作用，能够防止内毒素中性粒细胞脱颗粒作用，可以降低血浆蛋白质和脂质含量，对细胞免疫和抗体形成功能有促进作用。

第十三章 祛湿方

以祛湿药物为主组成，具有化湿利水、祛风除湿作用，治疗水湿和风湿病证的一类方剂，称为祛湿方。

湿邪为病，有外湿、内湿之分，所犯部位有上下表里之别。外湿由外感受，常伤及畜体肌表经络；内湿由内而生，多因由脾失健运所致，常常伤及脏腑气血。外湿内湿为病，有时相互兼见。

湿邪又多与风、寒、暑、热等邪气相挟，并有化热、化寒的转机。

临床治疗时，首先应辨别湿邪所在部位的内外上下。在外在上，宜微汗以解之；在内在下，宜健脾行水以利之。其次，应审其寒热虚实。如湿从寒化，宜温阳化湿；湿从热化，宜清热祛湿；体虚湿盛者，宜祛湿与扶正兼顾；水湿壅盛脉证俱实者，宜用逐水之方。

根据治法的不同，祛湿方一般分为祛风湿、利水和化湿三类。

祛风湿方：适用于风寒湿邪侵袭肌表经络所致的痹痛等证，常以独活、羌活、秦艽、桑寄生等祛风胜湿药为方中主药。

利水方：适用于水湿停滞所引起的各种病证，如小便不利、泄泻、水肿、尿淋、尿闭等，常以茯苓、猪苓、泽泻、车前子、木通、滑石等渗湿利水药为方中主药。

化湿方：适用于湿浊内阻，脾为湿困，运化失职之证，常以苍术、藿香、陈皮、砂仁、草豆蔻等芳香燥湿药为方中主药。

本类方剂多属于辛温香燥或淡渗利水之品，容易伤阴耗液，对津液亏损之证，一般不宜使用，必要时须配伍养阴药同用。此外，湿邪重着黏腻，易于阻碍气机，故祛湿剂中，常配伍理气药，以求“气化则湿亦化”。

独活散（《元亨疗马集》）

【组成】 独活 30g 羌活 30g 防风 30g 肉桂 30g 泽泻 30g 酒黄柏 30g 大黄 30g 当归 15g 桃仁 10g 连翘 15g 汉防己 15g 炙

甘草 15g

研为细末，开水冲，候温加酒 120ml，同调灌服。

【功效】 疏风祛湿，活血止痛。

【主治】 风湿痹痛。证见腰胯疼痛，项背僵直，四肢关节疼痛，肌肉震颤等。

【方解】 本方适用于因汗出当风，或久处潮湿之地，外感风湿之邪，着于腰胯，郁于腠理，营卫受阻所致的风湿证。方中独活、羌活、防风疏风祛湿，逐邪外出，为君药。辅以肉桂、泽泻、防己化气行水，祛湿下行，以助君药祛除湿邪为臣药。当归、桃仁、大黄活血化瘀止痛；黄柏、连翘清热燥湿解毒，共为佐药。炙甘草温中，调和诸药，为使药。诸药相合，共收疏风祛湿，活血止痛之效。

【应用】 风湿性腰胯疼痛。

【方歌】 独活散用羌防草 归柏大黄桃翘饶 桂泻防己专利湿 风湿腰痛力能疗

防风散（《元亨疗马集》）

【组成】 防风 30g 独活 25g 羌活 25g 连翘 15g 升麻 25g 柴胡 20g
制附子 15g 乌药 20g 当归 25g 葛根 20g 山药 25g 甘草 15g
研为细末，开水冲调，候温灌服，或煎汤服。

【功效】 宣散表湿，调和气血。

【主治】 肌表风湿。证见恶寒微热，肌肉紧硬，腰肢疼痛。

【方解】 本方证为风湿在表之痹痛，治宜祛风胜湿。方中防风、羌活、独活宣散肌表及周身之风湿，利关节而通痹，为主药。升麻、柴胡、葛根升散在表之风湿，以助主药宣散周身表湿，为辅药；山药壮腰肾而祛湿，附子温阳气而除寒，乌药理气，当归活血，连翘防寒化热，均为佐药；甘草调和诸药为使药。诸药合用，具有散表湿、祛寒邪、理气血的功能。

【应用】 本方对于风湿在表，里有寒邪之痹痛较为合适。凡感冒、肌肉风湿、风湿性关节炎等属于风湿在表者，均可酌情使用本方。若湿热重，关节疼痛跛行显著，可酌加苍术、黄柏、防己等以清热除湿；若寒重，宜去连翘、升麻、柴胡、葛根，加茴香、桂枝。

【方歌】 防风散用草二活 乌药山药归柴葛 升附温散寒以解 防寒化热连翘合

【备注】 《元亨疗马集》中还有治疗创伤、疮疡溃破、直肠脱、阴道脱等的防风汤（防风 30g、荆芥 30g、花椒 30g、薄荷 30g、苦参 30g、黄柏 30g）和主治马直肠脱的防风散（防风、荆芥、花椒、白矾、苍术、艾叶）。药味组成和功能主治均与本方不同，应加以区别。

独活寄生汤（《备急千金要方》）

【组成】 独活 30g 桑寄生 45g 秦艽 30g 防风 25g 细辛 6g 当归 30g

白芍 25g 川芎 15g 熟地 45g 杜仲 30g 牛膝 30g 党参 30g
茯苓 30g 桂心 15g 甘草 20g

水煎服，或研末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 益肝肾，补气血，祛风湿，止痹痛。

【主治】 风寒湿痹，肝肾两亏，气血不足诸证。证见腰膝疼痛，四肢关节屈伸不利、疼痛，筋脉拘挛，脉沉细弱等。

【方解】 本方是治疗风寒湿痹日久，肝肾不足，气血两虚证的方剂。方中以独活、秦艽、防风、细辛祛风湿，止痹痛，为主药。重用桑寄生，配伍杜仲、牛膝以益肝肾，强筋骨，兼祛风湿，为辅药。当归、川芎、白芍、熟地养血兼活血；党参、茯苓补气健脾；桂心温通血脉，共为佐药。甘草益气扶正，调和诸药为使。诸药合用，祛邪扶正，标本兼治，使气血足而风湿除，肝肾强而痹痛愈。

【应用】 本方为治疗痹证日久，肝肾气血不足之证的常用方剂。临床上对肝肾两虚，风寒湿三气杂至，痹阻经脉导致的慢性肌肉风湿、腰膝及四肢关节疼痛、慢性风湿性关节炎及牛产后瘫痪等皆可酌情加减应用。若疼痛较甚者，可加制川乌、红花、地龙、白花蛇等；寒邪偏重者，可加附子、干姜；湿邪重者，加防己、苍术。

【方歌】 独活寄生艽防辛 芎归地芍桂苓君 杜仲牛膝党参草 冷风顽痹能屈伸

【参考】 实验研究证明本方有抗炎、镇痛、扩张血管等作用，对免疫功能也有一定影响。

滑石散（《元亨疗马集》）

【组成】 滑石 60g 泽泻 25g 灯心草 15g 茵陈 25g 知母 25g
酒黄柏 25g 猪苓 20g

研为细末，开水冲调，候温灌服，或水煎服。

【功效】 清热化湿，利尿通淋。

【主治】 马胞转，即小便不利。证见尿液短赤、淋漓，肚腹胀痛，蹲腰踏地，欲卧不卧，打尾刨蹄等。

【方解】 本方证系由湿热积滞，膀胱气化功能受阻所致。方中滑石性寒而滑，寒能清热，滑能利窍，兼清热利尿之功为主药；茵陈、猪苓、泽泻清利湿热，助主药利水，为辅药；知母、黄柏清热泻火为佐药；灯心草清热利水，引湿热从小便而出，为使药。诸药相合，共收清热、利湿、通淋之功。

【应用】 小便短赤或淋漓不尽的原因较多，而本方主要用于膀胱湿热所致的尿闭或小便不利。凡膀胱炎、尿道炎、膀胱麻痹、膀胱括约肌痉挛所引起的尿闭、小便不利，属于湿热证者，均可加减应用。若湿热重而出现黄疸，加栀子、黄芩、大黄等，以加强清热除湿作

用；血淋，可配伍瞿麦，增强清热凉血、利尿通淋作用。

【方歌】 滑石散中泽灯心 知柏茵陈加猪苓 热淋有血加瞿麦 膀胱湿热服之宁

活络丹(《和剂局方》)

【组成】 制川乌 180g 制草乌 180g 地龙 180g 制天南星 180 乳香 60g
没药 60g

共为细末，酒面糊为丸。兽医临床可作散剂用，加陈酒适量灌服。

【功效】 驱风活络，祛湿止痛。

【主治】 寒湿痹痛及湿痰留滞经络，肢体疼痛，关节屈伸不利等证。

【方解】 风寒湿邪或湿痰留阻经络，致使气血不能宣通，营卫不得通畅，故出现肢体麻木疼痛等症。治宜搜风祛湿，温经逐瘀。方中川乌、草乌散寒祛风，温经通络为君药；臣以南星燥湿化痰，驱风活络；乳香、没药行气活络止痛为佐药；地龙通经活络，酒助药势，引导诸药直达病所，为使药。各药合用，发挥疏风活络，祛湿止痛之功效。

【应用】 本方多用于马、牛日久不愈的着痹，以及湿痰瘀血留滞经络的病证。方中燥烈的药物较多，药力峻猛，宜用于体质强壮的动物，体质弱或阴虚有热及孕畜忌用。

【方歌】 活络丹用胆南星 二乌乳没地龙寻 酒面糊丸能通络 风寒湿邪闭在经

【备注】 为与《圣惠方》中的大活络丹区别，本方又名小活络丹。

五苓散(《伤寒论》)

【组成】 猪苓 30g 茯苓 30g 泽泻 45g 白术 30g 桂枝 25g

共为细末，开水冲调，候温灌服，或煎汤服。

【功效】 渗湿利水，温阳化气，和胃止呕。

【主治】 外有表证，内停水湿。证见发热恶寒，口渴贪饮，小便不利，舌苔白，脉浮。亦可治水湿内停之水肿、泄泻、小便不利或痰饮、吐涎等证。

【方解】 本方具有化水行气之效，是利尿消肿的常用方剂。水湿内停兼有表证，治宜利水渗湿，温阳化气，兼解表邪。方中重用泽泻，甘淡性寒，渗湿利水，为主药。以茯苓、猪苓淡渗，助主药以增强利水饮之力；加白术健脾燥湿，运化水湿，共为辅药。又以桂枝通阳化气，疏散表邪为佐药。五药合用，有行水化气，健脾除湿兼解表邪之效。

【应用】 本方是利尿消肿的常用方剂。临床上凡脾虚不运，气不化水之水湿内停、小便不利、或为蓄水、或为水逆、或为痰饮、或为水肿、泄泻等，均可以本方加减治疗。若无表证，可将方中桂枝改为肉桂，以增强除寒化气利水的作用。本方合平胃散(陈皮、苍术、厚朴、甘草)名胃苓汤，具有行气利水、祛湿和胃的作用，用于治疗寒湿泄泻，腹胀，水肿，

小便不利；本方加茵陈，名茵陈五苓散，具有利湿清热退黄疸的作用，治疗湿热性黄疸；本方去桂枝名“四苓散”，功专渗湿利水，治脾虚湿阻，粪便溏泻。

现代临床常用于治疗肾炎、心源性水肿、急性肠炎、尿潴留等属于水湿内停者。

【方歌】 五苓散是治水方 泽泻白术猪茯苓 桂枝化气兼解表 小便不利水饮除

【参考】 现代药理研究证明，五苓散具有抗菌、抗病毒和保肝、利尿、抗凝血、降糖等作用。

八正散(《和剂局方》)

【组成】 木通 30g 瞿麦 30g 车前子 45g 篇蓄 30g 滑石 10g 甘草梢 25g
栀子 25g 大黄 25g 加灯心草 10g
共为细末，开水冲调，候温灌服，或水煎服。

【功效】 清热泻火，利水通淋。

【主治】 湿热下注引起的热淋、石淋。证见尿频、尿痛或闭而不通，或小便浑赤，淋漓不畅，口干舌红，苔黄腻，脉象滑数。

【方解】 本方为苦寒通利之剂，所治之证系湿热下注膀胱所致。湿热结于膀胱，则小便涩痛，淋漓不尽，甚至闭而不通；邪热内蕴，故口干舌红，苔黄，脉象滑数。治宜清热泻火，利水通淋。方中木通、瞿麦、车前子、篇蓄、滑石清热利湿，利水通淋，为主辅药。栀子、大黄泄热降火，导热下行为佐药。灯心草清心利水，甘草梢调和诸药，缓急止痛为使药。诸药合而用之，共奏清热通淋之功。

【应用】 本方为治疗热淋的常用方剂。凡淋证属于湿热者，均可用本方加减治疗。若治血淋，宜加小蓟、白茅根以凉血止血；如有结石(石淋)，宜加金钱草、海金沙、石苇以化石通淋；如小便浑浊(膏淋)，宜加萆薢、菖蒲以分清化浊；内热甚，加蒲公英、金银花等，以清热解毒。

临床上，本方被广泛用于治疗泌尿系感染、泌尿系结石、急性肾炎等属于下焦湿热者。

【方歌】 八正车前和木通 大黄栀滑加扁蓄 瞿麦草梢灯心草 热淋血淋病能祛

【参考】 现代药理研究证明，本方具有抗大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等多种细菌的作用和较好的利尿作用。

藿香正气散(《和剂局方》)

【组成】 藿香 90g 紫苏 30g 白芷 30g 大腹皮 30g 茯苓 30g 白术 60g
半夏曲 60g 厚朴(姜汁炙) 60g 桔梗 60g 炙甘草 75g
共为末，生姜、大枣煎水冲调，候温灌服，或水煎灌服。

【功效】 解表化湿，理气和中。

【主治】 外感风寒，内伤湿滞，中暑。证见发热恶寒，肚腹胀满、疼痛，呕吐，肠鸣泄泻，舌苔白腻，脉象滑。

【方解】 本方证由外感风寒，内伤湿滞，清浊不分，升降失常所致。外感风寒，卫阳被郁，则恶寒发热；湿浊内阻，气机不畅，则胸腹胀满，肚腹疼痛；湿滞肠胃，清气不升，浊气不降，则恶心呕吐，肠鸣泄泻；而舌苔白腻为湿郁之象。治宜外散风寒，内化湿浊，兼以和中理气。方中重用藿香，既能辛散风寒，又能芳香化浊，和中止呕，为主药。配以紫苏、白芷辛香发散，助藿香外解风寒，芳香化浊，为辅药。用半夏曲、陈皮燥湿和胃，降逆止呕；茯苓、白术健脾运湿，和中止泻；厚朴、大腹皮行气化湿，畅中除满；桔梗宣肺利膈，既利于解表，又益于化湿，共为佐药。生姜、大枣、甘草调和诸药为使药。诸药合用，外散风寒，内化湿浊，升清降浊，气机通畅，诸证自愈。

【应用】 本方为治外感风寒、内伤湿滞的常用方。对暑月感冒，中暑，脾胃失和者最为适宜。如表邪偏重，恶寒无汗，可加香薷以助其解表；如兼食积，可加炒莱菔子、焦三仙以消食导滞；如泄泻严重，加白扁豆、薏苡仁以祛湿止泻；若小便短少，可加泽泻、车前子以利水除湿。

现代兽医临床上常用本方加减治疗家畜急性胃肠炎、胃肠型感冒、消化不良等属于外感风寒、内伤湿滞者和牛的流行热等。

本方作汤剂时，不宜久煎，以免药性耗散，影响疗效。

【方歌】 藿香正气陈甘桔 腹皮苓术加厚朴 白芷紫苏加姜枣 风寒暑湿皆能除

【参考】 药理研究证明，本方有抑制胃肠平滑肌痉挛而止痛、止泻、止痢及调整胃肠功能和发汗解热、抗菌、抗病毒等作用。

五皮饮（《华氏中藏经》）

【组成】 桑白皮 60g 陈橘皮 60g 生姜皮 60g 茯苓皮 60g 大腹皮 60g

水煎服，或共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 健脾化湿，利水消肿。

【主治】 脾虚湿盛，水肿及妊娠水肿。证见头面四肢水肿，小便不利，胸腹胀满，呼吸喘促，舌苔白腻，脉象沉缓。

【方解】 本方为较平和的利水消肿，治疗皮肤水肿的常用方剂。脾虚湿盛，运化失常，水湿泛滥，故全身水肿，肢体沉重；湿阻气机，则胸腹胀满，上逆迫肺使呼吸喘急；水湿壅盛，水道不通，故小便不利。治宜健脾化湿，利水消肿。方中以茯苓皮淡渗利湿，健脾和中为主药。陈皮芳香化湿，理气健脾，和胃气，为辅药。桑白皮肃降肺气，通调水道，泻肺行水；大腹皮下气行水，消胀满，共为佐药。生姜皮辛散，通行全身而散水气，为使药。五药

相合，健脾化湿，水湿得利，则水肿自消。

【应用】 本方为治疗皮肤水肿的通用方剂。凡脾虚湿盛，泛滥皮肤所致全身水肿，四肢、腹下水肿，小便不利，或妊娠浮肿等均可加减应用。脾虚甚者，宜加白术、党参、黄芪以补气健脾；腰以前水肿，加紫苏、秦艽、防风、羌活以散风除湿；腰以后水肿，小便短少者，常与五苓散合用，以增强利水消肿之功；肾阳虚者，加附子、肉桂、干姜以温阳利水。本方去桑白皮，加五加皮，亦称五皮饮（《医方集解》），利水兼祛风湿，主治与本方基本相同。《和剂局方》中的五皮散为本方去桑白皮、陈皮，加五加皮、地骨皮所组成，主治亦基本相同，但行气之力较差。

【方歌】 五皮饮用五种皮 姜桑苓陈大腹皮 或以五加易桑白 脾虚腹胀服之宜

【参考】 本方有一定的利尿作用，能够增强消化机能，促进血液循环，对于肾性水肿、心性水肿均有较好的治疗作用。

防己散（《中兽医治疗学》）

【组成】 防己 30g 黄芪 30g 茯苓 30g 桂心 20g 胡卢巴 30g
厚朴 25g 补骨脂 30g 泽泻 30g 猪苓 30g 川楝子 30g
巴戟天 30g 牵牛子 20g

共为末，开水冲调，候温灌服，或水煎服。

【功效】 补肾健脾，利水除湿。

【主治】 肾虚腿肿。

【方解】 本方为治疗肾虚腿肿的方剂。因为肾虚命门火衰，水湿不能蒸化，导致水湿流注肢体，形成水肿。治宜补肾健脾，利水除湿。方中用桂心、卢巴子、巴戟天、补骨脂温肾壮阳，蒸化水湿，为主药。川楝子舒肝行气止痛，善行后焦，协同防己、猪苓、泽泻、牵牛子等利水药，导水湿外出，皆为辅药。黄芪补中益气，厚朴、茯苓健脾利水消肿，均为佐药。诸药合用，共奏补肾健脾、利水除湿之功。

【应用】 临床根据病情加减，治疗肾虚火衰、水湿流注肢体的水肿证。

【方歌】 防己散中芪桂朴 二丑卢巴随巴戟 二苓故纸楝己泽 肾虚腿肿服之宜

平胃散（《和剂局方》、《元亨疗马集》）

【组成】 苍术 60g 厚朴 45g 陈皮 45g 甘草 20g 生姜 20g 大枣 90g
共为末，开水冲调，候温灌服，或水煎服。

【功效】 健脾燥湿，行气和胃，消胀除满。

【主治】 胃寒食少，寒湿困脾。证见食欲减退、肚腹胀满、大便溏泻、噯气呕吐、舌

苔白腻而厚、脉缓。

【方解】 本方为治湿滞脾胃的主方。脾主运化，喜燥恶湿，湿浊困阻脾胃，运化失司，则食欲减少，大便溏泻；湿阻气滞，则肚腹胀满；胃失和降，则暖气呕吐；舌苔白腻、脉缓为湿郁之象。治宜燥湿健脾，行气和胃，消胀除满。方中重用苍术，苦温性燥，除湿健脾，为主药。厚朴行气化湿，消胀除满，为辅药。陈皮理气化滞，和胃止呕为佐药。甘草甘缓和中，调和诸药；生姜、大枣调和脾胃，共为使药。诸药合用，共同发挥化湿浊、畅气机、健脾运、和胃气的作用。

【应用】 本方为健脾燥湿的基本方，临床治疗脾胃病证的许多方剂都由此演化而来。本方加藿香、半夏，名不换金正气散（《和剂局方》），化湿解表，和中止呕，主治脾虚胃寒，兼受外感而致的腹痛呕吐、肚腹胀满、寒热腹泻、舌苔白腻等证。加槟榔、山楂，名消食平胃散（《中华人民共和国兽药典·二部》2000 年版），主治寒湿困脾，宿食不化。加山楂、香附子、砂仁，名消积平胃散（《元亨疗马集》），主治马伤料不食。加神曲、草果、焦山楂、青皮、法半夏、槟榔、枳壳、枳实、焦麦芽，去陈皮，名承气平胃散（《牛医金鉴》），主治牛草伤脾胃。加砂仁、草果、枳实、青皮、山楂、山药、扁豆、牵牛子、车前子、前胡、木通，亦名平胃散（《抱犊集》），主治牛胃寒不食草，呕吐。如湿郁化热，加黄芩、黄连以清热燥湿；如属寒湿，加干姜、肉桂以温化寒湿；如兼见表证，加藿香或苏叶以芳香解表；如兼见食滞，加山楂、神曲以消食化滞；如气滞甚者，加砂仁、木香以行气宽中。

现代兽医临床经常用于治疗食欲减退、急慢性胃肠炎、胃肠神经官能症等属于湿郁气滞。

【方歌】 平胃散用苍术朴 甘草陈皮共四药 湿滞脾胃腹胀满 行气和胃有奇功

【参考】 现代药理研究证明，平胃散具有抗菌、抗溃疡、降血压、降血糖和解痉等作用。现代研究表明，本方之主药苍术，含挥发油 5%~9%。这种挥发油具有刺激胃肠运动的作用，有助于胃肠内容物的排空。实验证明，含苍术的复方，对在位犬肠管及离体兔肠管有兴奋蠕动的作用；对家兔肠管蠕动具有双向调整作用；并能增加胆汁分泌量，提高肠道碱性环境；还可使牛的瘤胃蠕动增强，促进纤毛虫增长，使瘤胃内容物的 pH 值下降。

第十四章 理气方

以理气药为主组成，具有调理气分，舒畅气机，消除气滞、气逆作用，用于治疗各种气分病证的方剂，称为理气方。

气分病证有气滞、气逆、气虚三种。一般地说，气滞以肝郁气滞和脾胃气滞为主，临床表现以胀、痛为特征；气逆以肺气上逆和胃气上逆为主，以咳嗽、气喘、呕吐、暖气等为主要表现；气虚则表现为气的不足。治疗时，气滞宜行气，气逆宜降气，气虚宜补气。因此，理气方的内容概括起来有行气、降气和补气三个方面，补气方和降气方分别在补虚方和化痰

止咳平喘方中介绍，本节仅介绍行气方。

行气方主要由辛温香窜的理气药或破气药组成，适用于肝郁气滞和脾胃气滞的病证，临床常见慢草、腹胀、腹痛、下痢、泄泻等。

本类方剂多辛温香燥，容易伤津耗气，临床应用时当中病即止，勿过量使用。此外，气滞常有寒热虚实之分，又兼有食积、痰湿、血瘀等不同，故应随证化裁，灵活配伍其它药物。

橘皮散(《元亨疗马集》)

【组成】 青皮 25g 陈皮 30g 厚朴 30g 桂心 15g 细辛 5g 茴香 30g
当归 25g 白芷 15g 槟榔 15g
共为末，开水冲，候温加葱白 3 支、炒盐 10g、醋 120ml，同调灌服。

【功效】 理气散寒，和血止痛。

【主治】 马伤水起卧。证见腹痛起卧、肠鸣如雷、口色淡青、脉象沉迟等。

【方解】 本方证为伤水腹痛起卧，伤水为本，腹痛为标。急则治其标，气滞血瘀则疼痛，气血通调，则疼痛可止。方中青皮、陈皮、当归理气活血为主药；水为阴邪，“阴盛则寒”，故以桂心、茴香、厚朴、大葱等辛温散寒之品，以驱里寒，均为辅药；白芷、细辛、槟榔等温经行水，以驱肠内积水为佐药；盐、醋引经为使药。诸药合用，具有理气活血，散寒止痛，温经行水之效。

【应用】 本方广泛用于治疗马属动物伤水冷痛。如小便不利，可加滑石、茵陈、木通；若肠鸣如雷，可加苍术。

【方歌】 橘皮散中青陈朴 辛桂茴香归芷和 槟榔醋葱炒盐入 伤水腹痛此方卓

【备注】 《元亨疗马集》中另有一方亦名为橘皮散，其组成除官桂易桂心外，还增加枳壳、白术、木通、甘草、砂仁、益智仁等六味，具有健脾理气、散寒止痛的作用，适用于脾胃虚寒引起的肚腹冷痛。《痊骥通玄论》中的厚朴散，即本方去槟榔，亦用于治疗马的冷痛。

健脾散(《元亨疗马集》)

【组成】 当归 30g 白术 30g 甘草 15g 菖蒲 25g 泽泻 25g 厚朴 30g
官桂 30g 青皮 25g 陈皮 30g 干姜 30g 茯苓 30g 五味子 20g
共为末，开水冲，候温加炒盐 30g、酒 120ml，同调灌服。

【功效】 温中行气，健脾利水。

【主治】 脾气痛。证见蹇唇似笑，肠鸣泄泻，摆头打尾，蹲腰卧地等。

【方解】 本方证系因冷伤脾胃，气失升降而致的腹痛作泻，法当温中行气，健脾利水。

方中厚朴、砂仁、干姜、官桂温中散寒为主药；青皮、陈皮、当归、菖蒲行气活血为辅药；白术、茯苓补脾燥湿，泽泻助茯苓行水，五味子补虚而止泻，均为佐药；使以甘草协调诸药。诸药合用，具有温中行气，健脾利水之效。

【应用】 用于脾胃虚寒、胃肠寒湿的腹痛、泄泻等证。寒重者，可加干姜；湿重者，则重用白术、五味子、茯苓，加猪苓、车前子；草谷不消者，加三仙(神曲、麦芽、山楂)；体质虚弱者，酌减理气药，加党参、黄芪等。

【方歌】 健脾散中朴青陈 苓泽菖归桂砂仁 五味术草姜盐酒 脾胃虚寒效果真

【备注】 本方为《元亨疗马集》中治疗脾气痛的方剂。此外，还有治疗宿水停脐的健脾散和治疗胃冷吐涎的健脾散。治疗宿水停脐的健脾散与本方相比较，除官桂易桂枝外，余药完全相同；治疗胃冷吐涎的健脾散为本方减去青皮、陈皮、茯苓、五味子，加枳壳、升麻、半夏、赤石脂，其功用偏于健脾暖胃，燥湿祛痰涎。

三香散(《中华人民共和国兽药典·二部》2000年版)

【组成】 丁香 25g 木香 45g 藿香 45g 青皮 45g 陈皮 45g
槟榔 15g 炒牵牛子 45g
水煎服，或为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 破气消胀，宽肠通便。

【主治】 胃肠胀气。

【方解】 本方为治疗马属动物原发性胃肠胀气的常用方剂。方中丁香温胃散寒，下气消胀为主药。木香、藿香理气和中止痛；青皮、陈皮理气解郁，疏肝和脾，共为辅药。槟榔、牵牛子宽肠导滞，为佐使药。诸药相合，共同发挥破气消胀，宽肠通便的功能。

【应用】 主要适用于马属动物原发性肠胀气。若属于继发性肠胀气，则不适于本方。此外对牛、羊瘤胃胀气亦可酌情加减应用。

【方歌】 丁香木香和藿香 青皮陈皮可理气 槟榔牵牛共宽肠 胃肠胀气用之良

消胀汤(《中兽医研究所研究资料汇集》)

【组成】 酒大黄 35g 醋香附 30g 木香 30g 藿香 15g 厚朴 20g 郁李仁 35g 牵牛子 35g 木通 20g 五灵脂 20g 青皮 20g 白芍 25g 枳实 25g 当归 25g 滑石 25g 大腹皮 30g 乌药 15g 莱菔子(炒) 30g 麻油(为引) 250g

先将醋香附、厚朴、郁李仁、牵牛子、木通、青皮、白芍、枳实、当归、大腹皮、乌药、莱菔子煎沸 15 分钟，加入酒大黄、藿香、木香、五灵脂，再煎 15

分钟，去渣取汁，再加入滑石、麻油，候温一次灌服。

【功效】 消胀破气，宽肠通便。

【主治】 马急性肠气胀。证见过食草料、阻滞胃肠、气机被郁、腹胀难消等。

【方解】 本方为破气消胀缓下之剂。过食草料，阻滞胃肠，腹胀难消，治宜破气消胀，宽肠通便。方中以酒大黄缓泻为主药；辅以枳实、厚朴、莱菔子、青皮、大腹皮理气宽中消胀，郁李仁、牵牛子、木通、滑石通利大小便，藿香醒脾除湿，当归、白芍、五灵脂、木香、香附、乌药活血理气以止痛，皆为佐药。诸药合用，宿草下行，二便通利，气血调畅，腹胀疼痛自消。

【应用】 本方随证加减，可用于治疗马、骡、驴等的急性肠气胀。

【方歌】 消胀酒军朴李通 青腹枳乌三香同 消灵归芍麻菔丑 急性气胀有奇功

越鞠丸(《丹溪心法》)

【组成】 香附 30g 苍术 30g 川芎 30g 六曲 30g 梔子 30g

水煎服，或研末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 行气解郁，疏肝理脾。

【主治】 由于气、火、血、痰、湿、食诸郁所致的肚腹胀满、噯气呕吐、水谷不消等属于实证者。

【方解】 本方长于发越郁滞，治疗气、火、血、痰、湿、食六郁之证。六郁之中，以气郁为主，气行则郁散。六郁之生成，主要是由于脾胃气机不畅、升降失常而致气郁，故见肚腹胀满、噯气呕吐、草谷不消等症。气郁可由湿、食、痰、火、血诸郁所致，气郁也可导致湿、食、痰、火、血诸郁。因此，本方重在行气解郁，调畅气机，气机通畅则血、湿、食、痰、火诸郁自解。方中香附行气解郁，以治气郁为主药；川芎行气活血，以治血郁诸痛；苍术燥湿健脾，以治湿郁；六曲消食和胃，以治食郁；梔子泻火清热，以治火郁，皆为辅佐药。至于痰郁，多因水湿凝聚而成，亦与气、火、食郁有关，尤其是气郁更使湿聚而痰生，若气机通畅，五郁得解，则痰郁亦随之而解，况方中配有苍术，可增加祛痰解郁之功，故不另用治痰郁之药。综观本方，六郁并治，但以行气解郁治疗气郁为主。

【应用】 本方是治疗六郁证的基础方，临床应用时根据六郁的偏甚，适当配伍，以提高疗效。如气郁偏重，以香附为主，并加入厚朴、枳壳、木香、青皮等，以加强行气解郁的功用；若湿郁偏重，以苍术为主，加入茯苓、泽泻以利湿；如食郁偏重，以六曲为主，加山楂、麦芽、莱菔子等以加强消食作用；如血郁偏重，以川芎为主，加入桃仁、红花等加强活血作用；如火郁偏重，以梔子为主，再加黄连、黄芩等以清热；如以痰郁为主，加半夏、陈皮、胆南星、瓜蒌等以化痰；若挟寒者，加吴茱萸以祛除寒邪。总之，应随证加减，灵活使用。

现代兽医临床上常用本方治疗胃肠神经官能症、胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎及其它慢性胃肠病和消化不良等属于六郁所致者。

【方歌】 越鞠丸治六般郁 食气血湿痰火郁 芎苍曲附并梔添 行气解郁病自痊

【参考】 药理研究证明，本方的单味药具有抑制胃肠运动、减少胃液分泌、利胆、减轻肝损害、改善血液循环、抑制血小板聚集、镇静、镇痛、收缩子宫平滑肌等作用。

第十五章 理血方

具有活血调血或止血作用，治疗血瘀或出血证的方剂，统称理血方。

血分病证有血虚、血热、血瘀、血溢等类型，所以在治疗方面则有补血、凉血、活血、止血等方法。其中补血、凉血方，分别列于补虚、清热方中介绍，这里只介绍治疗血瘀和出血两证的活血化瘀和止血两类方剂。

活血祛瘀方：以活血化瘀药为主组成，具有通行血脉、消散瘀血、通经止痛、疗伤消疮等作用，适用于血行不畅及瘀血阻滞的各种病证，如创伤瘀肿、母畜产后恶露不行、乳汁不通等。在临证运用中，由于气与血的关系非常密切，“气为血之帅，气行则血行”，故对一般瘀血证候，通常多在活血祛瘀的同时，适当配伍理气药物如柴胡、枳壳、香附子等，以助血行瘀散。此外，由于瘀血病证的病机不同，部位有在上、在下之别，且瘀血久留可导致血亏气弱等，故本类方剂组成时尚须根据证候表现不同，分别配伍温经散寒、荡涤瘀热、补气养血的药物，如吴茱萸、桂枝、大黄、芒硝、党参、当归等。因此类方剂多侧重攻的一面，故不可过用，以免伤害正气。凡血虚无瘀及孕畜均当慎用。

止血方：以止血药为主组成，具有制止出血的作用，用于治疗血溢脉外的各种出血病证，如尿血、便血、咳血、子宫出血等。在临证运用时，由于出血的病因和部位不同，组方配伍亦随证而异。如急性出血，血色鲜红，有热象表现者，多为血热妄行之出血，应选用凉血止血药与清热凉血药配伍；若出血血色紫暗，有血凝块并兼有瘀血现象者，多为血瘀出血，应选用具有祛瘀作用的止血药或与活血祛瘀药同用；若为慢性出血，或出血反复不止，血色淡红而有虚寒之象者，多属气虚不能摄血，应以止血药与补气温阳药配伍应用。总之，止血应治本，在止血的基础上，要根据出血的原因适当配伍，切勿一味着眼于止血，故又有“见血休止血”之说，只有做到审因施治，才能提高疗效。

桃红四物汤（《医宗金鉴》）

【组成】 桃仁 45g 当归 45g 赤芍 45g 红花 30g 川芎 20g 生地 60g
水煎服，或共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 活血祛瘀，补血止痛。

【主治】 血瘀所致的四肢疼痛、血虚有瘀、产后血瘀腹痛及瘀血所致的不孕症等。

【方解】 本方为治疗瘀血阻滞的基础方，由四物汤加桃仁、红花组成。四物汤具有补血活血的作用，将其中补血养阴的白芍代之以活血祛瘀的赤芍，将补血养阴的熟地代之以清热凉血消瘀的生地，使原方的补血调血作用，变为活血凉血。再加入活血祛瘀的桃仁、红花为主药，则突出了活血化瘀的作用，成为一个比较平和有效的活血化瘀方。

【应用】 本方广泛用于血瘀诸证。因跌打损伤所致的四肢瘀血疼痛、血虚有瘀、产后血瘀腹痛以及瘀血所致的不孕症等，均可在本方的基础上加减运用。

【方歌】 桃红四物用桃仁 红花当归赤芍呈 川芎生地共煎服 活血祛瘀有良效

【参考】 现代药理研究证明，本方具有显著抑制肉芽肿生成的作用和降低血管通透性、扩张血管、降低血清胆固醇与甘油三酯等作用。

定痛散（《元亨疗马集》）

【组成】 全当归 60g 鹤虱 30g 红花 30g 乳香 30g 没药 30g 血竭 30g
共为末，开水冲调，候温，加白酒 100ml，再入童便 100ml 灌服，或水煎服。

【功效】 和血止痛。

【主治】 跌打损伤筋骨，血瘀气滞、疼痛。

【方解】 本方适用于跌打损伤，瘀血凝滞，气血不通所致的各种病证。方中用当归、红花活血祛瘀、止痛，为主药；乳香、没药、血竭行气通络、散瘀定痛，为辅药；鹤虱增强止痛作用为佐药；加入白酒，以行药势，直达病所，童便消瘀降火、助通经脉，为使药。诸药相合，具有和血散瘀止痛之效。

【应用】 对于四肢闪伤、跌打损伤、捻挫等损伤，均可根据病情加减应用。

【方歌】 定痛散治跌打伤 当归没药和乳香 红花血竭与鹤虱 白酒童便共成方

血府逐瘀汤（《医林改错》）

【组成】 当归 45g 生地 45g 牛膝 45g 红花 40g 桃仁 60g 柴胡 20g
赤芍 30g 枳壳 30g 川芎 20g 桔梗 20g 甘草 15g
水煎服，或共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 活血祛瘀，行气止痛。

【主治】 跌打损伤及血瘀气滞诸证。

【方解】 本方系由桃红四物汤合四逆散加桔梗、牛膝而成，具有活血化瘀而不伤血，疏肝解郁而不耗气的特点，用于治疗血瘀气滞诸证。方中桃红四物汤活血化瘀养血，四逆散行气活血疏肝，桔梗开肺气，载药上行，牛膝通利血脉，引血下行。诸药合用，互相配合，

达到活血行瘀，理气止痛之效。

【应用】 本方为通治一切血瘀气滞之基础方。凡瘀血引起的各种疼痛，均可应用。用于跌打损伤及血瘀气滞等证时，应加重川芎、红花的用量；若瘀血在上，则重用赤芍、川芎；若瘀血在胸腹，则重用桃仁、红花，加乳香、没药、乌药、香附子等；瘀血在下腹，则加蒲黄、五灵脂、肉桂、小茴香等；若瘀血在后肢，则重用牛膝，加桑寄生。因本方祛瘀药较多，非确有血瘀证者不宜使用。

【方歌】 血府逐瘀桃红当 地芍赤芍牛膝襄 柴胡枳壳桔梗草 血瘀气滞用之宜

【参考】 现代药理研究证实，本方具有改善血液循环，调整凝血及抗凝血系统，防止血栓形成和镇痛、抑制肿瘤生长、保肝、抗炎、抗过敏及抗类肾上腺皮质激素等作用。试验表明，本方具有活血化瘀、改善微循环、增加组织器官血液灌流量的效应。能降低家兔血液粘滞性，提高其流动和变形能力；有提高红细胞的表面负电荷密度、抑制血小板的聚集性、降低血小板数量的作用，从而使红细胞趋向于分散，血液的凝固性降低。

跛行散(经验方)

【组成】 当归 30g 红花 25g 骨碎补 25g 土鳖虫 20g 自然铜(醋淬)20g
地龙 25g 制南星 15g 大黄 25g 血竭 25g 乳香 20g
没药 20g 甘草 15g
共为末，开水冲，候温加黄酒 150ml，同调灌服。

【功效】 活血祛瘀，消肿止痛。

【主治】 跌打损伤、跛行、气滞血瘀所致的肿胀疼痛。

【方解】 本方证多因跌倒、蹴踢、打扑、挫伤、剧伸等，致瘀血停滞，疼痛跛行。血瘀则气滞，发生疼痛跛行。治宜活血祛瘀，消肿止痛。方中当归、红花、乳香、没药、血竭、自然铜、土鳖、骨碎补、大黄等均具有活血祛瘀、消肿止痛作用，共为主药；天南星散结消肿，地龙清热通络为辅药；甘草清热解毒，协调诸药，黄酒活血通络，以助药势，共为佐使药。诸药合用，活血祛瘀，消肿止痛。

【应用】 各部位的闪伤、捻挫，以及跌打损伤、筋骨损伤等均可使用。若前肢疼痛跛行，加桂枝、川断；后肢疼痛跛行，加牛膝、杜仲、木瓜等；腰胯疼痛加木瓜、杜仲、川断等。

【方歌】 跛行散是经验方 乳没红黄龙竭当 土鳖碎补铜星草 散瘀消肿效尤佳

跛行镇痛散(《中华人民共和国兽药典·二部》2000年版)

【组成】 当归 80g 红花 60g 桃仁 70g 丹参 80g 桂枝 70g 牛膝 80g

土鳖虫 20g 乳香 20g 没药 20g

共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 活血散瘀，止痛。

【主治】 跌打损伤，腰肢疼痛。

【方解】 本方用于治疗跛行疼痛诸证。方中当归、桃仁、红花活血祛瘀，止痛；丹参散瘀消肿；桂枝通利关节；牛膝温经通脉；土鳖虫破瘀血，续筋骨；乳香、没药活血定痛。诸药合用，具有祛瘀血、止疼痛的功能。

【应用】 临床用于治疗马、牛跌打损伤所致四肢疼痛、跛行等，有良好效果。

【方歌】 跛行镇痛归桃红 丹桂牛膝土鳖虫 乳香没药一般施 跛行疼痛用之宜

红花散（《元亨疗马集》）

【组成】 红花 20g 没药 20g 桔梗 20g 六曲 30g 枳壳 20g 当归 30g
山楂 30g 厚朴 20g 陈皮 20g 甘草 15g 白药子 20g 黄药子 20g
麦芽 30g

共为末，开水冲，候温灌服。

【功效】 活血理气，清热散瘀，消食化积。

【主治】 料伤五攒痛，即现代兽医学中的蹄叶炎。证见站立时腰曲头低，四肢攒于腹下，食欲大减，吃草不吃料，粪稀带水，口色红，呼吸迫促，脉洪大等。

【方解】 本方证系因喂饲精料过多，饮水过少，运动不足，脾胃运化失职，致使谷料毒气凝于肠胃，吸入血液，流注肢蹄所致。方中红花、没药、当归活血祛瘀为主药；枳壳、厚朴、陈皮行气宽中，六曲、山楂、麦芽消食化积，为辅药；桔梗宣肺利膈，黄药子、白药子清热散瘀，为佐药；甘草和中缓急、协调诸药，为使药。诸药相合，活血行气，消食除积。

【应用】 对于因喂养过剩、运动不足或过食精料所致马属动物料伤五攒痛，均可按本方加减使用。

【方歌】 活血祛瘀红花方 黄白没药陈朴当 桔曲楂麦枳甘草 料伤五攒痛服康

【备注】 《元亨疗马集》中，名为红花散的有二方，另一方（红花、当归、没药、茴香、川楝子、巴戟天、枳壳、血竭、木通、乌药、藁本）主治闪伤腰胯。

当归散（《元亨疗马集》）

【组成】 当归 30g 天花粉 20g 黄药子 20g 枇杷叶 20g 桔梗 20g
白药子 20g 丹皮 20g 白芍 20g 红花 15g 大黄 15g
没药 20g 甘草 10g

共为末，水煎数沸，入童便 100ml，候温灌服。

【功效】 和血止痛，宽胸顺气。

【主治】 胸膈痛。证见胸膈疼痛、束步难行、频频换足、站立困难。

【方解】 本方为治闪伤胸膈痛的常用方剂。本方证多因踏空跌倒，闪伤前肢胸膈，瘀血痞气凝结不散所致。方中当归、红花、没药、白芍活血通络，散瘀止痛，为主药；丹皮、大黄、花粉、黄药子、白药子清热凉血，消肿破瘀，大黄同时还能助主药行瘀滞，共为辅药；佐以桔梗、枇杷叶宽胸顺气，利膈散滞，引药上行直达病所；甘草协调诸药，童便消瘀通经共为使药。诸药相合，共奏和血止痛、宽胸顺气之效。

【应用】 临床用于马、牛瘀血结在胸中的胸膈痛。若在本方中加入行气散瘀药物川芎、川楝子、青皮、三七等，则疗效更佳。本方去桔梗、白药子、红花，名止痛散（《元亨疗马集》），亦可治疗马胸膈痛。临床治疗胸膈痛时，若先放胸堂血或蹄头血，再灌服本方，则疗效更好。

【方歌】 当归散用丹大黄 黄白药子芍花粉 没红杷桔草童便 闪伤胸膈用此方

【备注】 《元亨疗马集》中，名为当归散的有六方，除本方外，尚有治劳伤一方，慢草一方，胎产三方。

生化汤（《傅青主女科》）

【组成】 当归 120g 川芎 45g 桃仁 45g 炮姜 10g 炙甘草 10g
加黄酒 250ml，童便 250ml 煮，候温灌服，亦可水煎服。

【功效】 活血化瘀，温经止痛。

【主治】 产后血虚受寒，恶露不行，肚腹疼痛。

【方解】 产后血虚，寒邪乘虚而入，寒凝血瘀，留阻胞宫，导致恶露不行，肚腹疼痛，治宜温经散寒，养血化瘀，以使瘀去新生，故取名为“生化”。方中重用当归活血补血，化瘀生新，为主药；川芎活血行气，桃仁活血祛瘀，均为辅药；炮姜温经散寒、止痛，为佐药；炙甘草调和诸药，黄酒、童便温通血脉，益阳化瘀，并助药力直达病所引败血下行，均为使药。诸药合用，有养血化瘀、温经止痛之功，使恶露畅行，肚腹疼痛自愈。

【应用】 本方为临床治疗产后瘀血阻滞的基础方。产后恶露不行，肚腹疼痛均可加减应用。如产后腹痛，恶露不尽且其中血块较多者，加蒲黄、五灵脂；产后腹痛寒甚者，加肉桂、吴茱萸、益母草、荆芥穗等；产后腹痛属气血亏损者，加党参、熟地、山药、阿胶等；产后恶露已去，仅有腹痛者，去桃仁，加元胡、益母草；产后发热者，去炮姜，加益母草、赤芍、丹参、丹皮、知母、黄柏等。本方加穿山甲、山楂、党参，用治产后子宫收缩不全，能够加速子宫复原减少宫缩腹痛，并有促进乳汁分泌的作用；亦可加入党参、黄芪、益母草、丹皮等，治疗产后胎衣不下。本方加益母草，名益母生化散，具有活血化瘀，温经止痛的功

能，亦主治产后恶露不行。现代兽医临床广泛用于产后子宫复旧不全、恶露不行、子宫内膜炎、胎衣不下及产后调理。

本方宜用于产后受寒而有瘀血者，血热有瘀滞者忌用。

【方歌】 生化汤宜产后服 恶露不行痛难当 炮姜归草芍桃仁 黄酒童便共成方

【参考】 现代药理研究证明，本方有显著减少子宫收缩腹痛、防止产后感染的作用。据观察，生化汤用于产后，能加速子宫复原；并有促进乳汁分泌作用。

通乳散(江西省中兽医研究所方)

【组成】 黄芪 60g 党参 40g 通草 30g 川芎 30g 白术 30g
川续断 30g 山甲珠 30g 当归 60g 王不留行 60g 木通 20g
杜仲 20g 甘草 20g 阿胶 60g

共为末，开水冲调，加黄酒 100ml，候温灌服，亦可水煎服。

【功效】 补益气血，通经下乳。

【主治】 气血不足，经络不通所致的缺乳症。

【方解】 本方用于气血不足之缺乳症。乳乃血液化生，血由水谷精微气化而成；气衰则血亏血虚则乳少。方中黄芪、党参、白术、甘草、当归、阿胶气血双补以培其本，为主药；杜仲、川续断、川芎补肝益肾，通利肝脉，木通、山甲、通草、王不留行通经下乳，以治其标，为辅佐药；黄酒助药势为使药。诸药相合，补益气血，通经下乳。

【应用】 用于母畜体质瘦弱，气血不足之缺乳症。对于气机不畅，经脉阻滞，阻碍乳汁通行的缺乳症宜用由当归、王不留行、路路通、山甲珠、木香、瓜蒌、生元胡、通草、川芎组成的通乳散(《中兽医治疗学》)，以调畅气机，疏通经脉。

【方歌】 通乳散芪参术草 归杜芎断通草胶 木通山甲王不留 黄酒为引催乳好

白术散(《元亨疗马集》)

【组成】 白术 30g 当归 30g 熟地 30g 党参 30g 阿胶 60g 陈皮 30g
苏叶 20g 黄芩 20g 砂仁 20g 川芎 20g 生姜 15g 甘草 15g
白芍 20g

水煎服，或共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 养血安胎。

【主治】 胎动不安、习惯性流产、先兆流产等。证见患畜站立不安，回头顾腹，蹲腰努责阴门频频外翻，排出少量尿液，或流出带血水的浊液，间有起卧或腹痛剧烈，口色青黄，脉象浮紧。

【方解】 本方用于气血虚衰的胎动不安证。安胎应以养血为本，方中熟地、白芍、当归、川芎、阿胶养血调经，为主药；营出中焦，血因气行，用党参、白术、甘草健脾益气，以资生血之源，为辅药；砂仁、陈皮理气安胎，紫苏升举胎元，黄芩配白术更能清热安胎，均为佐药；生姜、甘草协调诸药为使药。诸药相合，共奏养血安胎之效。

【应用】 根据病情随证加减，用于治疗马、牛胎动不安、习惯性流产、先兆性流产等。

【方歌】 白术散归芍熟地 参砂芍草胶陈皮 紫苏黄芩生姜配 胎动腹疼此方宜

十黑散(《中兽医诊疗经验·第二集》)

【组成】 知母 30g 黄柏 30g 地榆 30g 蒲黄 30g 栀子 20g 槐花 20g
侧柏叶 20g 血余炭 20g 杜仲 20g 棕榈皮 15g
除血余炭外，各药炒黑，共为末，开水冲，候温加童便 200ml，灌服，或水煎服。

【功效】 清热泻火，凉血止血。

【主治】 膀胱积热所致的尿血。证见精神倦怠，食欲减少，畜体发热，排尿困难，有明显的痛苦表现，尿色鲜红，口色淡红，脉象细数等。

【方解】 本方为治劳伤过度，热积膀胱之尿血而设。方中黄柏、知母、栀子清降肾火，以治热淋尿血，为主药；地榆、槐花、侧柏叶凉血止血，蒲黄、血余炭、棕榈皮收敛止血以治尿血，为辅药；杜仲补益肝肾，固本清源以治劳伤，为佐药；童便清热降火、引药归经，为使药。诸药合用，能清热泻火，凉血止血。

【应用】 临床用于膀胱积热的尿血证。以血色鲜红，舌红苔黄，脉象数为应用要点。现代常用本方治疗急性泌尿系统感染及泌尿系结石而见上述证候者。

【方歌】 十黑散栀槐柏叶 榆蒲杜仲知黄柏 血余棕皮均炒黑 热伤血尿方妥贴

【备注】 本方仿自十灰散(大蓟、小蓟、荷叶、侧柏叶、白茅根、茜草根、山栀、大黄、牡丹皮、棕榈皮各等分，可用于尿中混血或有血块，口色偏红之尿血。《十药神书》)成方。

秦艽散(《元亨疗马集》)

【组成】 秦艽 30g 炒蒲黄 30g 瞿麦 30g 车前子 30g 天花粉 30g 黄芩 20g
大黄 20g 红花 20g 当归 20g 白芍 20g 栀子 20g 甘草 10g
淡竹叶 15g

共为末，开水冲，候温灌服，亦可煎汤服。

【功效】 清热通淋，祛瘀止血。

【主治】 热积膀胱、弩伤尿血。证见尿血，弩气弓腰，头低耳聋，草细毛焦，舌质如绵，脉滑。

【方解】 本方用于治疗弩伤尿血证。方中蒲黄、瞿麦、秦艽通淋止血，和血止痛，为主药；当归、白芍养血滋阴为辅药；大黄、红花清热活血，栀子、黄芩、车前子、天花粉、竹叶清热利尿，均为佐药；甘草调和诸药为使药。各药相合，可使热清瘀去而血止，小便通利而痛除。

【应用】 凡体虚弩伤之尿血证，均可加减应用。

【方歌】 秦艽散归芍黄草 红花瞿麦蒲川军 花粉车前栀竹草 用治瘦马尿血淋

【备注】 《元亨疗马集》中，共有四方名为秦艽散，除本方治疗尿血外，尚有治马肺热、肺败各一方，治马脾毒生疮一方。

槐花散（《本事方》）

【组成】 炒槐花 100g 炒侧柏叶 50g 荆芥炭 30g 炒枳壳 30g

共为末，开水冲，候温灌服。

【功效】 清肠止血，疏风理气。

【主治】 肠风下血，血色鲜红，或粪中带血。

【方解】 本方为治肠风下血的常用方剂。肠风下血系因风热或湿热壅遏于肠胃血分，肠络受损，血溢肠道所致，故治宜清肠凉血止血。方中用槐花专清大肠湿热，凉血止血，为主药；侧柏叶助槐花凉血止血，荆芥炒用理气疏风并入血分而止血，共为辅药；枳壳理气宽肠为佐使药。各药合用，既能凉血止血，又能清肠疏风。风热湿毒既清，则便血自止。

【应用】 用于大肠湿热所致的便血。若大肠热盛，加黄连、黄芩以清肠热；下血多者，加地榆以清肠止血；大便下血不止者，加生地、当归、川芎；便血已久而血虚者，加熟地黄、当归川芎等。本方药性寒凉，不宜久服。

【方歌】 槐花散用治肠风 荆芥枳壳侧柏从 用时诸药须炒黑 疏风清肠止血功

【参考】 药理研究证明，本方主要通过改善毛细血管的功能而达到止血的目的，还具有消炎和抗病毒等作用。

第十六章 收涩方

具有收敛固涩作用，治疗气、血、精、津液耗散滑脱的一类方剂，统称为收涩方。

收涩方所治气、血、精、津液的耗散滑脱之证，均由脏腑亏损，正气内虚所致，因其临床表现有自汗、盗汗、久泻久痢、肺虚久咳、遗精滑泄、小便失禁、崩漏带下等的不同，故治疗上也有固表止汗、涩肠固脱、涩精止遗和固崩止带等不同方法。所以，收涩方在组方时

又常根据气血、阴、阳、精、津液耗伤程度的不同，相应地配伍补益药物，以标本兼顾。

本类方剂专为本虚卫外不固及脏腑固摄无力所设，临床上不可误用于热病汗多，热病初起伤食泄泻、热痢下重、相火妄动之滑精等有实邪的病证。

乌梅散(《蕃牧纂验方》)

【组成】 乌梅(去核)15g 干柿 25g 诃子肉 6g 黄连 6g 郁金 6g
共为末，开水冲调，候温灌服，亦可水煎服。

【功效】 涩肠止泻，清热燥湿。

【主治】 幼驹奶泻及其它幼畜的湿热下痢。

【方解】 本方是治幼驹奶泻的收敛性止泻方剂。幼畜奶泻，多因乳热所伤，湿热病邪积于胃肠。因幼畜体质娇嫩，不耐克伐，故应固涩与祛邪并用。方中乌梅涩肠止泻，生津止渴，为主药；辅以诃子肉、干柿敛涩大肠；佐以黄连清热燥湿止泻，郁金行气活血止痛。诸药合用，涩肠止泻，清热燥湿。

【应用】 凡幼驹或其它幼畜奶泻，均可加减应用。体热者，加银花、蒲公英、黄柏；体虚者，加党参、白术、茯苓、山药等。亦可加大剂量用于成年动物的泻痢，对猪痢疾也有效。

【方歌】 乌梅散中用干柿 诃子郁金与黄连 涩肠止泻兼清热 新驹奶泻此方治

【备注】 本方在《元亨疗马集》中亦名乌梅散，但改方中郁金为姜黄，主治幼驹奶泻。另本方在《司牧安骥集》中名诃子散。

【参考】 研究证明，本方对沙门氏杆菌、致病性大肠杆菌、志贺氏痢疾杆菌有一定的抑制作用。

四神丸(《证治准绳》)

【组成】 补骨脂(炒)120g 肉豆蔻(煨)60g 五味子 60g 吴茱萸 30g
上药为末，另用生姜 120g、大枣 120g，与水同煎，去姜及枣肉，和药为丸，或水煎服，也可为散剂。

【功效】 温补脾肾，涩肠止泻。

【主治】 脾肾虚寒泄泻。证见草谷不消，久泻不止，完谷不化，神疲乏力，四肢发凉，舌淡苔白，脉象沉迟无力等。

【方解】 本方用于脾肾虚寒之泄泻。本方证由家畜体弱阳虚，命门火衰，不能上温脾阳，导致脾失健运所引起，治宜温肾暖脾，涩肠止泻。方中重用补骨脂温补肾阳，暖脾止泻，为主药；肉豆蔻温脾肾而涩肠止泻，吴茱萸暖脾胃而散寒湿，均为辅药；五味子酸敛固涩，

涩肠止泻，为佐药；生姜助吴茱萸以温胃散寒，大枣补脾和中，均为使药。诸药合用，使脾肾温，运化复，大肠固，则诸症自愈。

【应用】 本方为治脾肾虚寒、久泻不止的专用方。久泻气陷脱肛者，宜加党参、柴胡、枳壳、升麻等以益气升陷；若泄泻无度，肾阳虚甚者，宜加肉桂或附子以温补肾阳。

现代临床常用本方加减，治疗慢性肠炎、慢性结肠炎等属脾肾阳虚者。

【方歌】 四神骨脂与吴萸 肉蔻除油五味须 大枣生姜补脾胃 脾肾虚久泻宜

【备注】 本方是由《普济本事方》中的二神丸(补骨脂、肉豆蔻)和五味子散(五味子、吴茱萸)合方而成，既温补命门又兼补脾阳，为脾肾双补之剂。

【参考】 现代药理研究证明，本方对肠管主要起抑制作用，对肠蠕动亢进的抑制作用最强，还具有抗菌和增强消化系统功能的作用。

金锁固精汤(《医方集解》)

【组成】 沙苑蒺藜 60g 芡实 60g 莲须 30g 煅龙骨 30g
煅牡蛎 30g 莲肉 30g

原方为丸剂。水煎去渣，候温灌服，或研末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 补肾涩精。

【主治】 肾虚不固。证见滑精，早泄，腰膝四肢无力，尿频，舌淡，脉细弱。

【方解】 本方专为治疗肾虚滑精而设。肾主藏精，肾虚则精液不固而自泄；腰为肾府，肾精不足，则腰膝无力。方中沙苑蒺藜补肾益精，治其不足为主药；莲肉、芡实益肾涩精，健脾宁心，为辅药；莲须、龙骨、牡蛎涩精止滑，安神，共为佐使药。诸药合用，既能涩精之外泄，又可补精之不足，标本兼顾，为补肾固精之良方。

现代临床主要用于性神经功能紊乱，乳糜尿，慢性肠炎及带下等。

【应用】 本方为治疗肾虚滑精的常用方剂，以滑精，早泄，腰膝无力为应用要点，并可随证加减。若兼见阳痿者，加淫羊藿、肉苁蓉、菟丝子、锁阳等，以壮阳补肾；若肾阳偏虚者，可加山萸肉、补骨脂、巴戟天、肉桂等以温补肾阳；若肾阴偏虚者，可加女贞子、枸杞子、龟板等以滋养肾阴；肾阴虚而有火者，加知母、黄柏以滋阴降火。

【方歌】 固精散用芡莲须 沙苑蒺藜莲肉需 龙骨牡蛎煅煎汤 肾虚滑精用相宜

【备注】 本方用药以收涩之品为主，如属下焦湿热所致滑精，早泄，禁用本方。

牡蛎散(《和剂局方》)

【组成】 麻黄根 45g 生黄芪 45g 煅牡蛎 60g 浮小麦 60g

共为末，开水冲调或用浮小麦煎水冲调，候温灌服，或水煎服。

【功效】 固表敛汗。

【主治】 体虚自汗。证见身常汗出，夜晚尤甚，脉虚等。

【方解】 汗有自汗、盗汗之分。自汗者以阳虚为主，盗汗者以阴虚为主。本方所治，既有阳虚自汗，复有阴虚盗汗之证。汗为心之液，汗出系由卫气虚不能外固，营阴亏不能内守所致。方中牡蛎益阴潜阳，固涩止汗，为主药；生黄芪益卫气而固表为辅药；麻黄根专于止汗，浮小麦益心气、养心阴、止汗泄，二药助黄芪、牡蛎增强止汗功效，共为佐使药。诸药配合，共同发挥益气固表、敛阴止汗之功能。

【应用】 临床以本方为基础，随证加减，用于阳虚、气虚、阴虚、血虚之虚汗证。但主要用于阳虚卫气不固之虚汗证。若属阳虚，加白术、附子；若属阴虚，加干地黄、白芍；若属气虚，加党参、白术；若属血虚，可加熟地黄、何首乌。若大汗不止，有阳虚欲脱症状者，则本方不能胜任，应用参附汤加龙骨、牡蛎，以回阳固脱止汗。

【方歌】 牡蛎散中用黄芪 浮麦麻黄根最宜 卫虚自汗或盗汗 固表敛汗功能奇

玉屏风散(《世医得效方》)

【组成】 黄芪 90g 白术 60g 防风 30g

共为末，开水冲调，候温灌服，或水煎服。

【功效】 益气固表止汗。

【主治】 表虚自汗及体虚易感风邪者。证见自汗，恶风，苔白，舌淡，脉浮缓。

【方解】 本方的特点是不用收涩药，只用益气固表药而奏止汗之效。方中重用黄芪以益气固表，为主药；白术健脾益气，助黄芪益气固表止汗，为辅药；二药合用使气旺表实，汗不外泄，邪不内侵。防风走表散风祛寒，为佐使药。黄芪得防风，固表而不留邪；防风得黄芪，祛邪而不伤正。三药合用，使邪去则外无所扰而汗止，卫和则腠理固密而邪不复侵，脾健则正气复而内有所据，达到益气固表，扶正祛邪之功。方名是取其有益气固表止汗、抵御风邪之功，有如御风的屏障之意。

【应用】 本方为治表虚自汗以及体虚易感风邪的常用方剂。若表虚自汗不止，可酌加牡蛎、浮小麦、五味子等，以增强固表止汗的作用；若表虚外感风邪，汗出不解，可合桂枝汤以解肌祛风，固表止汗。

现代临床常用于表虚卫外不固所致的感冒、多汗证。

【方歌】 玉屏风散术芪防 益气固表止汗良 表虚自汗恶风证 服之以后体安康

【备注】 本方虽与牡蛎散均能固表止汗，牡蛎散敛汗之力强，适用于卫气不固之自汗，本方旨在益气健脾，适用于表虚自汗及体虚易感受风邪者。

【参考】 现代药理研究证明，本方具有提高机体免疫功能和一定的抗菌、抗病毒的作用。

第十七章 补虚方

具有补益畜体气、血、阴、阳不足和扶助正气，用以治疗各种虚证的一类方剂，统称为补虚方。补虚方系依据《素问》中“虚则补之”、“损者益之”的原则立法组方，属“八法”中的“补法”。

因虚证有气虚、血虚、阴虚、阳虚之分，故补虚方也相应地分为补气、补血、补阴、补阳四类。

补气方：适用于脾肺气虚病证，常以补气药党参、黄芪、白术、甘草等为主，配伍理气、渗湿、养阴或升举中气的药物组成。四君子汤为补气的基础方。

补血方：适用于营血亏虚的病证，常以补血药熟地、当归、白芍、阿胶等为主，配伍益气、活血化瘀、理气、安神药组成。四物汤为补血的基础方。

补阴方：适用于阴虚的病证，主要是肝肾阴虚的病证，常以补阴药熟地、麦冬、沙参、龟板等为主，配伍补阳或清热的药物组成。六味地黄丸为补阴的基础方。

补阳方：适用于肾阳虚的一类病证，常以温阳补肾药肉桂、附子、巴戟天、杜仲、淫羊藿、肉苁蓉等为主，配伍补阴、利水药组成。肾气丸为补阳的代表方。

气虚补气，血虚补血，气血俱虚则气血双补，这是临床治疗气血不足的常规。但因气血同源，气为血帅，血为气母，二者相互为用，故补气与补血虽各有侧重，但不能截然分开。若血虚兼有气虚，补血必须辅以补气；即或血虚而气不虚，也应少量佐以补气药物，以资生化；对大出血而致血虚者，更应重用或急投补气药物，使气旺以生血。正如李东垣《脾胃论》所说：“血不自生，须得生阳气之药，血自旺矣。”可知补血应与补气结合运用。对于若气虚而血不虚者，一般以补气为主，较少运用补血药，以防阴柔滞气，影响脾胃运化。临证中因血弱所致的气虚，以及因气不足所致的血亏，亦属常见，当用气血双补之法。

补阴和补阳的关系，较之气血关系更为密切。由于阴阳互根，相互依从，相互转化，故阳虚补阳，常辅以补阴之药，使所补之阳有所依附；阴虚补阴，多配伍补阳药物，以使欲补之阴，生化有源。如张景岳《景岳全书》所说：“善补阳者，必于阴中求阳；善补阴者，必于阳中求阴。”

指出补阴或补阳时，不能强调一面，应该将阴阳看成是一个整体。但如阳虚而阴不虚者，应以补阳为主，宜补之以甘温；阴虚而火旺者，应以补阴为主，宜补之以甘凉；如阴阳两虚，又当阴阳双补。

总之，气血同源，阴阳互根，不论补气、补血、补阴、补阳，必须全面兼顾，才能相得益彰。

此外，畜体气、血、阴、阳不足所表现出的各种虚证，与五脏六腑有着密切的关系，临证治疗时一方面可直接补益受病脏腑，另一方面可根据五行相生，“虚则补其母”的原则进

行治疗。

但要明确的是，脾为后天之本，气血生化之源；肾为先天之本，为真阴真阳之所在，故补益五脏应特别重视脾肾，凡补气补血均应着重从脾论治，补阴补阳多从补肾入手，通过补脾或补肾，使诸虚得补。

使用补虚方应注意以下事项。首先，补虚方禁用于外邪在表及一切实证。其次，补血、补阴方多滋腻，应用时应注意脾胃功能，若脾胃功能不足，则需配伍理气健脾、和胃助运药物，或先调理脾胃，然后予以补益。第三，应辨清虚实真假，所谓“大实有羸状”（真实假虚证）、“至虚有盛候”（真虚假实证），前者当攻反补，则实者愈实；后者应补反攻，则虚者愈虚。

四君子汤（《和剂局方》）

【组成】 党参 60g 炒白术 60g 茯苓 60g 炙甘草 30g

共为末，开水冲调，候温灌服，或水煎服。

【功效】 益气健脾。

【主治】 脾胃气虚。证见体瘦毛焦，精神倦怠，四肢无力，食少便溏，舌淡苔白，脉细弱等

【方解】 本方为治脾气虚弱的基础方。脾胃为后天之本，气血生化之源，补气必从脾胃着手方中党参（原方为人参）补中益气为主药；白术苦温，健脾燥湿，为辅药；茯苓甘淡，健脾渗湿，为佐药，白术、茯苓合用，健脾除湿之功更强；炙甘草甘温，益气和中，调和诸药，为使药。诸药相合，共奏补中气、健脾胃之功。

【应用】 用于脾胃虚弱证。许多补气健脾的方剂，都是从本方演化而来。临床实践中，对于各种原因引起的慢性胃炎、胃肠功能减退、消化不良等慢性疾患，凡表现有脾气虚弱者，均可加减运用。本方加陈皮以理气滞，名为异功散（《小儿药证直诀》），主治脾虚兼有气滞者；加陈皮、半夏以理气化痰，名六君子汤（《医学正传》），主治脾胃气虚兼有痰湿；加木香、砂仁以行气止痛，降逆化痰，名香砂六君子汤（《和剂局方》），主治脾胃气虚，湿阻气机；加诃子、肉豆蔻，名加味四君子汤（《世医得救效方》），主治脾虚泄泻。

【方歌】 四君子汤中和义 参术茯苓甘草比 益以夏陈名六君

祛痰益气补脾虚 除去半夏名异功 或加香砂胃寒使

【备注】 本方药物组成与理中汤仅一味之别，四君子汤参、术、苓、草，重在益气健脾；理中汤参、术、姜、草，重在温中散寒。

【参考】 现代药理研究表明，本方具有促进骨髓造血功能，加速红细胞生成；调节神经系统功能、促进内分泌腺的活动，拮抗乙酰胆碱和组织胺的作用；使已紊乱的胃肠功能恢复正常；提高肝脏糖原，抗休克，增加能量；加强机体免疫功能，抗脂质过氧化和自由基等

作用。现代研究表明，本方有改善胃肠功能、提高能量代谢、增强免疫功能、抗自由基损伤等方面的药理作用。

参苓白术散(《和剂局方》)

【组成】 党参 45g 白术 45g 茯苓 45g 炙甘草 45g 山药 45g 扁豆 60g
莲子肉 30g 桔梗 30g 薏苡仁 30g 砂仁 30g
共为末，开水冲调，候温灌服，或水煎服。

【功效】 补气健脾，益肺气，渗湿止泻。

【主治】 脾胃气虚挟湿证。证见精神倦怠，体瘦毛焦，食欲减退，四肢无力，便溏，或泄泻，舌苔白腻，脉缓弱等。

【方解】 本方证由脾虚挟湿所致。治宜补虚除湿，行气调滞。本方由四君子汤加味而成。方中党参、白术、茯苓、炙甘草补气健脾，为主药；山药、莲子肉助党参补气健脾，扁豆、薏苡仁助茯苓、白术健脾止泻，共为辅药；佐以砂仁芳香醒脾，理气宽胸；桔梗宣利肺气，载药上行以补肺，为使药。诸药相合，补气健脾，渗湿止泻。

【应用】 本方温而不燥，是补气健脾、渗湿止泻的常用方剂。临床用于脾胃虚弱的慢性病，如慢性消化不良、慢性胃肠炎、久泻以及幼畜脾虚泄泻等。本方兼有益肺气之功，经常用作“培土生金”的代表方，对肺虚劳损诸证属脾肺气虚者均可应用。

【方歌】 参苓白术扁豆陈 山药甘莲砂苡仁 桔梗上浮兼保肺 脾虚湿泻止泻功

【参考】 研究证明，本方主要有调节胃肠运动、加强肠道的吸收功能、抗溃疡、抗疲劳、提高免疫功能、抗炎、镇咳祛痰、利尿等药理作用。现代研究表明，本方能增加肠管对水及氯化物的吸收；本方小剂量可兴奋肠管，引起收缩，大剂量则主要引起抑制。对肠管的运动，方中的茯苓、甘草、白术及陈皮主要呈抑制作用；桔梗主要呈兴奋作用。但总的看来，其抑制作用占优势。故本方似为一种以抑制为主、兴奋为辅的胃肠活动调整剂。

补中益气汤(《脾胃论》)

【组成】 炙黄芪 90g 党参 60g 白术 60g 当归 60g 陈皮 60g
炙甘草 45g 升麻 30g 柴胡 30g
水煎服。

【功效】 补中益气，升阳举陷。

【主治】 脾胃气虚及气虚下陷诸证。证见精神倦怠，草料减少，发热，汗自出，口渴喜饮，粪便稀溏，舌质淡，苔薄白或久泻脱肛、子宫脱垂等。

【方解】 本方为治疗脾胃气虚及气虚下陷诸证的常用方，是根据《内经》“劳者温之”、

“损者益之”的原则而创立的。气虚下陷，治宜益气升阳，调补脾胃。方中黄芪补中益气，升阳固表，为主药；党参、白术、甘草温补脾胃，助主药益气补中，为辅药；当归养血，陈皮理气行滞，与补气养血药物同用，使补而不滞，更配升麻、柴胡升阳举陷，助主、辅药升提正气，均为佐药；炙甘草调和诸药，兼有使药之用。诸药相合，升阳益气，调补脾胃。

【应用】 本方为补气升阳，甘温除热的代表方。中气不足，气虚下陷，泻痢脱肛，子宫脱垂或气虚发热自汗，倦怠无力等均可使用本方。如加入枳壳，效果更为显著。

【方歌】 补中益气芪术陈 升柴参草当归身 劳倦内伤功独显 气虚下陷亦堪珍

【备注】 本方去当归，加阿胶、焦艾，名加减补中益气汤(《脾胃论》)，功能补气安胎，升阳举陷；去当归、白术，加木香、苍术，名调中益气汤(《脾胃论》)，功能与之大同小异。《脾胃论》中的升阳益胃汤(黄芪、半夏、党参、炙甘草、白芍、羌活、独活、橘皮、茯苓、泽泻、柴胡、黄连、防风、白术、生姜、大枣)，功能升阳益脾，甘温补肺，与本方相近。

【参考】 研究表明，本方对改善机体蛋白质代谢，防止贫血的发展，增强体力，均有良好的作用；对在体或离体子宫及其周围组织有选择性兴奋作用；对小肠蠕动有双向调节作用；具有增强机体网状内皮系统吞噬功能和促进机体非特异性免疫功能及细胞免疫功能的作用等。现代研究表明，本方对小肠功能有双向调节作用：当小肠蠕动亢进时，本方有抑制作用，张力下降时，则有兴奋作用。小量使蛙心力增强，过量起抑制作用。在实验中看到，有升、柴之制剂作用明显，去升、柴则作用减弱，且不持久。此外，本方还有增强免疫功能，促进糖代谢和蛋白质合成，提高细胞的氧化功能，促进睾丸中精子形成的恢复，延长精子运动能力等方面的作用。

四物汤(《和剂局方》)

【组成】 熟地黄 45g 白芍 45g 当归 45g 川芎 30g

共为末，开水冲调，候温灌服，或水煎服。

【功效】 补血调血。

【主治】 血虚、血瘀诸证。证见舌淡，脉细，或血虚兼有瘀滞。

【方解】 本方是补血调血的基础方剂，所主诸证皆由营血亏虚，血行不畅所致。治宜补血养肝，调血行滞。方中熟地滋阴补血，为主药；当归补血养肝，并能活血行滞，为辅药；白芍养血敛阴，为佐药；川芎入血分行气活血，使补而不滞，为使药。从药物配伍关系看，地、芍是血中之血药，芎、归是血中之气药，两相配伍，可使补血而不滞血，行血而不破血，补中有散，散中有收，共同组成治血要剂。因此，不仅血虚之证可用以补血，即使血滞之证，亦可加減运用。

【应用】 对于营血虚损，气滞血瘀，胎前产后诸疾，均可以本方为基础，加減运用。

本方合四君子汤名八珍汤(《正体类要》),双补气血,用治气血两虚者;再加肉桂、附子,名十全大补汤(《和剂局方》),气血双补兼能温阳散寒,用治气血双亏兼阳虚有寒者。本方加桃仁、红花,即桃红四物汤(见理血方)。血虚有热,可加黄芩、丹皮,并改熟地为生地以清热凉血;若妊娠胎动不安,加艾叶、阿胶以养血安胎;若血虚气滞腹痛,加香附子、元胡。

现代多用于治疗血液系统、循环系统等多种疾病,尤其对胎前、产后病证最为常用。

【方歌】 四物地芍与归芎 血分疾患此方宗 血虚血滞诸病证 加减运用在变通

【参考】 现代药理研究表明,本方具有抗凝血、抗血栓形成、镇痛、镇静及收缩子宫止血的作用。现代研究表明,本方能增强造血功能;提高免疫功能;对放射线的损伤有保护作用,而且其作用大部分依赖于川芎,但川芎单味与四物汤比较,四物汤的有效给药时间更长;还有抗自由基损伤的作用,从而延缓衰老。

泰山磐石散(《景岳全书》)

【组成】 熟地黄 45g 当归 45g 白芍 45g 黄芪 45g 党参 45g 白术 45g
川续断 45g 川芎 45g 炙甘草 30g 砂仁 30g 黄芩 30g 糯米 120g
水煎服,或共为末,开水冲调,候温灌服。

【功效】 益气健脾,养血安胎。

【主治】 马、驴产前少食或不食证,或气血两虚引起的胎动不安。

【方解】 本方为治驴、马产前不食或胎动不安的常用方,其证多因运动不足,脾胃功能减弱,气血亏虚所致。脾气不足则食少或不食,气血亏损,不能充养胞宫,甚或冲任不固,导致胎动不安。治宜健脾益气,养血安胎。方中以四君子汤去茯苓,加黄芪健脾益气;四物汤加川续断补血固肾以养胎元;砂仁调气安胎;糯米补养脾胃;更以白术、黄芩同用以安胎。各药合用,益气健脾,养血安胎。

【应用】 对于马、驴产前不食或少食和气血两虚的胎动不安等均可加减应用。临床实践证明,本方对驴怀骡妊娠毒血症之脾胃虚弱、气血两虚治疗效果较好。

【参考】 药理研究证明,本方有一定的抗移植排斥反应和防治实验性变态反应性脑脊髓炎的作用。

归芪益母汤(《牛经备要医方》)

【组成】 炙黄芪 120g 益母草 60g 当归 30g
水煎服,或共为末,开水冲调,候温灌服。

【功效】 补气生血,活血祛瘀。

【主治】 过力劳伤所致气血虚弱及产后血虚、瘀血诸证。证见头低耳聋，四肢无力，怠行喜卧，口色淡，脉细弱等。

【方解】 本方由当归补血汤（《内外伤辨惑论》）加益母草组成，用于治疗气血虚弱和产后血虚、瘀血诸证。方中重用黄芪大补脾肺之气，以资生血之源，为主药；当归养血补血，使阴生阳长，气旺血生，为辅药；益母草活血祛瘀，疏血中滞气，为佐使药。诸药合用，共奏补气生血、活血祛瘀之功。

【应用】 对于劳役过度所致的气血俱虚及产后血虚、瘀滞腹痛等证，均可加减运用。

【方歌】 归芪益母补虚方 补气活血功能强 芪四益二归一份 气血双亏服之良

巴戟散（《元亨疗马集》）

【组成】 巴戟天 45g 肉苁蓉 45g 补骨脂 45g 胡卢巴 45g 小茴香 30g
肉豆蔻 30g 陈皮 30g 青皮 30g 肉桂 20g 木通 20g
川楝子 20g 槟榔 15g

共为末，开水冲调，候温灌服，或水煎服。

【功效】 温补肾阳，通经止痛，散寒除湿。

【主治】 肾阳虚衰所致的腰胯疼痛，后腿难移，腰脊僵硬等证。

【方解】 命门火衰，不能温暖下焦，寒湿侵犯于腰胯，则腰脊僵硬、疼痛，后肢难移，治以温补肾阳为主。方中用巴戟天、肉苁蓉、补骨脂、胡卢巴、小茴香、肉桂温补肾阳，强筋骨，散寒痛，以治下元虚冷、肾阳不振所致的腰胯疼痛，运步不灵，为主药；辅以陈皮、青皮、槟榔健胃温脾行气，肉豆蔻温中暖脾肾；佐以少量的川楝子止痛；使以木通通经利湿，引药归肾。诸相合，温补肾阳，通经止痛，散寒除湿。

【应用】 临床对于寒伤腰胯疼痛或肾痛后腿难移等证，均可随证加减应用。

【方歌】 巴戟暖肾除寒湿 芦巴苁蓉桂故纸 川楝槟榔青陈皮 肉蔻茴香木通使

【备注】 《司牧安骥集》中的巴戟散（巴戟天、葫芦巴、破故纸、茴香、苦楝子、滑石、海金沙、槐花、木通、牵牛子），功能与本方相似。

生脉散（《内外伤辨惑论》）

【组成】 党参 90g 麦门冬 60g 五味子 30g
水煎服。

【功效】 补气生津，敛阴止汗。

【主治】 暑热伤气，气津两伤之证。证见精神倦怠，汗多气短，口渴舌干，或久咳肺虚，干咳少痰，气短自汗，舌红无津，脉象虚弱。

【方解】 本方原用于治疗暑热汗多，或久咳肺虚致气阴两伤之证。方中党参(原方为人参)补肺益气而生津，为主药；麦冬甘寒养阴，清热生津，为辅药；五味子敛肺止汗而生津，为佐药。三药相合，一补、一清、一敛，共奏益气养阴、生津止渴、敛阴止汗之效。

【应用】 本方为治气津两伤的基础方。凡热伤汗出过多，气津耗伤，体倦乏力，气短舌燥咽干口渴，舌红无津，脉虚弱之气阴虚而无外邪者，均可应用。对于胃肠炎属气津两伤者，亦可应用。

现多用本方加减治疗肺结核、慢性支气管炎、心律不齐及心源性休克、失血性休克等属气津不足者。近年来本方已被制成注射剂，使临床应用更为方便。

本方有收敛作用，如外邪未解或暑病热盛气津未伤者，不宜使用。

【方歌】 生脉麦味与参施 补气生津保肺阴 少气汗多口干渴 病危气绝效力奇

【参考】 药理研究表明，该方具有强心、保肝和解热、抗炎等作用。

六味地黄汤(《小儿药证直诀》)

【组成】 熟地黄 80g 山萸肉 40g 山药 40g 泽泻 30g 茯苓 30g 丹皮 30g
水煎服，亦可作为散剂服用。

【功效】 滋阴补肾。

【主治】 肝肾阴虚，虚火上炎所致的潮热盗汗，腰膝痠软无力，耳鼻四肢温热，舌燥喉痛滑精早泄，粪干尿少，舌红苔少，脉细数。

【方解】 本方所治诸证，皆因肾阴亏虚，虚火上炎所致。本方以肾、肝、脾三阴并补，重在补肾阴立法。方中熟地补肾滋阴，养血生津，为主药；山萸肉养肝肾而涩精，山药补脾固精，共为辅药。主辅配合，肾、脾、肝三阴同补以收补肾治本之功，称为“三补”，是本方的主体部分。泽泻清泻肾火，利水，以防熟地之滋腻；丹皮凉血清肝，泻伏火，退骨蒸，以制山萸肉之温；茯苓利脾除湿，助山药以益脾；三药同用称为“三泻”，共为佐使药。综观全方，“三补”、“三泻”，以补为主，肝、脾、肾三阴并补，以补肾为主。合而用之，补中有泻，寓泻于补，相辅相成，共成通补开泻之剂。

【应用】 本方是滋阴补肾的代表方剂，凡肝肾阴虚不足诸证，如慢性肾炎、肺结核、骨软症、贫血、消瘦、子宫内膜炎、周期性眼炎、慢性消耗性疾病等属于肝肾阴虚者，均可加减应用。

本方加知母、黄柏，名知柏地黄汤(《医宗金鉴》)，用治阴虚火旺，潮热盗汗；加枸杞子、菊花，名杞菊地黄汤(《医级》)，重在滋补肝肾以明目，用治肝肾阴虚所致的夜盲、弱视；加五味子，名都气汤(《医宗己任编》)，用治肾虚气喘；加麦冬、五味子，名麦味地黄汤(《医级》)，滋阴敛肺，用治肺肾阴虚；加柴胡、茯苓、当归、五味子，名明目地黄汤(《审视瑶函》)，滋肾养阴，平肝明目，用治肾虚目暗不明；加桂枝、附子，名肾气丸，温补肾

阳，主治肾阳不足。 本方由纯阴药物组成，凡气虚脾胃弱，消化不良、大便溏泻者忌用。

【方歌】 六味地黄滋肾肝 山药萸肉苓泽丹 再加知柏成八味 阴虚火旺治何难

【参考】 药理研究表明，本方具有抗肿瘤、提高机体免疫功能、抗应激、降血压、降血脂、降血糖、强心利尿、兴奋性生功能、抗衰老、调节钙磷代谢、镇静等作用。

百合固金汤(《医方集解》)

【组成】 百合 45g 麦冬 45g 生地 60g 熟地 60g 川贝母 30g 当归 30g
白芍 30g 生甘草 30g 玄参 20g 桔梗 20g
水煎服，或共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 养阴清热，润肺化痰。

【主治】 肺肾阴虚，虚火上炎所致燥咳气喘，痰中带血，咽喉疼痛，舌红少苔，脉细数。

【方解】 本方证是由肺肾阴亏所致。阴虚生内热，虚火上炎，则咽喉疼痛；虚火灼肺，则咳嗽气喘；咳伤肺络，则痰中带血；舌红少苔、脉细数，均为阴虚内热之象。治宜养阴清热，润肺化痰。方中百合、生地、熟地滋养肺肾之阴，均为主药；麦冬、川贝润肺养阴，化痰止咳，为辅药；玄参滋阴凉血清虚热，当归、白芍养血和阴，桔梗清肺化痰止咳，共为佐药；甘草协调诸药，并配桔梗以清利咽喉，为使药。诸药相合，养阴清热，润肺化痰。

【应用】 本方为治肺肾阴虚，咳嗽痰中带血的常用方。以咽喉疼痛、干咳无痰或痰中带血、气喘、舌红少苔、脉细数为应用要点。痰多者，加瓜蒌以清肺化痰；痰中带血、气喘甚者，可去桔梗之升提，加白茅根、仙鹤草以凉血止血。

现代常用于肺结核、慢性气管炎、支气管扩张咯血、肺炎中后期、慢性肝炎、咽炎等属于肺肾阴虚者。

本方药物多属甘寒滋腻之品，对脾虚便溏患者，应当慎用。

【方歌】 百合固金二地黄 玄参川贝桔甘藏 麦冬白芍当归配 燥火喘咳用此方

【参考】 现代药理研究表明，本方具有抑菌、抗炎、退热、祛痰止咳、镇静、镇痛、止血等作用。

蛤蚧散(《元亨疗马集》)

【组成】 蛤蚧 1对 天冬 30g 麦冬 30g 百合 30g 苏子 30g
瓜蒌 30g 马兜铃 30g 天花粉 20g 枇杷叶 20g 知母 20g
栀子 20g 汉防己 20g 秦艽 20g 升麻 20g 贝母 20g
白药子 20g 没药 20g

共为末，开水冲，候温加蜂蜜 120g 灌服。

【功效】 养阴润肺，止咳定喘。

【主治】 劳伤咳喘，四肢浮肿。

【方解】 本方为治肺肾两虚咳喘之剂。方中蛤蚧补肺肾、定咳喘，为主药。天冬、麦冬、百合、蜂蜜、瓜蒌养阴清热，润肺止咳；枇杷叶、马兜铃、苏子、贝母化痰止咳，降气平喘；知母、天花粉清肺降火，均为辅药。栀子、白药子凉血解毒；秦艽、升麻退虚热；没药活血行瘀止痛；汉防己行水祛痰，均为佐药。诸药相合，养阴润肺，止咳定喘。

【应用】 用于肺阴不足、虚火上炎之咳嗽气喘。

【方歌】 蛤蚧散苏杷百合 二冬二母没白药 升芩己蒌栀蜜花 粉清肺止喘咳

【备注】 方中升麻、防己现多已不用。

炙甘草汤(《伤寒论》)

【组成】 炙甘草 60g 党参 60g 生姜 30g 阿胶 30g 桂枝 30g

麻仁 30g 麦冬 30g 生地 120g 大枣 30 枚

水煎，加白酒 60ml 灌服。

【功效】 益气养血，滋阴复脉。

【主治】 气虚血弱。证见毛焦身瘦，脉结代，心悸动，呼吸气短，舌色淡白，口津少等。

【方解】 本方为治气虚血少，脉结代，心悸动的常用方，亦称复脉汤。方中炙甘草甘温益气通经脉，利血气，养心复脉，为主药。党参、大枣补气养脾胃，以助气血生化之源；生地、麦冬、阿胶、麻仁滋阴养血，以充其脉，为辅药。桂枝、生姜温通血脉，振奋心阳，为佐药。白酒助药势，通经脉，为使药。诸药相合，补气养血，滋阴复脉。

【应用】 临床对气血不足引起的脉结代、心悸气短等，均可加减应用。对虚劳肺痿，气阴不足之干咳无痰、痰中带血、气短、盗汗、脉虚数等，亦可用本方治疗。

现代多用于功能性心律不齐、期外收缩和低血压。

【方歌】 复脉甘草参桂姜 麦枣胶地麻仁襄 益气滋阴兼复脉 虚劳肺痿亦堪尝

【参考】 药理研究证明，本方能够明显减轻心律失常的严重程度；具有显著改善心肌结构促进细胞功能的恢复和耐缺氧的作用。

归脾汤(《济生方》)

【组成】 白术 60g 党参 60g 炙黄芪 60g 龙眼肉 60g 酸枣仁 60g

茯神 45g 当归 60g 远志 30g 木香 30g 炙甘草 15g

生姜 20g 大枣 20g

水煎服，或共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 健脾养心，益气补血。

【主治】 心脾两虚，气血不足所致的倦怠少食、心悸气短、舌淡脉弱，以及脾不统血引起的各种慢性出血证。

【方解】 本方证由心脾两虚，气血不足所致。心主血脉；脾为气血生化之源，脾虚则血无以化生，血少则心失所养，脾虚又可致气不摄血。治宜益气补血，健脾养心。方中用党参、黄芪补气健脾，使脾气健旺，生化有源，为主药。当归、龙眼肉补血养心，配合主药以气血双补，为辅药。白术、木香健脾理气，使补而不滞；远志、茯神、酸枣仁补心安神，共为佐药。甘草、生姜、大枣和胃健脾，调和诸药，为使药。诸药相合，健脾养心，益气补血。

【应用】 临床用于治疗心脾两虚证及脾虚不能统血的各种慢性出血。凡久病体虚、自汗、再生障碍性贫血、胃肠道慢性出血、水牛血红蛋白尿病、功能性子宫出血等属于心脾两虚者，均可加减应用。

【方歌】 归脾汤用参术芪 归草茯神远志随 酸枣术香龙眼肉 煎加姜枣益心脾

【参考】 药理研究证明，本方可使血压和血糖水平显著升高；通过调整胃肠的分泌、运动功能对应激性胃溃疡有较好的抑制作用；还具有激活胆碱能神经系统功能和抑制胆碱酯酶活性的作用。现代研究表明，本方有明显增加小鼠记忆力获得的作用；有抗氧化作用，抑制小鼠脑肝中过氧化脂质的生成，显著抑制胆碱酯酶活性和脑内脂褐质生成。

透脓散（《外科正宗》）

【组成】 生黄芪 60g 炮甲珠 30g 川芎 30g 当归 45g 皂角刺 30g

共为末，加白酒 100ml，水调灌服。

【功效】 补气养血，托毒溃脓。

【主治】 气血虚弱所致的疮疡久不成脓，或内已成脓而不溃者。

【方解】 本方所治疮疡，系正虚不能托毒外透，以致脓成不能溃破。方中用生黄芪补气扶正，托毒外出；当归、川芎养血活血；穿山甲、皂角刺解毒软坚，通透溃脓；以酒助药力，增强行血，活血的作用。诸药相合，扶正祛邪，托毒排脓。本方的组成特点是祛邪中兼有扶正，目的在于托毒排脓，使毒随脓泄，腐去新生。

【应用】 用于气血虚弱所致的疮疡不能成脓，或脓成而不易破溃，痈肿不消。临床应用时，疮疡已成脓，但不易破溃者，加白芷、银花解毒；气虚亏损，不能化毒成脓，或将溃之时，紫陷无根，根脚散大者，加党参、白术、炙甘草。

【方歌】 透脓散用当归芎 黄芪扶正治疮痈 山甲皂刺加酒助 托毒排脓用有功

【备注】 《医学心语》中的透脓散，即本方加白芷、牛蒡、银花，扶正祛邪，托毒溃

脓，用于疮疡内已成脓。《医宗金鉴》中的托里透脓汤，由党参、白术、穿山甲、白芷、升麻、甘草、当归、生黄芪、皂角刺、青皮组成，扶正祛邪，托里透脓，用于一切痈疽气血亏损。

第十八章 祛风方

以辛散祛风或滋阴潜阳，清热平肝药为主组成，具有疏散外风和平熄内风作用，治疗风证的一类方剂，统称祛风方。

风证有“外风”和“内风”之分，外风多由风邪侵袭肌表、筋脉、肌肉、关节等引发，如歪嘴风、破伤风等；内风由脏腑功能失调所引发，如热极生风、肝风内动、肝阳上亢、阴虚风动等。因此，祛风方也分为疏散外风和平息内风两类。

疏散外风方：适用于外风病证，以辛散祛风药为主，根据证候表现，分别配伍清热、祛湿、祛寒、养血活血药物组成，如牵正散等。

平熄内风方：适用于肝风内动、肝阳亢盛、热极风动，或热病后期的阴虚风动等病证，以平肝熄风药为主，配伍清热凉肝、滋阴养血、镇痉潜阳或化痰药组成；或以滋阴养血药为主，配伍平肝与熄风潜阳药组成。

千金散（《元亨疗马集》）

【组成】 天麻 25g 乌蛇 30g 蔓荆子 30g 羌活 30g 独活 30g 防风 30g
升麻 30g 阿胶 30g 何首乌 30g 沙参 30g 天南星 20g 僵蚕 20g
蝉蜕 20g 藿香 20g 川芎 20g 桑螵蛸 20g 全蝎 20g 旋覆花 20g
细辛 15g 生姜 30g

水煎取汁，化入阿胶，灌服，或共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 散风解痉，熄风化痰，养血补阴。

【主治】 破伤风。

【方解】 本方用治破伤风。风邪由表而入，用蝉蜕、防风、羌活、独活、细辛、蔓荆子疏散风邪，为主药。风已入内，引动肝风，用天麻、僵蚕、乌蛇、全蝎熄风解痉，以治内风，为辅药。“治风先治血，血和风自灭”，用阿胶、沙参、何首乌、桑螵蛸、川芎养血滋阴；“去风先化痰，痰去风自安”，用天南星、旋覆花化痰熄风；藿香、升麻升清降浊，醒脾开胃，共为佐使药。诸药相合，共同发挥散风解痉、熄风化痰、补血养阴的功能。

【应用】 临床用于治疗破伤风时，可根据病情随证加减。如本方加减配制的祛风解痉汤（钩藤、僵蚕、全蝎、藁本、防风、羌活、独活、天南星、乌蛇、麻黄、土鳖虫、白芷、白胡椒、甘草、细辛、蜈蚣、黄酒），煎汤保留灌肠，对马属动物破伤风有较好的疗效。

【方歌】 千金散治破伤风 牙关紧闭反张弓 天麻蔓荆蝉二活
防风蛇蝎蚕藿同 芎胶首乌辛沙参 升星旋覆蜈蚣功

牵正散(《杨氏家藏方》)

【组成】 白附子 20g 白僵蚕 20g 全蝎 20g
共为末，开水冲，加黄酒 100ml，候温灌服。

【功效】 祛风化痰，通络止痉。

【主治】 歪嘴风。证见口眼歪斜，或一侧耳下垂，或口唇麻痹下垂等。

【方解】 本方主证，俗称面瘫，系由风痰阻滞头面经络所致。方中白附子辛散，祛头目之风，为主药；僵蚕祛络中之风，兼能化痰，全蝎祛风止痉，共为辅佐药；黄酒助药力，宣通血脉，引诸药入络，直达病所，增强祛风通络作用，为使药。诸药相合，祛风化痰，通络止痉。

【应用】 本方为治风中经络、口眼歪斜的基础方。临床应用时可酌加防风、白芷、红花等，以加强疏风活血的作用；若用于风湿性或神经炎性颜面神经麻痹，可酌加蜈蚣、天麻、川芎、地龙等祛风通络止痉药物，以加强疗效。

白附子、全蝎有毒，用量不宜过大。

【方歌】 牵正散为杨家方 僵蚕全蝎白附裹 研末混合酒调服 口眼歪斜效力佳

【参考】 药理研究表明，本方具有降低血管阻力、局部麻醉、抗惊厥及一定的催眠作用。

洗肝散(《和剂局方》)

【组成】 羌活 30g 防风 30g 薄荷 30g 当归 20g 大黄 20g
栀子 20g 甘草 15g 川芎 15g
共为末，开水冲，候温灌服。

【功效】 疏散风热，清肝解毒。

【主治】 肝经风热。证见目赤肿痛，羞明流泪，四肢、关节肿痛等。

【方解】 本方为治风热上攻，目赤肿痛之剂。方中薄荷、羌活、防风宣散内郁之风热，为主药；川芎香窜上行、宣散风热，当归和肝养血，大黄清热泻火，栀子泻心利尿，导下以清上，均为辅佐药；甘草泻火解毒，调和诸药，为使药。诸药相合，疏散风热，清肝解毒。

【应用】 用于风热上攻所致的目赤肿痛，眵盛难睁，羞明流泪等证。

【方歌】 洗肝散治目赤红 风热犯肝火上攻 羌薄归芎防风草 大黄栀子降能通

镇痫散(《中兽医治疗学》)

【组成】 当归 6g 白芍 6g 川芎 9g 僵蚕 6g 钩藤 10g
全蝎 3g 朱砂 5g 蜈蚣 2 条 麝香 0.5g
共为末，开水冲，候温加入朱砂、麝香灌服(百日内幼驹剂量)。

【功效】 镇痫安神，养血熄风。

【主治】 幼畜癫痫。证见猝然昏倒，四肢抽搐，口吐涎沫，醒后如常。

【方解】 本方用治幼畜痰火壅盛，肝风内动之癫痫证。方中钩藤、僵蚕、全蝎、蜈蚣熄风镇痉，涤痰安神，为主药；当归、川芎、白芍补血养阴，熄风，为辅药；朱砂镇心定神，麝香通经开窍，共为佐药。诸药相合，涤痰镇痫，养血安神。

【应用】 用于幼驹癫痫，亦可加大剂量用于治疗成年家畜癫痫证。

【方歌】 镇痫散方朱麝研 当归川芎白芍全 蜈蚣僵蚕蝎钩藤 共末冲服治癫痫

决明散(《元亨疗马集》)

【组成】 煅石决明 45g 草决明 45g 栀子 30g 大黄 30g 白药 30g
黄药子 30g 黄芪 30g 黄芩 20g 黄连 20g 没药 20g
郁金 20g
煎汤候温加蜂蜜 60g、鸡蛋清 2 个，同调灌服。

【功效】 清肝明目，退翳消瘀。

【主治】 肝经积热，外传于眼所致的目赤肿痛，云翳遮睛等。

【方解】 本方为明目退翳之剂。方中石决明、草决明清肝热，消肿痛，退云翳，为主药；黄连、黄芩、栀子、鸡蛋清清热泻火，黄药子、白药子凉血解毒，加强清肝解毒作用，为辅药；大黄、郁金、没药散瘀消肿止痛，黄芪补脾气，均为佐药；使以蜂蜜为引。诸药相合，清肝明目，退翳消瘀。

【应用】 用于外障眼及鞭伤所致的眼目赤肿、睛生云翳、眵盛难睁、羞明畏光等证。方中黄芪现多不用。

【方歌】 决明散用二决明 芩连栀军蜜蛋清 芪没郁金二药入 外障云翳服之宁

天麻散(《司牧安骥集》)

【组成】 天麻 30g 党参(原方用人参)30g 川芎 25g 蝉蜕 20g
防风 30g 荆芥 25g 甘草 15g 薄荷 20g 何首乌 30g
茯苓 30g

水煎服，或共为末，加蜂蜜，开水冲调，候温灌服。

【功效】 益气和血，祛湿解表。

【主治】 气血虚弱偏风病或脾虚湿邪证和脾虚风邪证。证见偏头直项，眼目歪斜，神昏似醉，站立如痴，口色青紫，脉象迟细。

【方解】 本方用治马、骡脾虚湿邪偏风证。方中天麻甘温镇定，平肝养阴，‘解痉熄风，为主药。防风、薄荷、荆芥解表散风，清利头目；蝉蜕祛风解痉，共为辅药。茯苓健脾渗湿，党参补气健脾，川芎行气活血，何首乌滋肝养血，均为佐药。甘草调和诸药为使药。各药合用，疏散风邪，益气活血。

【应用】 临床上用于治疗马、骡脾虚湿邪挟风证（相当于某些脑病或中毒性疾病过程中出现的慢性脑水肿等）。若神志迷乱，加远志、郁金；血虚明显，加当归、白芍；湿邪重，加苍术、石菖蒲。

【方歌】 熄风祛湿天麻散 苓参防风薄荷蝉 首乌荆芎与甘草 脾虚湿邪服之安

镇肝熄风汤（《衷中参西录》）

【组成】 怀牛膝 90g 生赭石 90g 生龙骨 45g 生牡蛎 45g 生龟板 45g
生杭芍 45g 玄参 45g 天冬 45g 川楝子 15g 生麦芽 15g
茵陈 15g 甘草 15g

水煎服，或共为末，开水冲调，候温灌服。

【功效】 镇肝熄风，滋阴潜阳。

【主治】 阴虚阳亢，肝风内动所致的口眼歪斜、转圈运动或四肢活动不利、痉挛抽搐、脉弦长有力。

【方解】 本方证因肝肾阴亏，肝阳上亢，肝风内动，气血逆乱，蒙扰清窍所致。方中重用牛膝滋养肝肾，引血下行，为主药。重用赭石、合龙骨、牡蛎降逆气，镇肝熄风，为辅药。龟板、玄参、杭芍、天冬滋阴清热，协助主药以制阳亢；茵陈、川楝子、生麦芽清泄肝热，疏肝理气，共为佐药。甘草调和诸药，合麦芽和胃调中防金石药伤胃之弊，为使药。诸药相合，镇肝熄风，潜阳滋阴。

【应用】 用于治疗肝阳上亢，肝肾阴虚，肝风内动导致的拘挛抽搐、口眼歪斜、转圈运动等证。

【方歌】 镇肝熄风芍天冬 牛膝麦芽赭石同 玄楝龟茵龙牡草 肝阳上亢此方宗

【参考】 药理研究证明，本方加减具有明显的降血压作用。

补阳还五汤（《医林改错》）

【组成】 黄芪 200~400g 当归 40g 赤芍 30g 地龙 30g
川芎 30g 桃仁 30g 红花 30g
水煎服。

【功效】 补气活血，祛瘀通络。

【主治】 中风证。证见腰瘫腿疾，四肢软弱无力，口角流涎，口眼歪斜，小便频数或遗尿等。

【方解】 本方证是气血瘀阻脑血管脉络，或中风后，气虚血滞瘀阻所致。治宜补气活血通络。方中重用黄芪大补元气，使气旺血行，为主药；当归活血祛瘀而不伤正，为辅药；赤芍、川芎、桃仁、红花协同当归活血祛瘀，共为佐药；地龙力专性走，通经活络，以行药势，为使药。全方补气药和活血药相配伍，补气药多于活血药，使气旺血行，瘀去络通。

【应用】 本方为治疗中风后气虚血瘀所致诸证的常用方剂，也适用于治疗其它原因引起的瘫痪、截瘫及四肢痿软等属于气虚血瘀者。本方必须在患者体温正常、出血停止时方可投服。另外，应用本方时，黄芪量宜重，祛瘀药量宜轻。

【方歌】 补阳还五芪归芎 赤芍桃红加地龙 四肢痿软中风证 益气活血通经络

【参考】 现代药理研究证明，本方主要有扩张血管、强心、降压、抑制血小板聚集、抗炎免疫和增强细胞吞噬等作用。

第十九章 安神与开窍方

以养心安神药为主组成，具有重镇安神功能，治疗惊悸、神昏不安等证的方剂，称为安神方。

以芳香走窜，醒脑开窍药物为主组成，具有通关开窍醒神作用，用于治疗窍闭神昏、气滞痰闭等证的方剂，称为开窍方。

朱砂散（《元亨疗马集》）

【组成】 朱砂（另研）10g 党参 30g 茯神 45g 黄连 45g
共为末，开水冲，候温，加猪胆汁 50ml，童便 100ml，灌服。

【功效】 重镇安神，扶正祛邪。

【主治】 心热风邪。证见全身出汗，肉颤头摇，气促喘粗，左右乱跌，口色赤红，脉洪数。

【方解】 本方证由外感热邪，热积于心，扰乱神明所致。方中朱砂微寒，清热镇心安神，为主药；辅以黄连苦寒，清降心火；茯神宁心安神除烦，党参益气宁神，固卫止汗，扶正祛邪，共为佐药。诸药合用，安神清热，扶正祛邪。

【应用】 用于心热风邪等证。对于家畜热衰竭、日射病或热射病后期属于邪盛正衰者，配合放髻脉血、冷水浇淋头部、冷水灌肠和将动物置于阴凉通风处等措施，效果更佳。对火盛伤阴者，加生地、竹叶、麦冬；正虚邪实者，加栀子、大黄、郁金、天南星、明矾等。

【方歌】 朱砂散中茯神用 党参扶正在其中 再合黄连清心火 心热风邪治有功

【备注】 本方与《元亨疗马集》中治疗黑汗风的茯神散(茯神、朱砂、雄黄)，均可用于治疗家畜中暑和高热癫痫等证。

镇心散(《元亨疗马集》)

【组成】 朱砂(另研)10g 茯神 30g 党参 30g 防风 30g 远志 30g
栀子 30g 郁金 30g 黄芩 30g 黄连 20g 麻黄 20g 甘草 20g
共为末，开水冲，候温加鸡蛋清 4 个、蜂蜜 120g，灌服。

【功效】 清热祛风，镇心安神。

【主治】 马心黄。证见眼急惊狂，浑身肉颤，汗出如浆，咬身啮足，口色赤红，脉象洪数。

【方解】 本方由朱砂散加味而来。方中朱砂重镇安神，清心为主药。黄连、黄芩、栀子清热泻火，茯神、远志宁心安神，共为辅药。郁金凉血解郁，除三焦郁热；麻黄、防风疏风解表，以散热出表；党参扶正祛邪，皆为佐药。甘草益气和中，调和诸药，为使药。诸药相合，清热祛风，镇心安神。

【应用】 用于表里热盛，热极生风的惊狂、抽搐及神失所主等证。本方加减对马、骡脑炎、脑膜脑炎和慢性脑水肿等表现为中枢神经系统功能紊乱、高度兴奋的疾病有一定疗效。若热盛伤阴，可加生地、麦冬；痰火过盛，加连翘、南星、竹茹等。

【方歌】 镇心散朱栀麻黄 茯神远志郁金防 党参芩连甘草入 心热惊狂服之良

【备注】 《元亨疗马集》中另一镇心散(朱砂、茯神、人参、防风、甘草、远志、栀子、黄芩、黄连)和《司牧安骥集》中的镇心散(人参、桔梗、白芷、白茯苓)均有安神镇惊作用，亦可用治心热风邪。

通关散(《丹溪心法附余》)

【组成】 猪牙 皂角 细辛 各等份
共为极细末，和匀，吹少许人鼻取嚏。

【功效】 通关开窍。

【主治】 高热神昏，痰迷心窍。证见猝然昏倒，牙关紧闭，口吐涎沫等。

【方解】 本方为急救催醒之剂。方中皂角味辛散，性燥烈，祛痰开窍；细辛辛香走窜，

开窍醒神，二者合用有开窍通关的作用。因鼻为肺窍，用于吹鼻，能使肺气宣通，气机畅利，神识苏醒而用于急救。

【应用】 急救高热神昏，痰迷心窍。本方为临时的急救方法，苏醒后应按病辨证施治。

【方歌】 皂角细辛通关散 吹鼻醒神又豁痰

【备注】 《证治准绳》中的通关散为本方加南星、半夏、薄荷、雄黄，研末吹鼻，其功用相同。《元亨疗马集》中的麝香散为本方加谷精草、胡椒、瓜蒂、麝香，研末吹鼻，用治伤水起卧。

第二十章 驱虫方

以驱虫药物为主组成，具有驱除或杀灭寄生虫的作用，用于治疗畜禽体内外寄生虫病的方剂，称为驱虫方。

常见的体内寄生虫有蛔虫、肝片吸虫、马胃蝇幼虫、绦虫、蛲虫、钩虫等，常见的体外寄生虫有螨、虱等。本类方剂主要适用于体内寄生虫引起的腹痛、胀满、贪食消瘦、口色淡白等虫积证和疥螨、虱等外寄生虫病。

组成驱虫方的药物，如雷丸、鹤虱、贯众、苦楝根皮等，都有不同程度的毒性，在使用时应注意掌握准确的剂量和服药间隔时间。同时，驱虫方在服法上，多空腹服，或配伍适当的泻下药，以加速寄生虫的排出。驱虫之后，当调补脾胃，使虫去而正不伤。

万应散（《医学正传》）

【组成】 槟榔 30g 大黄 60g 皂角 30g 苦楝根皮 30g 黑丑 30g
雷丸 20g 沉香 10g 木香 15g
共为末，温水冲服。

【功效】 攻积杀虫。

【主治】 蛔虫、姜片吸虫、绦虫等虫积证。

【方解】 方中雷丸、苦楝根皮杀虫，为主药；黑丑、大黄、槟榔、皂角既能攻积，又可杀虫，为辅药；木香、沉香行气温中为佐药。合而用之，具有攻积杀虫之功。

【应用】 用于驱出蛔虫、姜片吸虫、绦虫等虫积症。本方攻逐力较强，对孕畜及体弱者慎用。

【方歌】 万应散中槟丑黄 苦楝根皮和木香 沉香皂角雷丸入 驱虫化积用此方

肝蛭散（《中华人民共和国兽药典·二部》2000年版）

【组成】 苏木 30g 肉豆蔻 20g 茯苓 30g 绵马贯众 45g 龙胆草 30g
木通 20g 甘草 20g 厚朴 20g 泽泻 20g 槟榔 30g

共为末，开水冲调，候温灌服，或水煎服。

【功效】 驱虫利水，行气健脾。

【主治】 肝片吸虫病。

【方解】 方中贯众、槟榔杀虫为主药；苏木活血止痛，龙胆草清肝胆火，厚朴行气导滞，均为辅药；虫阻肝胆，疏泄失常，使脾失健运而水湿不化，故佐以茯苓、泽泻、木通健脾渗湿，肉豆蔻温中，涩肠止泻；甘草健脾和中，调和诸药，为使药。各药合用，发挥驱虫利水、行气健脾的功效。

【应用】 用于牛、羊的肝蛭病（肝片吸虫）。体虚者，加党参、白术益气健脾；寒盛者，加附子、干姜温中散寒。

【方歌】 肝蛭散治肝蛭病 苏木槟榔贯众龙 厚朴甘草肉豆蔻 木通泽泻茯苓同

驱虫散（《中华人民共和国兽药典·二部》2000年版）

【组成】 鹤虱 30g 使君子 30g 槟榔 30g 芫荽 30g 雷丸 30g
贯众 60g 炒干姜 15g 制附子 15g 乌梅 30g 诃子肉 30g
大黄 30g 百部 30g 木香 25g 榧子 30g

为末，开水冲调，候温灌服，或水煎服。

【功效】 驱虫。

【主治】 胃肠道寄生虫病。

【方解】 方中鹤虱、使君子、贯众、雷丸、芫荽、百部、榧子具有驱杀胃肠道寄生虫的作用；槟榔杀虫攻积，下气行滞；大黄泻下以排出虫体；木香理气止痛；附子、干姜温中散寒；乌梅安蛔驱虫；诃子敛肺下气，涩肠止泻。各药合用，具有驱杀攻逐虫体的功效。

【应用】 治疗家畜胃肠道寄生虫病。

【方歌】 驱虫鹤虱使君子 槟荽雷贯炒干姜 附子乌诃大百木 再入榧子驱虫佳

贯众散（《中兽医治疗学》）

【组成】 贯众 60g 使君子 30g 鹤虱 30g 芫荽 30g 大黄 40g
苦楝子 15g 槟榔 30g

共为末，开水冲调，候温灌服，亦可煎汤服。

【功效】 驱虫。

【主治】 胃肠道寄生虫病。

【方解】 方中贯众、使君子、鹤虱、茺莢驱杀胃肠道寄生虫；大黄利便通肠，驱虫外出；槟榔杀虫攻积，下气行滞；苦楝子杀虫，疏肝止痛。各药合用，有驱杀攻逐寄生虫的作用。

【应用】 治疗胃肠道寄生虫病，尤其对马胃蝇(马瘦虫病)疗效较好。若动物脾胃虚弱，可考虑兼补脾胃。

【方歌】 贯众散中虱茺莢 使君大黄添加齐 此方能治瘦虫病 空腹灌服才相宜。

第二十一章 外用方

以外用药为主组成，能够直接作用于病变局部，具有清热凉血、消肿止痛、化腐拔毒、排脓生肌、接骨续筋和体外杀虫止痒等功效的一类方剂，称为外用方。

外用方以局部熏洗、涂搽、撒布、敷贴、点眼、吹鼻等为主要运用方式，多用于治疗疮黄肿毒、皮肤病、眼病和某些内科病证等。对于某些顽固性或病情严重的外科病证，可配合内服方药，以加强疗效。

本类方剂中的药物多具有刺激性或毒性，不宜过量使用，涂搽面积亦不宜过大，以免引起肿胀疼痛或畜体中毒。

桃花散(《医宗金鉴》)

【组成】 陈石灰 250g 大黄 45g

陈石灰用水泼成末，与大黄同炒至石灰呈粉红色为度，去大黄，将石灰研细末，过筛，装瓶备用。外用撒布于创面。

【功效】 防腐收敛止血。

【主治】 创伤出血。

【方解】 方中石灰解毒防腐，收敛止血；大黄凉血解毒。二药同炒增强石灰敛伤止血之功。

【应用】 外撒创面或撒布后用纱布包扎，以治疗新鲜创伤出血、化脓疮、褥疮、猪坏死杆菌病等。

【方歌】 桃花散石灰大黄 外伤出血速撒上

【参考】 药理研究证明，本方具有止血、加速新鲜创伤愈合、促进局部坏死组织分离、防止创腔毒素吸收及抗菌等作用。

冰硼散(《外科正宗》)

【组成】 冰片 50g 朱砂 60g 硼砂 500g 玄明粉 500g

共为极细末，混匀，吹撒患部。

【功效】 清热解毒，消肿止痛，敛疮生肌。

【主治】 舌疮。

【方解】 方中冰片、硼砂芳香化浊，清热解毒，消肿；朱砂防腐解毒，疗疮；玄明粉清热泻火，解毒消肿。四药合用，清热解毒，消肿止痛。

【应用】 用于咽喉肿痛，口舌生疮。

【方歌】 冰棚散效实堪夸 玄明粉与辰朱砂 朱砂冰片共细末 咽肿舌疮一把抓

【参考】 药理研究证明，本方能够明显促进口腔溃疡愈合，而且对口腔正常黏膜无明显不良影响，还具有抗菌、抗炎和镇痛作用。

青黛散（《元亨疗马集》）

【组成】 青黛 黄连 黄柏 薄荷 桔梗 儿茶 各等份

共为极细末，混匀，装瓶备用。用时装入纱布袋内，口噙，或吹撒于患处。

【功效】 清热解毒，消肿止痛。

【主治】 口舌生疮，咽喉肿痛。

【方解】 方中青黛清热解毒；黄连、黄柏助青黛清热解毒，消肿；薄荷、桔梗疏散风热，清利咽喉，祛痰排脓；儿茶收敛生肌，止痛。诸药相合，清热解毒，消肿止痛。

【应用】 用于心热舌疮、咽喉肿痛。

【方歌】 青黛散用治舌疮 黄柏黄连薄荷裹 桔梗儿茶共为末 口噙吹撒可安康

如意金黄散（《外科正宗》）

【组成】 天花粉 120g 黄柏 60g 大黄 60g 白芷 60g 姜黄 60g

生南星 60g 苍术 30g 厚朴 30g 陈皮 30g 生甘草 30g

共研细末，混匀，装瓶备用。用时以醋或蜂蜜调敷患部。

【功效】 清热解毒，消肿止痛

【主治】 阳证疮痈肿毒，跌打损伤。

【方解】 方中天花粉、黄柏、大黄药性寒凉，清热泻火，散瘀消肿；姜黄辛温，活血行气；生南星散结消肿；苍术、厚朴、陈皮行气除湿；白芷疏风活血，消肿定痛；生甘草解毒；醋或蜂蜜调敷以除热毒。诸药合用，共有清热解毒，消肿止痛之效。

【应用】 疮疡肿毒未成脓者或湿疹等。临床凡疮疡证见红肿热痛属阳证者，均可应用，

亦可用治烫火伤。

【方歌】 如意金黄散大黄 姜黄黄柏芷陈苍 南星厚朴花粉草 敷之肿胀可安康

雄黄散(《痊骥通玄论》)

【组成】 雄黄 白及 白蔹 龙骨 大黄 各等份

共为细末，温醋或水调敷，亦可撒布创面。

【功效】 清热解毒，消肿止痛。

【主治】 体表各种急性黄肿，而见红、肿、热、痛，尚未溃脓者。

【方解】 方中雄黄解毒防腐；龙骨生肌敛疮；白及消肿生肌，收敛止血；白蔹清热解毒，消肿生肌；大黄清热泻火，逐瘀消肿。诸药相合，清热解毒，散瘀消肿。

【应用】 用于各种外科炎性肿胀，无破溃者。加白矾、冰片、黄连可加强清热解毒功效，用于非开放性急性炎症，疗效较好。

【方歌】 雄黄散用白及蔹 龙骨大黄共同研 醋水调匀敷患部 消肿散瘀此方验

【备注】 《司牧安骥集》中的雄黄散(雄黄、白及、白蔹、官桂、草乌头、芸薹子、白芥子、大黄、硫黄)，治马诸般肿毒，筋骨大硬。《抱犊集》中的雄黄散(雄黄、川椒、白及、白蔹、草乌、大黄、硫黄、白芥子)，治牛诸般肿毒及筋骨胀。

防腐生肌散(《中兽医诊疗》)

【组成】 枯矾 500g 陈石灰 500g 熟石膏 400g 没药 400g 血竭 250g

乳香 250g 黄丹 50g 冰片 50g 轻粉 50g

共为极细末，混匀，装瓶备用。用时撒布创面或填塞创腔。

【功效】 防腐吸湿，生肌敛疮。

【主治】 痈疽疮疡及外伤出血等。

【方解】 方中枯矾、石灰、石膏吸湿生肌敛疮；没药、乳香、血竭生肌消肿止痛；冰片清热消肿止痛；轻粉防腐止痒；黄丹防腐拔毒生肌，且增加黏性，使各药易附着于创面。诸药相合，防腐生肌，吸湿敛疮。

【应用】 用于疮痛溃烂、创口不敛。

【方歌】 外用防腐生肌散 膏灰乳没血竭丹 冰矾轻粉共研末 用治疮疡与溃烂

防风汤(《元亨疗马集》)

【组成】 防风 荆芥 花椒 薄荷 苦参 黄柏 各等份

水煎二沸，去渣，候温洗患部。

【功效】 清热祛风，消肿解毒。

【主治】 各种创伤、肿毒、疮疡溃破、直肠脱、阴道脱等。

【方解】 本方为外洗消肿解毒之剂。方中防风祛风解毒；荆芥解毒散邪；薄荷清凉止痒；花椒活血消肿；黄柏、苦参清热燥湿，疗疮解毒。诸药相合，疏风清热，解毒消肿。

【应用】 外洗疮疡。

【方歌】 防风汤用洗疮疡 荆芥花椒薄荷防 苦参黄柏均等份 消肿解毒功效强

拨云散（《元亨疗马集》）

【组成】 炉甘石 30g 硼砂 30g 青盐 30g 黄连 30g 铜绿 30g

硃砂 10g 冰片 10g

共为极细末，过筛；装瓶备用。点眼用。

【功效】 解毒防腐，退翳明目。

【主治】 外障眼。

【方解】 本方为外用解毒，退翳明目的专用剂。方中炉甘石拨云退翳，解毒防腐，为眼科要药；冰片、硼砂消肿解毒，防腐；青盐、铜绿去腐解毒，退目翳；硃砂收湿止痒；硼砂收敛消肿；黄连清心明目。诸药相合，解毒去腐，明目退翳。

【应用】 用于暴发火眼、红肿流泪、眼边红烂和外障云翳等眼疾。

【方歌】 拨云散连青盐铜 硃砂甘石冰片棚 上药一处研细末 外障云翳医建功

【备注】 《中兽医诊疗》中拨云散以朱砂、硃砂、硼砂、炉甘石、黄连、冰片组成，其功用、主治类同。

烫火散（《中华人民共和国兽药典·二部》2000年版）

【组成】 地榆炭 250g 黄柏 125g 生石膏 125g 大黄 60g 寒水石 60g

共为细末，混匀。用时麻油调涂患处。

【功效】 清解火毒。

【主治】 烫伤、烧伤。

【方解】 方中地榆炭、大黄收敛，凉血解毒，散瘀消肿；黄柏清热消肿；生石膏、寒水石清热泻火；麻油滋润肌肤。各药合用，药性寒凉，有清解火毒，消肿润肤之效。

【应用】 外涂治烫火伤。

【方歌】 烫火散用石膏寒 大黄黄柏地榆炭 共为细末麻油调 烫火烧伤涂之安

擦疥方(《元亨疗马集》)

【组成】 狼毒 120g 牙皂 120g 巴豆 30g 雄黄 9g 轻粉 6g

共为细末，用热油调匀擦之。隔日一次。

【功效】 杀虫止痒。

【主治】 疥癣。

【方解】 本方诸药均系辛散有毒之品，可以毒杀疥螨，消肿止痒。

【应用】 治疗家畜疥癣。本方有杀疥、止瘙痒的作用，所用药物均为有毒之品，应用时应分片涂擦，并防止患畜舔食。

【方歌】 畜患疥癣痒难当 疥螨藏肤皮糙伤 狼毒巴豆雄轻粉 用油调擦虫灭康

第二十二章 饲料添加方

饲料添加方，是以饲料添加剂的方式，通过添加于饲料中给药的一类方剂，统称为饲料添加方，又称中草药饲料添加剂。严格来讲，这只是给药方式比较特殊的一类方剂。

中草药作为饲料添加剂，在我国有着悠久的历史，早在西汉刘安所著的《淮南子·万毕术》中就记载有“取麻子三升，捣千余杵，煮为羹，以盐一升，著中；和以糠三斛，饲豚，则肥也”的“麻盐肥豚豕法”；《神农本草经》中也有“桐叶饲猪，肥大三倍，且易养”的记载。但中草药饲料添加剂研究和应用的广泛开展，却始于 20 世纪 70 年代末期，且因其具有毒副作用小，不易在肉、蛋、奶等畜产品中产生有害残留的特点，越来越受到国内外的重视，成为畜禽饲料添加剂中的一个独特系列。

在集约化畜牧业生产中，中草药饲料添加剂主要用于保障动物的健康，防病治病，增加动物产品的产量，改善其质量，以及改善饲料的品质等方面。在组成中草药饲料添加剂配方时，往往要根据应用的目的，考虑到各种动物的不同生理特点，各种疾病的不同病因、病机和症状表现，在中兽医辨证的基础上，确定组方原则，做到以法统方，方从法立，扬长避短。必要时，还可中西药结合组方，发挥中西药各自的优势。当然，在某些特殊用途时，也可根据具体的应用目的，选择适当单味药物或多味药物组方，而不考虑组方原则。

目前，中草药饲料添加剂尚无统一的分类标准，一般可根据其来源、作用及加工程度进行分类。

1. 按来源分有植物类、矿物类及动物类饲料添加剂三种，其中植物类中药所占比例最大。据不完全统计，目前用于饲料添加剂的植物类中药有麦芽(或谷芽)、神曲、山楂、苍术、松针、陈皮、贯众等近二百种，矿物类中药有芒硝(或玄明粉)、麦饭石、雄黄、明矾等数十种，而动物类中药所占比例较小，见于报道的有土鳖虫、蚯蚓、蚕蛹、蛤蚧、僵蚕等十数种。

2. 按作用分可分为增加动物产品产量类、改进动物产品质量类、保障动物健康类及其

它类等。

(1) 增加动物产品产量主要用于促进动物的生长发育, 提高肉、蛋、奶的产量, 如在猪的饲料中添加松针粉、麦饭石、党参茎叶或调理脾胃的药物(黄芪、白术)等, 在肉鸡、蛋鸡、鹅、鸭、鹌鹑的饲料中添加松针粉、松针膏、蜂花粉、泡桐叶、艾叶、钩吻或杨树花等药物, 在兔的日粮中加沙棘等, 分别具有促进产肉、产蛋及降低料重比或料蛋比等作用。这类方剂多以健脾开胃、补气养血为组成原则。

(2) 改进动物产品质量 主要包括改善动物产品(肉、蛋)的色泽和风味两个方面, 如在产蛋鸡的基础日粮中添加 0.05% 松针活性物, 可使蛋黄颜色变深; 在肉鸡的饲料中添加大蒜粉, 可改善鸡肉的风味等。这类方剂常根据具体的目的要求选择合适的药物。

(3) 保障动物健康即增强动物体抵抗力和防治动物疫病, 是中草药饲料添加剂的主要用途之一。如在鸡的饲料中添加金荞麦提取物, 可治疗支原体病; 添加大蒜粉, 可防治鱼、虾的维生素 B₁₂ 缺乏症和肝病; 添加甘草, 可防治鸡肌胃糜烂; 添加“鸡痢灵”(雄黄、白头翁、马齿苋、藿香等), 可防治雏鸡白痢; 添加补气类中药, 能提高雏鸡的抗应激能力, 降低死亡率等等。这类方剂常根据具体用途, 在中兽医辨证的基础上, 以调整阴阳、祛邪逐疫为原则, 选择合适的药物组方。

(4) 其它作用包括提高肉、蛋、奶中某些成分的含量, 刺激动物的食欲, 改善饲料的品质等多个方面。如用海藻作饲料添加剂喂鸡, 一周后所产蛋中有机碘含量是普通蛋的 15~30 倍, 可作为食疗药蛋; 有些天然产物添加剂, 用茴香油、大蒜、砂糖等作为饲料调味品, 可以刺激动物食欲; 用腐殖酸类(泥炭、褐煤、风化煤)作为饲料添加剂, 不但可以提高饲料营养价值, 还可抑制氧化, 促进饲料中的脂肪分散, 防止抗生素、维生素失活; 用膨润土、石英粉等作为饲料添加剂, 可以防止饲料结块等。这类方剂, 多根据其使用目的选择合适的药物。

3. 按加工程度分可分为原产物、加工提取物和副产物三类。原产物为天然产物, 经过清洗、干燥、传统炮制、粉碎等简单加工而制成的添加物; 加工提取物是天然产物经过提取、精制而成的饲料添加物, 如松针活性提取物、党参提取物等; 副产物是天然产物经加工利用后的剩余部分, 如党参茎叶、人参渣、沙棘渣等。

目前所生产和使用的中草药饲料添加剂, 在剂型上以散剂为主, 也有采用预混剂形式的, 即将中药或其提取物预先与某种载体混合均匀制成添加剂, 如将松针提取物和载体松针粉混合制成饲料添加剂。除此之外, 还有颗粒剂和饮水剂等剂型, 供添加到饲料中, 或作为饮水添加剂使用。

在给药方式上, 中药饲料添加剂, 主要采用群体用药的方式。为了达到促进生产、防病治病等目的, 饲料添加剂或混饲剂的运用要做到适时、适量、适度。适时, 就是要抓住时机, 及时应用; 适量, 就是添加的量既不可过多, 也不可太少, 应在剂量允许的范围之内, 发挥其最佳效果; 适度, 是指添加剂投药时间长短要适当。添加日程的长短, 通常要根据添加剂

或混饲剂的应用目的以及生产需要而定，大体可分为长程添加法、中程添加法和短程添加法三种。长程添加法持续添加时间一般在 4 个月以上，甚至终生添加；中程添加法持续添加时间一般为 1~4 个月；短程添加法持续添加时间一般是 2~30 天。有时还可采用间歇式添加法，如三二式添加法(添加 3 天，停止 2 天)，五三式添加法(添加 5 天，停止 3 天)等。

当前，中草药饲料添加剂已用于马、牛、羊、猪、犬、禽、鱼、虾、蚕、蜂等多种动物的促进生产性能和防病治病等方面。据不完全统计，截至 2000 年底，有记录的中草药饲料添加方已达 400 余个，本节仅列举几个有代表性的方剂供学习参考。

承气治僵散(《兽医验方新编》)

- 【组成】** 大黄 500g 芒硝 500g 枳实 500g 厚朴 500g 甘草 500g
氯化锌 3g 氯化钴 3g 硫酸铜 5g 硫酸镁 5g 碘化钾 5g
共为末，按 0.1% 量拌料饲喂。
- 【功效】** 健胃消食，促进生长
- 【主治】** 僵猪。

肥猪散(《中华人民共和国兽药典·二部》2000 年版)

- 【组成】** 绵马贯众 30g 何首乌(制) 30g 麦芽 500g 黄豆 500g
共为末，按每只猪 50~100g 拌料饲喂。
- 【功效】** 开胃，驱虫，补养，催肥。
- 【主治】** 食少，瘦弱，生长缓慢。

催情散(《中华人民共和国兽药典·二部》2000 年版)

- 【组成】** 淫羊藿 6g 阳起石(酒淬) 6g 当归 4g 香附 5g 益母草 6g 菟丝子 5g
共为末，按每只猪 30~60g 拌料饲喂。
- 【功效】** 催情。
- 【主治】** 母猪不发情。

健鸡散(《中华人民共和国兽药典·二部》2000 年版)

- 【组成】** 党参 20g 黄芪 20g 茯苓 20g 神曲 10g 麦芽 10g
山楂(炒) 10g 甘草 5g 槟榔(炒) 5g

共为末，按 2% 的量混饲喂鸡，连喂 3~7 天。

【功效】 益气健脾，消食开胃。

【主治】 食欲不振，生长迟缓。

蛋鸡宝(《中华人民共和国兽药典·二部》2000 年版)

【组成】 党参 100g 黄芪 200g 茯苓 100g 白术 100g 麦芽 100g 山楂 100g 神曲 100g 菟丝子 100g 蛇床子 100g 淫羊藿 100g

共为末，按 2% 的量拌料饲喂。

【功效】 益气健脾，补肾壮阳。

【应用】 用于提高产蛋率，延长产蛋高峰期。

激蛋散(《中华人民共和国兽药典·二部》2000 年版)

【组成】 虎杖 100g 丹参 80g 菟丝子 60g 当归 60g 川芎 60g 牡蛎 60g 地榆 50g 肉苁蓉 60g 丁香 20g 白芍 50g

共为末，按 1% 的量拌料饲喂。

【功效】 清热解毒，活血祛瘀，补肾强体。

【主治】 输卵管炎，产蛋功能低下。

鸡痢灵散(《中华人民共和国兽药典·二部》2000 年版)

【组成】 雄黄 10g 藿香 10g 白头翁 15g 滑石 10g 诃子 15g 马齿苋 15g 马尾连 15g 黄柏 10g

共为末，治疗量：每只雏鸡 0.5g；预防量：按 1%~2% 的量拌料饲喂。

【功效】 清热解毒，涩肠止泻。

【主治】 雏鸡白痢。

驱球散(《中国兽医杂志》)

【组成】 常山 2500g 柴胡 900g 苦参 1850g 青蒿 1000g 地榆炭 900g 白茅根 900g

加水煎煮 3 次，浓缩至 2800ml，或将以上中药粉碎，过筛。治疗量：将原药液稀释至 25% 的浓度，每千克饲料中加入 250ml 稀释药液，拌匀，连续

喂鸡 8 天；预防量：按 0. 5% 的量拌料饲喂，连服 5 天。

【功效】 驱虫平肝，止血止痢。

【主治】 鸡球虫病。

百咳宁(《中兽医医药杂志》)

【组成】 柴胡 30g 荆芥 30g 半夏 30g 茯苓 30g 甘草 30g 贝母 30g
桔梗 30g 杏仁 30g 玄参 30g 赤芍 30g 厚朴 30g 陈皮 30g
细辛 6g

共为末，按每日每千克体重 1g 生药的量给药。将药粉用沸水焖半小时，取上清液，加水适量供饮用。药渣拌饲料喂鸡。

【功效】 止咳平喘，燥湿化痰。

【主治】 鸡呼吸道炎症。

虾蟹脱壳促长散(《中华人民共和国兽药典·二部》2000 年版)

【组成】 露水草 50g 龙胆 150g 泽泻 100g 沸石 350g 夏枯草 100g
筋骨草 150g 酵母 50g 稀土 50g

共为末，虾蟹饲料中添加 0. 1%。

【功效】 促脱壳，促生长。

【主治】 虾蟹脱壳迟缓。

蚌毒灵散(《中华人民共和国兽药典·二部》2000 年版)

【组成】 黄芩 60g 黄柏 20g 大青叶 10g 大黄 10g

共为末，每立方米水体泼洒 1g。

【功效】 清热解毒。

【主治】 三角帆蚌瘟病。

仙珠呋喃合剂(《天然物中草药饲料添加剂大全》)

【组成】 仙鹤草 250g 紫珠草 100g 板蓝根 500~700g 呋喃唑酮 5g
煎汤，呋喃唑酮混于精料或面糊中，共同拌青饲料投喂 50kg 鱼 5~7 天。

【功效】 清热解毒，止血消炎。

【主治】 草鱼出血病。

附：类方摘编

【医牛羊驼方】

1 防治时疫寒热方

百病消散

出自《牛经备要医方》。细陈茶叶 60g 砂糖 250g 神曲 30g 生姜 15 片 葱白 15 枚 米醋 30g 水煎，候温灌服。天之时行不正，或霉蒸阴晦，或久雨不止，或夏时懊闷，宜常服此方，可免牛痧秽之患。

避瘟丹

出自《三农纪》。乳香 苍术 细辛 甘松 川芎 降真香 为末，早晚于栏中点燃薰之。功能逐邪避疫。用于牛避疫。

据《中兽医诊疗经验》第 4 集载，其配方剂量及用法为：甘松、乳香、苍术各 6g，川芎、降香、细辛各 3g 为末，用谷糠或柏木锯末置炉内燃烧，将上述药末撒于其上，置舍内薰蒸。有一定的杀灭病菌作用。

雄黄散

出自《中兽医医药杂志》1984 年第 3 期。雄黄 200g 苍术 200g 大黄 100~200g 重楼 50g 黑升麻 100g 山慈姑 40g 冰片 10~15g 粪便正常或便秘时大黄用 200g，腹泻时用 100g。将雄黄另研，其他六味药为末，混合开水冲调，候温灌服，每日 1 剂，一般 7 天为一疗程。功能清热解毒，祛风燥湿，明目退翳。主治水牛恶性卡他热，角膜混浊。

麻黄附子细辛汤

出自《牛经备要医方》。麻黄 25g 附子 25g 细辛 30g 干姜 30g 当归 30g 川芎 30g 升麻 18g 青皮 60g 木通 90g 滑石 90g 甘草 30g 车前子 60g 葱头 20 枚、陈酒 250g 为引，水煎去渣，候温灌服。功能辛温解表。主治牛患寒证，证见四足冰冷、角冷、肌肉冷、毛竖尾缩、舌白、不渴，名曰冷痧。

流特灵

出自《兽医中草药验方选》。鹅脚板 200g 阔叶十大功劳 240g 车前草 240g 苦木 240g 煎汤去渣，候温灌服。功能发散表邪，清热解毒。主治牛时行感冒。

原方云，已验证 1074 头牛、猪，对流行性感冒有良好疗效。方中的鹅脚板为伞形科植物异叶茴芹的全草。

七宝汤

又名邓汤，出自《藏兽医经验选编》。诃子 山楂 川楝子 藏木香 干姜 木藤蓼草

本悬钩子各 30g 煎汤去渣。候温灌服，日服 2 次。功能清热散寒，祛风利湿，敛肺止咳。主治风寒感冒，咳嗽流鼻。

木藤蓼为蓼科植物，功能清热去湿。

当归柴胡饮

河南省驻马店地区验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。当归 45g 柴胡 60g 煎汤去渣，候温灌服。功能和解表里。主治牛半表半里证，寒热往来。

大黄芩连汤

出自《牛经备要医方》。大黄 60g 黄芩 90g 赤芍 60g 车前子 90g 黄连 18g 生石膏 90g 白矾 30g 朴硝 120g 滑石 120g 甘草 30g 木通 60g 野椒根 30g 陈茶叶 250g 生姜 60g 为引，水煎去渣，候凉灌服。功能清热泻火。主治牛患热证，证见角热、目赤、皮毛肌肉俱热、躁扰不眠、口渴、苔黄、便秘、溺赤。

本方与梔连二石汤、和气饮三方，是《牛经备要医方》治疗牛患热证的系列方。本方治热证而兼有粪干或便秘者；便通后用梔连二石汤；热病后脾胃不和者则宜用和气饮。

梔连二石汤

出自《牛经备要医方》。黄连 15g 生石膏 60g 鲜生地 60g 木通 30g 滑石 120g 车前子 90g 白矾 30g 青皮 30g 芒硝 30g 甘草 30g 广木香 25g 青木香 30g 梔子 30g 水煎去渣，候凉灌服。功能清热泻火。主治牛热证，实热在于五脏而无便秘症状者。

原书云：“角热、目赤、皮毛肌肉俱热、躁扰不眠、口渴、苔黄、便秘、溺赤，皆属实热在于五脏，宜以大黄芩连汤涌泄之；便通者，宜梔连二石汤主之。”

和气饮

出自《牛经备要医方》。广木香 30g 陈皮 60g 麦芽 90g 木通 60g 川芎 30g 淡豆豉 90g 桔梗 30g 车前子 90g 柴胡 30g 葱头 20 枚、陈酒 300g 为引，水煎去渣，候温灌服。功能理气和胃。主治牛热病后脾胃不和，胃呆纳减。

柴胡清凉散

出自《牛医金鉴》。柴胡 黄芩 芒硝 大黄 黄连 郁金 竹叶 为末，蜂蜜为引，开水冲调，候温灌服。功能清热泻火。主治牛热伤。

本方原治牛“火热伤心胆”。根据原文文义，为上焦心肺火热之证。

消黄清凉散

出自《牛医金鉴》。柴胡 黄芩 梔子 连翘 金银花 天花粉 陈皮 郁金 知母 大黄 黄连 薄荷为末，灯心草、竹叶、绿豆、蜂蜜为引，水调灌服。功能清热解毒。主治牛热伤。

本方是柴胡清凉散的姊妹方。二者比较，柴胡清凉散用芒硝配大黄，泻火功大；本方则加金银花、连翘等，解毒力强。

柴胡龙胆汤

又名牛病十三味，出自江西《中兽医诊疗经验》第1集。柴胡 龙胆草各 30g 山豆根 枳实 木通各 25g 黄连 金银花 厚朴 大黄 车前子 白芷 钩藤 桔梗各 20g 诸药切片，盛入砂锅或大瓦罐内，加水3倍，轻轻搅拌，煎煮；沸后改用微火煎浓。每剂煎煮2次，分2次服，2次服药时间相隔6~8小时。功能和解清热，消痞开郁。主治牛温热病。

在清代光绪年间，赣南即有中兽医应用该方为基础，随症加减，治疗耕牛中暑、热咳、尿结、胃火、肝热传眼等病症。并流传有歌诀曰：柴胡龙胆汤，牛病通用方，随症加减药，逐邪保安康。

翼首草十一味

又名**帮则角结**，出自《藏兽医经验选编》。伞梗虎耳草 翼首草 角茴香 荜茇 胡黄连 青果 五灵脂 纤毛婆婆纳各一份 川黄连 紫檀香 红檀香各半份 研成细末，牛每次用3~5g，羊每次用3g，开水冲调，候温灌服。日服3次。功能清热解毒，祛风利湿，行气止痛。主治高热病。

纤毛婆婆纳为玄参科婆婆纳属植物，功能清热解毒，祛风利湿。

加减银翘解毒汤

出自《中兽医方药应用选编》。金银花 75g 连翘 75g 大青叶 100g 黄芩 80g 柴胡 80g 生石膏 100g 乳香 50g 没药 50g 淡竹叶 20g 石膏捣碎先煎，后下他药，去渣候温，冲入童便一碗，同调灌服。功能清热解毒，活血止痛。主治牛流行性感胃。

本方效法于《温病条辨》的银翘散，选用银花、连翘、大青叶以清热解毒；黄芩、石膏、竹叶、童便以清热滋阴；柴胡以解表退热；乳香、没药以活血止痛。合用而组成清热解毒与发散解表并用的轻清之剂，并有较好的止痛作用，用于牛因流感引起的四肢跛行，颇为得当。

回阳急救汤

出自《新刻注释马牛驼经大全集》。槟榔 20g 白豆蔻 20g 白术 20g 桂心 15g 附子 15g 黄芪 20g 炮姜 20g 细辛 15g 苍术 20g 陈皮 20g 半夏 20g 官桂 15g 生姜 15g 木通 15g 甘草 10g 煎汤去渣，加黄酒 250g，候温灌服。功能温中健脾，燥湿行气。主治牛中焦虚寒，冷气把脾。

本方源于《牛经大全》**灵应散**，减去高良姜；加入炮姜、细辛、陈皮、半夏、官桂、木通。

吴独散

出自《中兽医医药杂志》1985年第2期。吴茱萸 20g 良姜 50g 独活 50g 细辛 15g 桂枝 30g 柴胡 30g 麻黄 20g 升麻 50g 艾叶 20g 苏叶 20g 薄荷 20g 五加皮 30g 陈皮 50g 白酒 250ml 为引 共研为末，开水冲调，候温灌服。功能散寒解表，温中回阳。主治水牛急寒症。

水牛急寒症，发病突然，行走困难，体温正常或偏低，逆呕，口流清水或白沫，尿黄难排，粪便干燥，耳、鼻、四肢俱冷。

加味参附汤

出自《中兽医方药应用选编》。党参 150g 黄芪 100g 制附子 60g 干姜 40g 肉桂 30g 炙甘草 30g 煎汤去渣，候温灌服，每日 1 剂，连服 2~3 剂。重病例可 1 日服 2 剂。功能补气助阳，回阳救逆。主治水牛低温病。

水牛低温病，属阴阳并损，而以阳气衰微，甚则阳气虚脱为主的一种证候，近代称营养性衰竭。该方由《妇人良方》中的参附汤(人参改为党参，制附子)加味化裁而来，有壮补急救之效能。如病情危笃，可采用中西医结合疗法，如强心补液和静脉注射水牛血浆，以增强体质加速疗效。

防风通圣散

出自《抱朴集》。大黄 白芍 栀子 荆芥 黄芩 枳实 甘草各 18g 玄明粉 薄荷 滑石各 25g 酒当归 连翘 川芎 防风 桔梗各 12g 为末，水调灌服。功能解表攻里。主治牛风热壅盛，表里俱实。

本方为《宣明论方》中的**防风通圣散**减麻黄、白术、石膏，加枳实而成。二者功用相近。

麻桂汤

出自《养耕集》。麻黄 12g 桂枝 18g 陈皮 12g 玄参 18g 厚朴 15g 良姜 花粉 连翘各 12g 大黄 18g 柴胡 薄荷各 12g 为末，水煎候温服。功能解表清里。主治牛寒热两感，外寒内热。

升麻散

出自《中兽医医药杂志》1986 年第 1 期。升麻 9g 葛根 12g 赤芍 牛蒡子 木通 炙甘草各 6g 黄芩 9g 金银花 连翘各 8g 薄荷 4g 为末，每只羊 20~30g，开水冲调，候温灌服。功能清热解毒，透疹。主治绵羊痘。

据报道，用本方治疗绵羊痘 125 例，治愈率达 89%。在痘疹已全部明显后，减升麻、葛根、薄荷，加生地、玄参、生石膏。

佐料解表饮

出自《兽医验方新编》，原无方名，因方中药味均为家常饮食调料，故名。胡椒 4.5g 生姜 30g 葱白 30g 茶叶 15g 红糖 60g 煎汤去渣，候温灌服。功能辛温解表。主治羊、猪感冒。

菜子散

出自《驼经大全》。菜子 100g 当归 甘草 郁金各 60g 为末，引麻子汁 2 500g、生姜 120g、白面 250g、绿豆粉 60g、清油 250g，分 3 次水调，草后灌服。功能和血解郁，扶壮。主治骆驼春季七伤。

本方以及槐花散、菊花散、款冬花散四方均为治驼七伤的调理方，分别用于春、夏、秋、冬四季。原书中说：“驼患五劳并七伤，因为负重又频喧。……四季灌啖按各方。”方中的菜子即油菜子，或称芸苔子。

槐花散

出自《驼经大全》。盐豉 地黄 大黄各 120g 槐花 60g 为末,加白蜜 500g、白面 500g、麻子汁 2 500g,分 3~5 次,调和,草后灌服。功能清热凉血,扶壮。主治骆驼夏季七伤。

菊花散

出自《驼经大全》。菊花 120g 大黄 贝母各 30g 黄柏 梔子各 60g 茶叶 250g 为末,加面 500g、麻子汁 500g、薊汁 1 500g、油 500g,分 3 次,草后调灌。功能清凉润肺,扶壮。主治骆驼秋季七伤。

款冬花散

出自《驼经大全》。款冬花 120g 糯米 1 000g 干姜 30g 茯苓 60g 甘草 黄药子各 90g 为末,加猪油 500g、水 1 000g、牛油 500g、清泔水 1 000g,分 3 次,调和,草后灌服。功能润肺止咳,温中健脾,扶壮。主治骆驼冬季七伤。

2 医心病方

硝石大黄饮

出自《牛经备要医方》。生石膏 60g 芒硝 60g 皂角 30g 青皮 25g 甘草 30g 柴胡 25g 大黄 60g 木通 60g 木香 25g 当归 30g 车前子 90g 滑石 120g 白芷 25g 玄参 60g 银花 60g 连翘 90g 夏枯草 30g 淡竹叶 30 片 水煎去渣,候凉灌服。功能清热泻火,解毒消肿。主治牛舌黄,其症舌下廉泉穴色如黄蜡,形似扑蛾,甚则项下肿大,舌不能转动。

牙硝散

出自《牛经大全》。马牙硝 甘草 黄芩 黄连 郁金 大黄 朴硝 为末,水调灌服。功能清热泻火,主治牛木舌病。

冰硼散

出自《新刻注释马牛驼经大全集》。硼砂 冰片 青黛 井泉石 山豆根 青盐 牙硝 各等份 为细末,吹入口内。功能清热解毒,消肿止痛。主治驼口舌生疮。

黄连洗心散

出自《新刻注释马牛驼经大全集》。黄连 20g 黄柏 30g 大黄 60g 郁金 30g 玄明粉 90g 梔子 30g 连翘 30g 葛根 20g 花粉 30g 桔梗 20g 玄参 25g 知母 25g 为末,开水冲调,候温灌服。功能清心泻火,滋阴凉血。主治驼口舌生疮。

清暑散

出自《中华人民共和国兽药典(2000 年版)》。香薷 30g 白扁豆 30g 麦冬 25g 薄荷 15g 木通 15g 皂角 15g 藿香 30g 茵陈 25g 菊花 30g 石菖蒲 25g 金银花 30g 茯苓 25g 甘草 15g 为末,开水冲调,候温灌服。马、牛 250~350g; 羊、猪 50~80g; 兔、禽 1~3g。功能清热祛暑。主治牛中暑。

本方即《抱犊集》中的消暑散去人参叶。

蛋清白矾饮

出自《中兽医方药应用选编》。鸡蛋清 10 个 白矾 60g 鸡蛋去黄取清，白矾研末或加水溶化，调和灌服。功能清热解毒，消痰利咽。主治牛轻度中暑。

蚯蚓白糖饮

出自《中兽医方药应用选编》。鲜蚯蚓 250g 白糖 250g 将蚯蚓洗净放入盆内，加入白糖，蚯蚓即化为水。灌服。功能清热利水，生津止渴。主治牛轻症中暑。

热性病的特点是阳常有余而阴常不足。本方重用蚯蚓(亦名地龙)清热利水，以平其亢进，泻其有余，并能缓解其狂躁、抽搐、喘息等症状；辅以白糖，生津止渴，以补其不足。药味虽简，立意颇当。

行军散

出自《霍乱论》，见于《牛经备要医方》。牛黄 麝香 珍珠 冰片 硼砂各 3g 雄黄 25g 火硝 1g 金箔 1g 为末，冲服。功能清心解暑，通关开窍。主治牛中暑。

本方多预先制成成药。故《牛经备要医方》中只记载用它治牛“暑热痧胀”(即中暑)，未列出药味组成。

二石香薷饮

出自《羊病及防治》，原无方名。生石膏 15g 滑石 12g 香薷 藿香 佩兰 青蒿 知母 杏仁 陈皮各 9g 煎汤去渣，候温灌服。功能清热，利湿，祛暑。主治羊中暑。

清热三黄汤

出自《骆驼病诊疗经验》。黄芩 60g 黄连 30g 黄柏 30g 桔梗 30g 白芷 30g 茯苓 30g 栀子 45g 麦门冬 30g 香薷 30g 当归 30g 生地 30g 党参 25g 防风 25g 大黄 60g 为末，开水冲调，候温灌服。功能清热解毒，凉血熄风。主治骆驼热晕风。

凉肝熄风汤

出自《中兽医方药应用选编》。山羊角 50g(锉碎) 钩藤 30g 先煎山羊角，后下钩藤，候温去渣灌服。或山羊角磨汁，钩藤煎汤去渣，混合灌服。功能凉肝熄风。主治犊牛惊风。

该方由羚羊钩藤汤(《通俗伤寒论》)化裁而来。加大了药味剂量。

朱砂镇痫散

出自《中兽医医药杂志》1990 年第 5 期，原无方名。菖蒲 钩藤各 30g 天麻 全蝎 陈皮 胆南星 半夏各 15g 远志 18g 朱砂 9g(另研) 茯苓 甘草 贝母各 20g 为末，先冲灌朱砂，其他药开水冲调，候温灌服。牛每日 1 剂。功能开窍熄风，祛痰降逆，镇痫宁神。主治牛癫痫。

乙脑清

出自《中兽医医药杂志》1991 年第 2 期，原名乙脑轻。板蓝根 大青叶 栀子 甘草 石膏各 5g 黄连 1.5g 玄参 防风 白芷 远志 五味子 苍术 菊花 桔梗 当归 白芍

天竹黄各 3g 钩藤 茯神 瞿麦 木通各 2g 为末，开水调成糊状，候温灌服。功能清热解毒，熄风安神。主治羊乙型脑炎。

3 医肺病方

甘桔散

出自《抱朴集》。甘草 桔梗 玄参 生地 淡竹叶 车前子 射干 山豆根 牛蒡子 薄荷 荆芥穗 黄芩 麦冬 槟榔 枳壳 地骨皮 雪里青 万年青 为末。水调灌服。功能清热解毒，润肺利咽。主治牛咽喉肿痛。

原方载“治牛喉风”。并说：“有痰涎者，加贝母、白矾；热盛者，加大黄、芒硝、玄明粉；如有气喘者，加桑白皮、马兜铃、白芦根。”除内服药外。原方还配合有吹喉药（青黛、硼砂、白矾、冰片、熊胆或青鱼胆）及外敷药（黄丹、大蓟、紫花地丁、蒲公英，蜂蜜调敷）。

吹口消黄散

出自《活兽慈舟》。龙骨 20g 煅石膏 15g 薄荷 20g 甘草 20g 硼砂 20g 寒水石 15g 青黛 25g 枯矾 20g 明雄 15g 山豆根 20g 朱砂 10g 麝香 1g 蟾酥 1g 为细末，每用少许，吹入喉间。主治牛锁喉黄症。

银连煎

出自《羊病及防治》，原无方名。金银花 黄连 栀子 连翘 射干 山豆根 胖大海 各 4g 煎汤去渣，候温灌服。功能清热解毒，消肿利咽。主治羊咽炎。

黄药子散

出自《驼经大全》。甘草 大黄 黄药子 黄柏 黄芩各 60g 为末，引糯米汤、白矾、蜂蜜，同调，草后灌服。功能清热解毒。主治骆驼肺毒槽结。

十神祛邪散

出自《骆驼病诊疗经验》。射干 川芎 香附 陈皮 黄芩各 45g 葛根 升麻 山豆根 玄参 赤芍 白芷 甘草各 30g 麻黄 21g 为末，引葱，开水冲调，候温灌服。功能行气活血，清热解毒，消肿利咽。主治骆驼咽喉肿痛，丁喉。

丁喉是骆驼的一种急性恶性喉头肿胀。

杏仁款冬饮

出自《牛经备要医方》。枇杷叶 30g 杏仁 15g 橘红 30g 款冬花 30g 麦冬 30g 五味子 15g 茯苓 30g 青皮 30g 青木香 60g 紫苑 30g 炙甘草 30g 当归 30g 桑白皮 30g 水煎去渣，候温灌服。功能润肺利气。主治牛咳嗽。

杏仁贝母汤

出自《抱朴集》。杏仁 贝母 桑白皮 葶苈子 薄荷 苏叶 牙皂 冬花 羌活 桂枝 麦冬 甘草 苍术 枇杷叶 蜂蜜为引，煎汤灌服。功能宣肺化痰，止咳平喘。主治牛

咳嗽。

杏贝散

出自贵州省遵义县验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。杏仁 25g 大贝 15g 紫苏 防风 桔梗 荆芥各 30g 独活 甘草各 18g 生姜 60g 为末，温水调服。功能清热散寒，润肺祛痰，止咳平喘。主治牛风寒咳嗽。

银翘桔梗散

出自《全国中兽医经验选编》，原无方名。金银花 60g 连翘 60g 牛蒡子 30g 淡竹叶 30g 荆芥 30g 桔梗 30g 芦根 30g 甘草 15g 为末，水煎，候温灌服。功能疏风清热，宣肺止咳。主治牛风热咳嗽。

冬青七味

出自《兽医简便良方》，原名**达来一道老**，为蒙兽医方。冬青 150g 煅石膏 沉香各 2g 桔梗 木香 草河车 葡萄干各 45g 为末，开水冲调，候温灌服。功能清热解毒，降气润肺。主治牛咳嗽，支气管炎。

草河车为蚤休之别名(《植物名实图考》)。此药是百合科植物七叶一枝花、金线重楼及其数种同属植物的根茎。功能清热解毒，平喘止咳，息风定惊。主治痈肿、疔疮、瘰癧、喉痹、慢性气管炎等。

泻肺散

出自《大武经》，原无方名。葶苈子 60g 百部 30g 桑白皮 25g 桔梗 25g 车前子 30g 枳壳 25g 厚朴 15g 瓜蒌仁 60g 甘草 15g 黄柏 30g 黄连 25g 为末，引枇杷叶，开水冲调，候凉灌服。功能清热泻肺，止咳平喘。主治牛肺热咳喘。

贝母郁金汤

出自《抱犊集》。贝母 郁金 甜葶苈 槟榔 葛根 甘草 乌药 桔梗 白术 川芎 黄芩 金银花 土茯苓 车前子 乌梅 煎汤灌服。功能清热解毒，止咳平喘。主治牛肺热咳喘。

橘红半夏散

出自《骆驼病诊疗经验》。橘红 60g 半夏 30g 枯矾 30g 防风 30g 茯苓 30g 升麻 24g 苍术 30g 藿香 30g 厚朴 30g 紫苏 24g 柴胡 30g 砂仁 15g 桂枝 30g 麻黄 15g 葛根 30g 炙甘草 30g 生姜 30g 为末，开水冲调，候温加大葱 120g(捣烂)灌服。功能温中理肺，解表化痰。主治骆驼寒伤肺脏。证见逐渐消瘦，热时纳闷，寒冷时四肢身体发抖，倒嚼口流涎沫，喜热恶凉且咳嗽。

消黄散

出自《驼经大全》。黄药子 黄连 黄柏 大黄 郁金 甘草各 60g 为末，浆水、油调和，草后灌服。功能清热消黄。主治骆驼肺热咳喘。

百合清肺散

出自《骆驼病诊疗经验》。百合 60g 板蓝根 45g 桔梗 30g 知母 30g 贝母 30g 苏子 30g 豆根 30g 黄芩 30g 栀子 30g 天花粉 45g 桑白皮 30g 紫菀 30g 天门冬 30g 麦门冬 30g 石膏 60g 甘草 30g 为末，开水冲调，候温灌服。功能清肺凉膈，利痰定喘。主治骆驼肺热气粗。

止咳九味

出自《藏兽医经验选编》，原无方名。纤毛婆婆纳 1 750g 囊距翠雀 1 000g 乌双龙胆 船形乌头 螃蟹甲各 750g 伞梗虎耳草 5 000g 唐古特青兰 贝母 草决明各 250g 为末，开水冲调，候温灌服。牛每次服 180~270g，羊 30~60g。功能清热解毒，化痰止咳。主治动物肺热咳嗽。

乌双龙胆为龙胆科龙胆属植物，功能清热解毒。船形乌头毛茛科乌头属植物，功能清利湿热。螃蟹甲为唇形科糙苏属植物，功能清热，镇咳化痰。唐古特青兰为唇形科植物，功能发散风热，清热凉血。

黄芪百合汤

出自《中兽医方药应用选编》。炙黄芪 60g 百合 60g 五味子 15g 党参 45g 焦白术 30g 炙甘草 20g 淮山药 30g 麦冬 30g 北沙参 30g 杏仁 30g 桔梗 30g 陈皮 30g 瓜蒌子 30g 蜂蜜 100ml 煎汤去渣，入蜂蜜，候温灌服。功能润肺健脾，养阴止咳。主治耕牛劳伤肺气。

牛劳伤肺气是一种肺脾两虚、气阴俱损之证，多发生于大忙季节之后。《牛经》称本病为“拖犁力弱痿病”。治宜益肺气、补脾气，培土而生金。配以宣降肺气，润肺止咳，润肠通便。

补肺散

出自《新刻注释马牛驼经大全集》。百合 30g 白及 30g 白蔹 20g 川贝母 30g 陈皮 20g 紫菀 25g 知母 25g 紫参 20g 茯苓 20g 五味子 20g 阿胶 20g 桔梗 20g 甘草 20g 为末，开水冲调，候温加蜂蜜 100g、芝麻油 100g 灌服。功能滋阴润肺，祛痰定喘，排脓止血。主治驼肺损，气喘，鼻流脓血。

四花止血

出自《骆驼病诊疗经验》。菊花 60g 旋覆花 30g 槐花炭 45g 红花 20g 皮胶 60g 百草霜 60g 刘寄奴 30g，为末，用生石膏 120g 加水煎汤去渣取汁冲药，候凉灌服。功能清热泻火，凉血止血。主治骆驼鼻沥血。

地黄饮子

出自《骆驼病诊疗经验》。生地 60g 白芍 30g 柴胡 30g 菊花 30g 葛根 30g 黄柏 45g 栀子 45g 黄连 20g 连翘 30g 桔梗 30g 玄参 30g 藕节 45g 地榆 30g 蒲黄 30g 大蓟 150g 为末，开水冲调，候温灌服。功能凉血止血。主治骆驼鼻沥血。

4 医脾胃病方

暖胃温脾散

出自《中兽医治疗学》。砂仁 益智 白豆蔻各 12g 炒白术 15g 陈皮 厚朴 腹毛当归 山药 炮姜各 15g 法夏 公丁香 10g 甘草 3g 食盐 60g 为末。加大枣 10 枚，煎汤，候温灌服。功能健脾暖胃，降逆止吐。主治牛翻胃吐草。

草果安胃汤

出自《中兽医医药杂志》1986 年第 1 期。河北省邱县验方。草果 45g 干姜 30g 半夏 30g 陈皮 45g 丁香 30g 茯苓 45g 木通 30g 开水冲调，候温灌服。功能行气温中，降逆止呕。主治牛翻胃吐草。

加减：腹胀难消者，加神曲 60g、三棱 30g、砂仁 45g；胃气上逆者，加代赭石 60g、旋覆花 30g、瓜蒌仁 45g；病久上盛下虚、鼻浮面肿、四肢疼痛、把前把后者，加附子 30g、小茴香 45g、五味子 45g、龙骨 60g、生牡蛎 60g。

代赭茵陈汤

出自《中兽医医药杂志》1984 年第 1 期。代赭石 茵陈各 30g 党参 15g 旋覆花 麦冬 郁金各 12g 制半夏 生姜 柿蒂各 10g 丁香 6g 甘草 5g 煎汤去渣，候温 1 日分 2 次服。功能降逆止呕。主治羊吐草。

吐草严重者，倍半夏、生姜，加竹茹、橘皮、枇杷叶；体弱不跟群者，倍党参，加白术、吴萸、官桂、茴香。

利胆和胃止吐汤

出自《甘肃畜牧兽医》1983 年第 3 期。旋覆花 12g 党参 15g 制半夏 10g 生姜 10g 代赭石 30g 丁香 6g 柿蒂 10g 麦冬 12g 郁金 12g 茵陈 30g 甘草 5g 加水 1000ml，煎至 250ml，煎两次，药液合并分早晚各灌 1 次，日服 1 剂。功能清肝利胆，和胃健脾，降逆止呕。主治羊吐草。

七宝散

出自《牛医金鉴》。当归 槟榔 香附 厚朴 白芷 官桂 白豆蔻 为末，引煨姜，开水冲调，候温灌服。功能行气活血，温中止痛。主治牛脾胃寒，冷痛。

原名**七实散**。实字恐系宝字之误。

拈痛散

出自《牛医金鉴》。当归 砂仁 陈皮 官桂 甘草 槟榔 没药 厚朴 香附子 白豆蔻 杭白芍 为末，生姜、童便为引。功能理气活血，温中止痛。主治牛脾胃寒痛。

暖胃健脾散

出自《牛医金鉴》。白术 白扁豆 茯苓 神曲 桂心 莲子肉 煨姜 大枣 腊炒米 为末，开水冲调，候温灌服。功能健脾温中。主治牛脾胃虚寒。

本方也可用作水草肚胀等症恢复期的脾胃调理剂。

灵应散

出自《牛经大全》。槟榔 豆蔻 白术 黄芪 桂心 附子 高良姜 苍术 甘草为末，水调灌。功能温中健脾。主治牛脾胃虚寒。

三合汤

出自《中兽医方药应用选编》。葱白连根 250g 生姜 60~250g 白酒 120~250g 姜、葱煎汤去渣，冲入白酒，候温灌服。功能散寒温里，通阳活血。主治牛、马冷痛。

除湿汤

出自《太医院增补医方捷径》，见于《中兽医医药杂志》1991年第2期。藿香 36g 苍术 30g 陈皮 25g 厚朴 40g 白术 65g 茯苓 75g 半夏 25g 甘草 18g 生姜、大枣为引，煎汤去渣，候温灌服。每日1剂，5天为1个疗程。功能除湿健脾。主治牛前胃弛缓。

加减法：属脾胃虚弱者，去苍术、厚朴，加党参、黄芪、丹参、炒山药、生姜，大枣为引；属寒湿困脾以寒为主者，加砂仁、肉桂、良姜、干姜；属寒湿困脾以湿为主者，加焦三仙、薏苡仁、炒二丑；属湿热中阻湿重于热者，重用藿香、茯苓、白术，再加草果，并佐以黄芩；热重于湿者，去苍术、陈皮、厚朴，加知母、黄连、栀子、龙胆草、麦冬、玄参。据报道，用本方治疗耕牛原发性前胃弛缓 1127 例，痊愈 1109 例。

蟾酥散

出自《中兽医学杂志》1984年第3期。蟾酥 10g 香附 480g 大黄 120g 将香附、大黄研末过筛，蟾酥水煮3次，每次30分钟，取滤液并浓缩，将浓缩液混于药粉中拌匀，70℃烘干，研末过筛，分装于指形瓶内，每支装量6g，含蟾酥0.1g。牛1次4~6支，加30~40ml酒精，再加水灌服。功能健胃理气。主治牛前胃病(前胃弛缓、瘤胃臌胀、瘤胃积食)。

蟾酥酊

出自《中兽医学杂志》1984年第3期。蟾酥 水煮3次，每次30分钟，纱布过滤取滤液，浓缩至糖浆状，浓缩液加90%乙醇至总液量含乙醇30%，含醇液静置24小时，过滤，加水足量配成1%蟾酥酊(即1g蟾酥得含醇量为30%的药酊100ml)。功能解毒散肿，通窍回苏；兴奋胃肠平滑肌，促进子宫收缩。主治牛前胃病(前胃弛缓、瘤胃膨胀、瘤胃积食)，奶牛子宫内膜炎。治疗牛前胃病，1%蟾酥酊40~60ml，加水灌服，1日1次，必要时1日2次；治疗子宫病，临用前加蒸馏水稀释成0.1%浓度(取1%蟾酥酊，30ml加蒸馏水至300ml)300ml一次子宫灌注，隔天1次，共2~3次。

据江苏省畜牧水产学校报道，用蟾酥酊治疗牛前胃弛缓，瘤胃膨胀，瘤胃积食等59例，治愈率在89%以上。

和胃消食汤

出自《牛经备要医方》。刘寄奴 30g 厚朴 15g 木通 18g 建曲 18g 枳壳 30g 木香 15g 槟榔 30g 茯苓 30g 青皮 18g 山楂 30g 甘草 12g 水煎去渣，候温灌服。功能行

气消食。主治牛吃食太过食积，恶食而倦怠，粪或溏或泄，肚腹膨胀。

原方中甘草用量四两(约 120g)，似嫌多，可能为四钱之误，故用米制注明的药量为 4g。

行气散

出自《牛经大全》。狼毒 滑石 牵牛 大戟 黄芩 黄芪 大黄 为末，猪脂、朴硝为引，开水冲调，候温灌服。功能行气、清热、润肠。主治牛宿草不转。

《新刻注释马牛驼经大全集》引载时，减去狼毒，加了木通、厚朴、草果，功效更佳。

党参藜芦散

原无方名。见于《中国兽医杂志》1991 年第 9 期和《家畜常见病中兽医诊疗》，又名**促胃煎**。党参 50g 藜芦 25g 为末，开水冲调，候温灌服。功能扶正行气。主治牛前胃弛缓，宿草不转。

党参补益脾气，藜芦催吐，并促进胃腑运动。古代有诸参反藜芦的说法，即这两味药属反药，这里用其反以达到促进反刍的相反相成的目的，临床实践证明用之无碍。

本方适用于原发性前胃弛缓。剂量不宜过大，否则会造成呕吐和腹胀。

胃粉

(Stomach Powder) 出自。The Veterinary Formulary——Handbook of Medicines Used in Veterinary Practice(英国皇家药物学会《兽医实用药物手册——兽医处方集》)。每 1g 含碳酸铵 146mg 马钱子 67.5mg 姜 17mg 加吐素 67.5mg 碳酸钠 702mg 牛 38g，每日 3 次，连用 3~4 天。功能理气，抗酸。主治前胃弛缓，瘤胃酸中毒。

原著将本方归类为抗酸复方制剂。

草果散

出自《中兽医诊疗经验》。甘草 15g 神曲 60g 麦芽 60g 焦山楂 60g 厚朴 30g 槟榔 30g 枳实 30g 陈皮 24g 川军 60g 芒硝 150g 砂仁 30g 草果仁 30g 为末，开水冲调，候温灌服。功能消食导滞。主治牛食滞症。

椿皮散

出自《全国中兽医经验选编》。椿皮 75g 常山 25g 柴胡 25g 莱菔子 75g 枳实 30g 甘草 15g 为末，开水冲调，候温灌服；或水煎服。功能下气消食。主治牛瘤胃积食，前胃弛缓。

润肠通幽汤

出自《西南民族学院学报》1982 年第 1 期。当归 100~120g 桃仁 30g 红花 25g 大黄 100~120g 丹参 60g 白及 60g 麻仁 60g 生地 45g 枳壳 90g 香附 45g 玉片 60g 熟地 45g 莱菔子 120g 陈皮 30g 柴胡 30g 甘草 10g 元参 120g 石蜡油 500~1000ml 除石蜡油外，煎汤去渣，候温，加石蜡油灌服。功能调胃和中，活血理气，润肠生津，消积破满。主治牛皱胃阻塞。

据报道，本方治疗皱胃阻塞患牛 20 例，治愈 10 例，5 例有效。

大戟散

出自《牛经大全》。大戟 滑石 甘遂 牵牛 黄芪 巴豆 大黄 朴硝 为末，猪脂为引，水调灌。功能峻逐通肠。主治牛水草肚胀。

《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)中的大戟散即源于本方，但无巴豆。其处方如下：京大戟 30g 滑石 90g 甘遂 30g 牵牛子 60g 黄芪 45g 玄明粉 200g 大黄 60g。牛 150~300g，加猪油 250g。功能逐水，泻下。主治牛水草肚胀，宿草不转。据刘新淮报道，用本方治疗水黄牛瘤胃积食 45 例，治愈 38 例，好转 4 例。

平胃散

出自《牛医金鉴》。苍术 白豆蔻 厚朴 陈皮 橘红 肉桂 为末，开水冲调，候温灌服。功能燥湿运脾，行气温中。主治牛冷虚腹胀。

必效散

出自《牛医金鉴》。槟榔 山楂 乌药 枳实 半夏 牵牛子 青皮 大黄 麦芽为末，引生姜，水调灌服。功能行气消食。主治牛肚胀。

腹胀有虚实之分，治法不同。据原书载，暖胃健脾散用于治虚胀，而本方用于治实胀。书中说：“腹胀日夜全不消，……虚用健脾平胃散，如实定然用必效。”

和胃散

出自《大武经》，原无方名。青皮 陈皮各 30g 苍术 45g 贯众 30g 木香 25g 天南星 25g 半夏 30g 茵陈 25g 吴茱萸 25g 甘草 15g 高良姜 25g 为末，引石灰水，调灌。功能行气和胃。主治牛肚胀。

攻胃散

出自《居家必用事类全集》。白芷 小茴香 桔梗 细辛 芍药 橘皮 官桂各 30g 为末，引生姜，盐水煎，候温灌服。功能温中散寒，行气消胀。主治牛气胀。

原书歌曰：“水牛气胀细消详，冷热相冲二气伤，虚气胀来经数日，致令伤重损脾间。先和二气并脾胃，苍术厚朴并生姜，官桂胡椒能破气，脾俞针烙最为良。”歌中的药味与方中不一致，可以互参。

消胀散

吉林省通榆县验方，见于《中兽医方剂大全》。天仙子 9g 芒硝 60g 大黄 30g 三棱 莪术各 15g 牵牛子 30g 巴豆霜 1g 大戟 12g 甘遂 9g 木香 18g 为末，开水冲调，候温灌服。功能泻下通肠，行气消胀。主治牛肚胀。

三香散

出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。丁香 25g 木香 45g 藿香 45g 青皮 30g 陈皮 45g 槟榔 15g 炒牵牛子 45g 为末，开水冲调，候温灌服。牛、马 200~250g，羊、猪 30~60g。功能破气消胀，宽肠通便。主治胃肠臌气。

本方主要适用于马原发性肠臌气。若属继发者，则本方不宜。牛羊瘤胃臌气亦可酌情加

减应用。在《中兽医诊疗经验》第五集中治牛气胀方(木香 30g 陈皮 30g 枳壳 30g 茴香 60g 槟榔 30g 炒萝卜子 120g)，与本方相近。

豆油大蒜合剂

出自《辽宁畜牧兽医》1981 年第 2 期。紫皮蒜 60g(捣碎) 豆油 400g 混合灌服。功能行气消胀。主治牛瘤胃胀气。

烟油消胀汤

出自《中兽医方药应用选编》。食油 250g 烟丝(或烟叶)100g 食油煎沸，入烟丝或烟叶炸黑，去烟叶，加适量温水调灌。功能理气消胀，止酵除满。主治牛急性气胀。

盐水饮

出自《中兽医方药应用选编》。食盐 300~400g 温水 6 000~8 000ml 混合配成 5% 溶液，一次灌服(食盐按每公斤体重 0.6~0.8g 计算)。服药后要经常牵遛，配合腹部按摩，并任其饮水。功能软坚散结，攻下通便。主治牛便秘。

盐水疗法是中国人民解放军沈阳军区某部介绍治疗马结症的验方，曾用此方治疗结症病马 900 余例，治愈率达 99.7%，无一继发肠炎。现用以治疗牛便秘，疗效亦佳。是一个值得重视的验方。但食盐过量使用，经组织吸收快，可引起中毒，猪尤为敏感，故临症应用时需严格控制用量。

双马曲(Biomodrech)

出自 The Veterinary Formulary——Handbook of Medicines Used in Veterinary Practice(英国皇家药物学会《兽医实用药物手册——兽医处方集》)。每 1g 含无水硫酸钠 434mg 茴香 15mg 樟脑 8mg 干硫酸镁 434mg 姜 73mg 硝酸钾 35mg 牛最多 300g；羊、猪 50g。功能通肠泻下。主治便秘。

原著将本方归类为渗透性泻药(osmotic laxatives)。

通便润肠汤

出自《活兽慈舟》，原无方名。二丑 60g 大黄 90g 芒硝 150g 桃仁 45g 滑石 45g 火麻仁 90g 当归 60g 莱菔子 60g 地榆 30g 木通 20g 地龙 30g 枳壳 45g 槟榔 20g 煎汤去渣，候温灌服。功能通里攻下，行气润肠。主治牛便秘症。

大承气润肠穿肠散

出自《新刻注释马牛驼经大全集》。大黄 90g 芒硝 150g 火麻仁 60g 生地 45g 厚朴 30g 枳实 30g 木通 20g 槟榔 25g 为末，开水冲调。候温加猪油 200g 灌服。功能理气宽肠，攻下粪结。主治牛大便秘结。

本方即《伤寒论》大承气汤加火麻仁、生地、木通、槟榔。

加味通幽汤

出自《兽医验方新编》。当归 生地 升麻 熟地 桃仁 槟榔 大黄 麻仁 炙甘草 各 40g 红花 20g 芒硝 500g 石蜡油 500~1 000ml 前 10 味煎汤去渣，化入芒硝，候温与

石蜡油一起灌服。功能活血养阴，润肠泻下。主治牛皱胃阻塞。

本方是由《脾胃论》中的通幽汤(《兰秘藏》也收载，但多一味槟榔；功能活血养阴，润肠通便；主治瘀阻阴虚之噎膈，大便难)加槟榔、大黄、麻仁、芒硝、石蜡油而成，其润肠泻下功能增强。

油当归

出自《中国兽医科技》1985年第6期。当归450g 为末，食用油(或液体石蜡)1 000g 将油煎沸，离火后加入当归拌匀，候温灌服。功能润胃泻下。主治牛真胃阻塞，粪干便秘。据报道，用本方治疗牛真胃阻塞517例，治愈510例。一般服药后24小时左右开始排粪，36小时左右出现食欲，48~72小时出现反刍。

猪膏散

出自《牛经大全》。滑石 牵牛 甘草 大黄 官桂 甘遂 大戟 续随子 白芷 地榆皮为末，猪油250g、蜂蜜60g为引，同调灌之。功能峻逐滑泻，润肠通便。主治牛百叶干。

方中甘遂、大戟和甘草属于中药配伍禁忌中的“十八反”。类似这种应用反药的方剂，古今并不罕见。如《金匱要略》甘遂半夏汤(甘遂、半夏、芍药、甘草)就是一例。对此，尤怡在《金匱要略心典》中解释道：“甘草与甘遂相反而同用之者，盖欲其一战而留饮尽去，因相激而相成也。”

藜芦润肠汤

出自《全国中兽医经验选编》。藜芦 常山 牵牛子各60g 当归90g 川芎60g 滑石90g 麻油1 000g 蜂蜜250g 煎6味(滑石另包)水煎，去渣后入麻油及蜂蜜，候温灌服。据报道，用本方配合输液，治疗牛百叶干45例，治愈36例。

厚朴苓术饮

出自《牛经备要医方》。厚朴15g 广木香12g 泽泻30g 扁豆60g 车前子60g 胡椒末30g 赤茯苓30g 苍术25g 水煎去渣，候温灌服。功能行气利水，温中燥脾。主治牛冬季水泻。

伏龙椿皮秫米汤

出自《中兽医方药应用选编》。伏龙肝500g 椿根白皮120g 秫米(炒)500g 灶心土、椿根白皮同煎数沸去渣，炒高粱研末冲入，候温灌服。功能温中涩肠止泻。主治牛冷泻。

通肠芍药汤

出自《牛经备要医方》；《中华人民共和国兽药典》(2000年版)中的通肠芍药散即源于本方。大黄30g 槟榔25g 山楂30g 枳实18g 赤芍30g 木香18g 黄芩25g 黄连9g 玄明粉18g 水煎去渣，候温灌服。牛300~350g。功能清热活血，化滞止痢。主治牛痢疾。

本方与《保命集》中的芍药汤相似。但本方更重于行气通导，因为牛的胃肠更容易发生胀滞。

涤肠饮

出自《中兽医医药杂志》1985年第3期。十大功劳 150g 生大蒜泥 150g 千里光 100g 生姜 30g 冬青叶 50g 仙鹤草 50g 侧柏叶 50g 旱莲草 50g 煎汤去渣，候温灌服。功能清热解毒，止泻。主治牛、马细菌性、寄生虫性、霉菌性胃肠炎。

据经验，方中生大蒜泥不可缺。本方对急性热性病例疗效甚佳，对饮食性腹泻和晚期病例疗效较差。

二黄二白散

出自《藏兽医经验选编》。黄连 3g 黄柏 60g 白头翁 90g 白术 60g 秦皮 60g 车前草 60 瞿麦 60g 篇蓄 90g 茯苓 60g 陈皮 45g 唐古特马尿泡 12g 为末，灌服，口服 2 次，连服 3~5 天。牛每次 50~100g；犊 15g；羊 15~27g。功能清热解毒，燥湿止泻。主治牛、羊热痢。

翻白地榆散

云南省澄县验方，原无方名，见于《中兽医方剂大全》。翻白叶 60g 紫地榆 30g 云木香 15g 马蹄香 30g 樟木皮 30g 为末，开水冲调，候温灌服，每日 1 剂，连服 2~3 剂，功能清热解毒，燥湿止泻，开胃消食。主治牛、马腹泻，消化不良。

止泻散

出自《藏兽医经验选编》。三颗针 500g 大黄 90g 船形乌头 120g 纤毛婆婆纳 150g 车前草 150g 水柏枝 180g 花椒 60g 角茴香 120g 头花蓼 60g 侧花徐长卿 150g 为末，开水冲调，候温灌服，或煎汤服，每日 1~2 次。牛 150~250g；羊 30~50g。功能清热解毒，利水涩肠。主治牛、羊拉稀，消化不良，肠炎。

水柏枝为桤木科，功能清热解毒。

虎杖散

贵州省验方，原无方名，见于《中兽医方剂大全》。虎杖 120g 白头翁 60g 朝天罐 60g 仙鹤草 90g 煎汤去渣，候温灌服。功能清热解毒，除湿止泻。主治牛胃肠炎。

朝天罐为野牡丹科植物朝天葫芦。

参苓平胃散

出自《全国中兽医经验选编》，原方名**加味平胃散**。苍术 陈皮 厚朴各 120g 党参 90g 茯苓 90g 山药 180g 猪苓 90g 泽泻 90g 木香 60g 砂仁 90g 木通 90g 甘草 30g 车前子 90g 为末，开水冲调，候温分 3 次灌服，每日 1 次。功能补气健脾，利水止泻。主治牛脾虚泄泻。

粟米黄蜡汤

出自《中兽医诊疗经验》第 4 集。黄粟米 700g 黄蜡 60g 粟米熬成稀粥，入黄蜡溶化，候冷灌服。功能健脾止泻。主治牛伤力久泻。

茶姜汤

出自《兽医验方新编》。陈茶叶 200g 生姜 100g 炒食盐 20g 煎汤去渣，候温灌服。

功能散寒止泻。主治牛虚寒泄泻，顽固性拉稀。

二子玉米散

出自《中兽医方药应用选编》。补骨脂 50g 菟丝子 30g 炒玉米粉 250g 前二味为末，加炒玉米粉，开水冲调，候温灌服。日服 2 次，连服 7 天。功能温肾助阳，收涩止泻。主治牛肾虚泄泻。

四物槐花饮

出自《牛经切要》，原无方名。当归 白芍 川芎 生地 黄连 黄柏 黄芩 槐花 栀子煎汤去渣，候温灌服。功能活血化瘀，清热止血。主治牛大便下血。

三炭散

出自《中兽医经验集锦》。大黄 50g 黄芩 50g 山楂 50g 车前子 50g 除车前子炒炸外，余三味药分别用武火炒炭存性，共为末，温开水冲服。每日 2 次。功能清热利湿。主治牛便血。

随症加减：热重颤抖者，加柴胡、胆草；瘤胃臌气者，加枳壳、陈皮；里急后重、欲泻不泻者，加枳壳、防风；食欲不振者，加党参、白术、炒二丑。一般首剂量用三炭散 200g。脱水病牛，应结合输液、强心等对症治疗。

四根汤

出自《五十年疗畜积方》，原无方名。葛根 地骨皮 椿根白皮 葵花根各 30g 煎汤去渣，候温灌服。功能清热凉血，止血。主治牛便血。

伏龙止红散

出自《中兽医治疗学》。伏龙肝 500~1 000g 生地 丹皮 焦地榆各 30g 黄芩 24g 炒白术 45g 黑附片 9g 甘草 15g 伏龙肝煎汤；其余为末，用伏龙肝汤冲调，候温灌服。功能温阳健脾，化瘀止血。主治牛便血。

地榆槐花汤

出自《兽医中草药剂的制备与剂型改革》。地榆 槐花 乌梅 诃子 猪苓 泽泻 苍术 银花 连翘各 35g 甘草 20g 水煎二次，去渣，合并一次灌服。功能清热解毒，止泻止血。主治牛血痢，便血。

原方加减法：腹泻严重者，加车前子、茯苓；粪干带血者，去猪苓、泽泻，加火麻仁、厚朴、枳壳；泻血水严重者，加蒲黄、棕榈、侧柏叶；体质虚弱者，加当归、黄芪、党参。

三黄散

出自《抱犊集》。黄连 白术 槐花 川朴 诃子 黄芩 枳壳 青皮 黄柏 川芎 当归尾 地榆 桑白皮 为末，葵花根煎水冲调，候温灌服。功能清热解毒，调血行气，涩肠止泻。主治牛便血，痢疾。

针贯煎

出自《黑龙江畜牧兽医》1989 年第 7 期，原无方名。三棵针 100g 贯众 60g 煎汤去

渣，候温灌服。功能清热燥湿，杀虫。主治牛球虫病，便血。

槐花红糖散

出自《中兽医方药应用选编》。槐花炭 60~120g(研末) 红糖 100~150g 水冲候温 1 次灌服，日服 2 剂，连服 2~3 日。功能凉血，止血。主治牛实热便血。

槐花苦寒，清热，凉血止血，善治肠风便血。本方大剂量使用，力大而功专。辅以红糖滋阴行血，以防血止而留瘀。

除虫起膘散

出自《大武经》，原无方名。枳壳 25g 贯众 30g 青皮 陈皮 青蒿各 20g 神曲 麦芽 莱菔子各 60g 甘草 槟榔 大腹皮各 15g 为末，引茶枯水，调灌。功能行气驱虫，消食开胃。主治胃肠寄生虫，消瘦。

原方用于治牛“四季肚胀症”，其表现为：“四季肚胀气不消，肠胃有虫仔细瞧，三焦气满少吃草，一年四季不起膘。”方中的茶枯即油茶树籽榨油后的饼粕。

贯仲大黄散

出自《藏兽医经验选编》，原无方名。贯众 500g 大黄 土大黄 野棉花各 250g 大戟 90g 香茶菜 马蔺子各 250g 为末，开水冲调，候温灌服。日服 1 剂，连服 3 剂。功能杀虫消积，泻热通便。主治牛羊绦虫病。羔羊灌服 9~18g。

四政散

出自《驼经大全》。小茴香 官桂 青皮 苍术各 60g 为末，引生姜、炒盐、葱、油，加水稍煎，候温，草前灌服。功能温中，行气，运脾。主治骆驼脾气不和倒嚼。

倒嚼，是体弱或老龄骆驼常发的空口磨牙病，多见于冬春季节，治宜温中健脾，降逆和胃。

椒艾散

出自《全国中兽医经验选编》。花椒 30g 胡椒 15g 炒艾叶 90g 黑糖 120g 为末，开水冲调，候温灌服。功能散寒止痛。主治驼牙痛吐草。

加味黄芪散

出自《骆驼病诊疗经验》。黄芪 60g 党参 45g 花椒 15g 丁香 24g 藿香 30g 枳壳 30g 草乌 21g 当归 30g 细辛 15g 升麻 15g 血竭 24g 炒益智仁 30g 甘草 30g 为末，开水冲调，加白酒 120g，混合灌服。功能健脾理气，祛风止疼。主治骆驼牙疼吐草。

本方适用老弱骆驼的牙疼吐草。

白芷藁本散

出自《骆驼病诊疗经验》。白芷 30g 石膏 30g 黄芩 30g 当归 30g 藁本 30g 川芎 30g 陈皮 30g 细辛 15g 乌头 21g 半夏 30g 乳香 30g 没药 30g 甘草 30g 桔梗 30g 独活 30g 共为末，开水冲调，加白酒 120g，灌服，1 日 1 剂连灌 3 剂。功能祛风活血，消肿止痛。主治骆驼牙疼吐草。

将军冲关散

出自《骆驼病诊疗经验》。大黄 滑石 续随子各 60g 皂角 大戟 番泻叶各 30g 牵牛子 枳实各 45g 木香 24g 芒硝 180g 为末，开水冲调，加清油 500g，混合灌服。功能攻坚破积，泻下通肠。主治骆驼结症。

滑肠承气汤

出自《骆驼病诊疗经验》。郁李仁 60g 滑石 30g 大黄 60g 续随子 45g 芒硝 180g 枳壳 30g 厚朴 30g 槟榔 30g 甘草 30g 当归 60g 为末，加酥油 500g，开水冲调，混合灌服。功能消积导滞，破气通肠。主治骆驼结症。

止泻七补散

出自《骆驼病诊疗经验》。党参 60g 白术 45g 青皮 30g 香附 30g 天雄 30g 肉桂 30g 白芍 30g 良姜 30g 厚朴 30g 猪苓 30g 茯苓 30g 灯心草 30g 炙甘草 30g 天仙子 30g 锁阳 24g 为末，开水冲调，候温灌服。功能健脾燥湿，祛寒止泻。主治骆驼脾虚泄泻。

小米车前散

内蒙古自治区磴口县验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。小米 500g(炒黄) 车前子 100g 干姜 40g 血余炭 50g 为末；灶心土 1 000g 加水 2 000ml 浸，取澄清液冲前药，加红糖 150g 灌服。功能健脾利水，温中止泻。主治骆驼脾虚泄泻。

白术车前煎

出自《兽医常用中药及处方》，原无方名。白术 80g 车前子 60g 水煎去渣，候温灌服。功能健脾利水，止泻。主治骆驼脾虚泄泻，慢性肠炎。

脱套散

出自《中兽医医药杂志》1984 年第 2 期，原无方名。甘遂 5g 大黄 川芎 牛膝各 12g 赤芍 18g 厚朴 木香各 25g 为末，开水冲调，候温灌服，或甘遂为末，用其余药煎汤冲服。功能活血行气，泻下通肠。主治绵羊肠套叠。

5 医肝胆病方

必效散

出自《牛经大全》。青箱子 石决明 草决明 石膏 龙胆草 玄精石 木贼 黄芩为末，蜂蜜、芒硝为引，水调灌服。功能清热平肝，镇惊息风。主治牛肝风。

原方云：“治牛肝肠风病”。玄精石为年久所结的小形片状石膏矿石，性寒，味咸，功能滋阴降火，软坚消痰。

金龙胆散

出自《中兽医诊疗经验》。龙胆草 45g 郁金 30g 枳壳 24g 青皮 24g 柴胡 30g 黄

芩 30g 栀子 30g 金银花 30g 连翘 30g 生枣仁 30g 生地 30g 白芍 30g 车前草 45g 为末，开水冲调，候温灌服。功能清肝利胆，散郁解毒。主治牛胆胀。

龙胆茵陈汤

山西省验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。茵陈蒿 120g 龙胆草 栀子 大黄 各 60g 郁金 50g 为末，开水冲调，候温灌服。功能清热利湿，化瘀退黄。主治牛黄疸。

本方即《伤寒论》中的茵陈蒿汤加龙胆草和郁金。

排风散

出自《证治准绳》，方名见于《牛经大全》。天麻 60g 桔梗 60g 防风 60g 乌蛇 30g 五味子 30g 全蝎 30g 细辛 30g 芍药 30g 研细末，装瓶备用。牛每用 30g，配伍其他药调灌。功能搜风镇痉。主治风症痉搐。

《牛经大全》用本方 30g，配阿胶 15g、桑根白皮 15g，治牛“颠走，逢人即抵触”；又配食盐、葱白，治牛“膝冷”。

镇风散

出自《抱犊集》。僵蚕 荆芥 薄荷 威灵仙 山甲珠 独活 车前子各 20g 牙皂 桂枝 全蝎 川芎 川乌各 15g 伸筋藤 蝉蜕各 30g 为末，开水冲调，候温灌服。功能熄风镇痉。主治牛痉搐。

伸筋藤为防己科植物中华青牛胆的茎，为舒筋活络、祛风止痛药。

蝉蜕银花甜酒饮

出自《中国兽医杂志》1964 年第 3 期，原无方名。蝉蜕 125g 金银花 375g 煎汤去渣，加甜酒 250g 灌服。功能止痉解毒。主治水牛破伤风。

天麻散

出自《牛经大全》。天麻 麻黄 川芎 知母 全蝎 乌蛇 半夏各 30g 朱砂 15g 为末，引酒，同煎，候冷灌服。功能散风活血，熄风镇痉。主治牛破伤风。

还睛散

出自《中兽医医药杂志》1986 年第 1 期。草决明 白蒺藜 青葙子 木贼草各 50g 山栀 45g 虫退 防风各 40g 甘草 15g 麦冬 60g 为末，开水冲调，候温灌服。功能疏肝清热，明目退翳。主治水牛结膜炎、角膜炎、肝火冲眼。

银朱散

出自《牛经切要》。原无方名。银朱 3g 冰片 0.3g 蛇蜕 10g 枯矾 15g 为细末，点眼。功能明目退翳。主治牛白翳遮睛。

银朱为人工制成的赤色硫化汞粉末，又名灵砂。

羌防退翳汤

出自《中兽医医药杂志》1990 年第 6 期。羌活 80g 防风 80g 板蓝根 80g 菊花 60g 银花 50g 鲜千里光 100g 龙胆草 70g 石决明 60g 青葙子 60g 柴胡 80g 茵陈 50g 甘

草 20g 煎汤去渣，候凉灌服。功能清热散风，明目退翳。主治牛云翳遮睛。

本方用羌活、防风以散风退翳。《审视瑶函》曰：“翳膜乃生在表，宜发散而去之；若反疏利，则邪气内陷，为翳益深”。

清心明目散

出自《大武经》，原无方名。栀子 连翘各 30g 石膏 90g 菊花 30g 黄芩 25g 黄连 20g 黄柏 30g 夏枯草 25g 甘草 15g 龙胆草 30g 煅石决明 45g 为末，引车前草，开水冲调，候温灌服。功能清心泻火，平肝明目。主治牛云翳遮睛。

关于本方的立法，原书云：“白膜遮眼属心经，头闷眼胀少精神，眼神可以通心内，要除心火眼才明。”

三花洗眼煎

出自《大武经》，原无方名。白菊花 密蒙花 金银花(各等份)煎汤去渣，加盐少许，候温洗眼。功能清热消肿，明目。主治牛目赤肿痛。

疡五消

出自《兽医中草药验方选》。金银花 连翘 刺黄连 菊花 蒲公英各 100g 煎汤去渣，候温灌服；同时用药汤洗眼。功能清热解毒，散壅明目。主治牛目赤肿痛，结膜炎。

一点灵丹

出自《新刻注释马牛驼经大全集》。明矾 20g 雄黄 2g 朱砂 2g 青盐 10g 牙硝 30g 冰片 2g 麝香 1g 先将朱砂、雄黄研极细末，加入麝香，研细，再入明矾研，然后再入盐、硝研细。每用少许点入闪骨内。功能杀虫，明目。主治牛、驼目中弩丝虫症。

贯仲十九味

藏兽医验方。出自《中兽医科技资料选辑》第 2 集。贯仲 60g 槟榔 60g 苏木 90g 当归 45g 藏茴香 18g 木通 45g 龙胆草 60g 甘草 30g 土茯苓 60g 唐古特青兰 75g 香薷草 75g 藏黄连 90g 囊矩翠雀 45g 香茶菜 75g 莨菪籽 45g 野棉花 60g 土连翘 45g 甘松 60g 藏黄芪 30g 为末，按 1.5g / kg 体重给药；水调灌服。1 天 1 次，连灌 3 次。功能杀虫消积，清热除湿。主治牛肝片吸虫病。

试验表明，用药后 20 天，驱虫率达 85% 以上，牛只安全，而剂量达 1.7g / kg，牛出现不同程度的中毒症状，较严重的表现卧地、咬牙、心跳、呼吸加快、停食，但持续 24 小时后，逐步恢复正常。唐古特青兰为唇形科植物，功能发散风热，清热凉血。

乌双龙胆散

出自《藏兽医经验选编》，原无方名。乌双龙胆 600g 翻白草 450g 秦艽 450g 囊矩翠雀 450g 假楼斗菜 250g 麝香 0.3g 马先蒿 250g 草乌 90g 西河柳 300g 菖蒲 15g 熊胆 1.5g(也可不用) 为细末，大牛每次 30~45g，小牛 24~30g，羊 15~30g，在每年的 11~12 月份左右，用适量藏酒调成稀糊状灌服。灌药后一天内停止饮水，在阳坡放牧。功能清热解毒，除湿利胆。主治牛羊肝片吸虫病。

退衣散

出自《羊病及防治》。煅炉甘石 9g 硼砂 黄连各 3g 冰片 0.9g 为极细末，每用少许点眼。功能清肝明目，退翳。主治羊云翳遮睛。

加味茵陈散

出自《骆驼病诊疗经验》。茵陈 90g 连翘 30g 郁金 30g 大黄 60g 栀子 30g 柴胡 30g 白芍 30g 丹皮 30g 荆芥 30g 黄连 30g 黄芩 30g 黄柏 30g 茯苓 30g 木通 30g 甘草 30g 为末，开水冲调。候温灌服。功能清热利湿，疏肝利胆。主治骆驼湿热黄疸。

四物熄风汤

出自《骆驼病诊疗经验》。当归 60g 川芎 45g 白芍 30g 熟地 30g 蝉蜕 30g 防风 30g 麦门冬 30g 红花 30g 胡黄连 30g 天麻 30g 胆南星 30g 羌活 30g 乌蛇 60g 丹皮 30g 全蝎 30g 甘草 30g 为末，开水冲调，候温灌服。功能活血凉血，熄风解毒。主治骆驼破伤风。

青盐散

出自《驼经大全》。青盐 乌贼骨 芒硝 铜青 枯矾各等份 为极细末，用灯心蘸少许点眼。功能明目退翳。主治骆驼云翳遮睛。

6 医肾病方

干姜猪苓汤

出自《牛经备要医方》。麻黄 9g 干姜 15g 甘草 12g 猪苓 60g 青皮 30g 车前子 60g 破故纸 60g 木通 60g 泽泻 60g 水煎服。功能辛温开泄，通利膀胱。治牛尿肿胀，小便不通。

滑石通淋散

出自《新刻注释马牛驼经大全集》。海金沙 30g 木通 25 滑石 45g 瞿麦 30g 车前子 30g 二丑 30g 篇蓄 45g 甘草 30g 灯心草 10g 为末，开水冲调，候温灌服。功能清热泻火，利尿通淋。主治牛胞转。

本方源于《和剂局方》八正散，减去大黄、栀子；加入海金沙、二丑。

通淋散

出自《新刻注释马牛驼经大全集》。二丑 30g 滑石 45g 石莲子 30g 泽泻 30g 车前子 45g 灯心草 10g 为末，开水冲调，候温灌服。功能清热逐水，利尿通淋。主治牛小便不通。

猪苓滑石汤

出自《牛经切要》，原无方名。猪苓 泽泻 滑石 麦冬 黄柏 瞿麦 篇蓄 甘草 牛膝各 30g 煎汤去渣，候温灌服。功能清热利尿。主治牛小便不通。

车前梔地汤

出自《农业考古》1991年第1期，原无方名。车前草 100g 山栀子 50g 地黄 50g 煎汤去渣，候温灌服。功能清热利尿。主治牛膀胱湿热，尿结。

滑石散

出自《牛经大全》。滑石 木通 续随子各 30g 桂心 10g 厚朴 豆蔻 白术 黄芩 牵牛子各 20g 为末，水调灌服。功能清热通淋。主治牛砂石淋。

金沙滑石散

出自《骆驼病诊疗经验》。滑石 30g 桑白皮 45g 茅根 30g 石苇 30g 陈皮 30g 猪苓 30g 赤芍 30g 海金沙 30g(另包冲服) 篇蓄 45g 瞿麦 30g 枳实 30g 竹叶 30g 木香 15g 灯心草 15g 甘草梢 30g 为末，开水冲调，候温灌服。功能清热除湿，利尿通淋。主治骆驼砂石淋。

金钱金沙饮

出自《羊病及防治》，原无方名。金钱草 50g 海金沙 30g 煎汤去渣，候温灌服；或为末冲服。功能通淋排石。主治羊尿路结石。

知柏滑石汤

出自《羊病及防治》，原无方名。酒知母 酒黄柏各 9g 滑石 木通 车前子各 12g 瞿麦 黄芩各 6g 海金沙 3g 煎汤去渣 候温灌服。功能清热滋阴，利尿通淋。主治羊排尿淋漓，膀胱炎。

7. 医胎产及羔犊病方

清带汤

出自《兽医验方新编》。山药 90g 生龙骨 生牡蛎各 50g 海螵蛸 25g 茜草 苦参 黄柏各 30g 甘草 15g 煎汤去渣，候温灌服。功能清热燥湿，止带。主治赤白带下，子宫内膜炎。

本方为《医学衷中参西录》中的清带汤(山药、龙骨、牡蛎、海螵蛸、茜草)加苦参、黄柏、甘草而成，清热燥湿之力更强。

净宫液

出自《中兽医学杂志》1986年第3期。原名当归散。当归 川芎 黄芩各 10g 赤芍白芍 白术各 5g 加水 300ml，煎汤，4层纱布过滤，去渣，再用滤纸过滤2次，可得药液 100~150ml，煮沸备用。先用 40℃左右的 3%硼砂溶液 500~1 000ml 冲洗阴道和子宫，冲洗液导出后注入 40℃左右净宫液 1 剂，每日 1 次。功能活血化瘀，清热止带。主治奶牛慢性子宫内膜炎。

据报道，用本方治疗奶牛慢性子宫内膜炎 25 例，痊愈 20 例，好转 5 例，平均疗程 9 天(6~17 天)。

党参益母鸡冠散

出自《辽宁畜牧兽医》1989年第4期。党参 黄芪各 50g 当归 桃仁 红花各 30g 丹参 50g 益母草 70g 鸡冠花 贯众各 60g 蒲公英 50g 香附 40g 血余炭 25g 为末，1 日分 2 次内服，6 天为 1 个疗程。功能益气补血，化瘀通经。主治奶牛慢性子宫内膜炎。

银花苦参液

出自《兽医验方新编》，原无方名，金银花 200g 苦参 20g 煎汤去渣，候温冲洗阴道。主治阴道炎。

据该书记载，野菊花煎液冲洗，功用相同。

温经孕子汤

出自《兽医验方新编》。鸡血藤 400g 干姜 90g 茴香 熟地各 60g 艾叶 白术各 50g 当归 70g 牛膝 80g 阳起石 70g 煎汤去渣，加红糖 250g，候温灌服。功能活血温经，助阳。主治牛、马不发情，卵巢机能减退。

复方仙阳汤

出自《畜牧兽医学报》1989年第3期。仙灵脾(淫羊藿) 阳起石 益母草各 80~100g 当归 赤芍菟丝子 补骨脂 枸杞子(或黄精) 熟地各 70~80g 煎汤去渣，候温灌服，每日 1 剂，一般服 3 剂。功能补肾壮阳，通络活血，祛瘀生新。主治奶牛产后卵巢静止和持久黄体性不孕症(证属肾阳虚和气滞血瘀型)。

加减法：口色淡白晦暗，大便稀薄者，加附片、官桂各 20~30g 以温补肾阳；黄体持久不消或黄体囊肿，呈郁血阻滞者，则加莪术、荆三棱、红花、桃仁以破血祛瘀。

江苏省农科院畜牧兽医研究所蒋兆春等应用本方治疗奶牛卵巢静止和持久黄体性不孕症 150 头，发情、排卵的 140 头，有效率 93.9%；配种 140 头，受孕 120 头，受胎率为 85.7%。

养情汤

出自《中兽医临证要览》。全当归 45g 川芎 30g 巴戟 30g 菟丝子 30g 淫羊藿 30g 阳起石 30g 续断 25g 党参 25g 骨碎补 25g 炙黄芪 40g 白术 30g 远志 25g 石菖蒲 25g 黄酒 120ml 为末，开水冲调，候温灌服。2 天 1 剂，连服 3 剂为 1 个疗程。功能补益气血，健脾温肾。主治牛虚弱不孕。

菟丝覆盆子散

出自《中国兽医杂志》1990年第2期，原无方名。菟丝子 覆盆子各 60g 蛇床子 枸杞子 女贞子 当归 丹参 赤芍 川牛膝各 40g 川断 杜仲各 45g 煎汤去渣，候温灌服。功能补肾活血。主治牛不孕症。

加减：肾气不足者，加淫羊藿、巴戟、仙茅；血瘀气滞者，加红花、益母草、枳壳、路路通；气血两虚者，加黄芪、党参、熟地、淫羊藿；宫寒胞冷者，加附子、肉桂、艾叶、小茴香、淫羊藿；湿热下注者，加金银花、黄柏、红花、苍术。

复方藿阳促孕汤

出自《中国兽医杂志》1996 年第 3 期。淫羊藿 130g 阳起石 80g 菟丝子 70g 当归 90g 益母草 120g 鸡血藤 300g 制首乌 70g 熟地 70g 官桂 30g 制附子 30g 黄芪 100g 党参 50g 白术 40g 茯苓 40g 红花 30g 川芎 40g 诸药煎汁，取韭菜 2~2.5kg，捣烂滤汁，与黄酒 0.5~1kg，红糖 250g，冲入药汤。卵巢静止、持久黄体病牛每天 1 剂，3 剂为 1 疗程。20 天内未发情可再服第 2 疗程。服药 1~3 个疗程后在 2~10 天内就可发情输精。对排卵障碍牛可在发情前 3~4 天服药，或发情后 14~15 天服药。一般 1~3 剂可发情输精。本方治奶牛不孕症 210 例，治愈 190 例。

苘实散

出自《中兽医医药杂志》1991 年第 6 期。苘实 260g 益母草 100g 当归 50g 红花 30g 川芎 60g 为末，开水冲调，候温灌服。功能活血化瘀。主治牛子宫回缩不全引起的不孕症。

苘实，为锦葵科植物苘麻的种子，入药炒黄。

据报道，用本方治疗母牛子宫回缩不全引起的不孕症 101 例，治愈 98 例。在发情初期服药，发情中后期输精。

天花粉蛋白胶囊

出自《中国兽医杂志》1987 年第 4 期。鲜天花粉 洗净，去皮榨汁，静置过夜，除去淀粉，吸取上清液，采用无机酸及有机溶剂，在一定条件下分级沉淀，离心，沉淀物用蒸馏水溶解，透析后冷冻干燥，分装胶囊。本品蛋白质含量不低于 70%，由 19 种氨基酸组成；灰分不超过 10%。功能活血化瘀，净化子宫。主治牛胎衣不下，受胎率低。

据研究，天花粉蛋白能专一性地作用于胎盘滋养层细胞，使胎盘绒毛组织变性坏死，与母体尽早脱落，从而达到提早净化子宫内环境的目的。使子宫机能及时恢复，降低胎衣不下奶牛的淘汰率，提高受胎率。

寿胎散

出自《医学衷中参西录》，原名寿胎丸，见于《中兽医学杂志》1991 年第 4 期。杜仲 80g 菟丝子 100g 桑寄生 川断 阿胶各 90g 为末，开水冲调，候温灌服。功能补肝益肾，养血安胎。主治奶牛隐性流产，习惯性流产，先兆流产。

据报道，用本方治疗奶牛流产 53 例，治愈 48 例；治奶牛隐性流产 16 例，治愈 14 例；习惯性流产 31，治愈 29；先兆性流产 6 例，治愈 5 例。

白术散

出自《抱犊集》。白术 当归 熟地 川芎 白芍 人参 紫苏 甘草 砂仁 陈皮 黄芩 阿胶(炒) 生姜为末，开水冲调，候温灌服。功能补气养血，安胎。主治牛胎动不安。

开富散

出自《中兽医学杂志》1987 年第 3 期。丹参 200g 黄芪 120g 党参 当归各 60g 川芎 牛膝各 30g 煎汤去渣，加白酒 60g 灌服。功能益气活血，祛瘀催产。主治耕牛难产。

益母车前汤

出自《中兽医医药杂志》1986年第6期。益母草 100~300g 车前子 100~300g 当归 60~90g 川芎 15~30g 党参：100~200g 红花 30~60g 炙甘草 90~120g 水煎 3 沸取汁，加黄酒 250~300ml，候温灌服。每日 1 剂，连用 1~3 剂。功能补气活血，通经散瘀。主治牛胞衣不下。

本方主要用于牛气血两虚的胞衣不下。临症应用时，对口色红、体温不高者加桃仁、丹参；对体温偏高，阴户不断流出暗红色腥臭液体者，易炙甘草为生甘草，另加生地、玄参等；口色淡白、拱背竖毛、肢寒体冷者，加炮姜、附子；食欲不振、反刍无力者，加苍术、厚朴、白术。

3 年内用该方治疗牛胎衣不下 24 例，其中经产牛 11 例，初产 8 例，流产牛 5 例，痊愈 20 例(用药 1 剂愈 12 例，2 剂愈 6 例，3 剂愈 2 例)。其余 4 例给药 3 次后配合他法而愈。

雷莲汤

出自《藏兽医经验选编》。雪莲花 30g 小叶假楼梯菜 30g 白酒 200ml 为引，共研为细末，一般灌服一次。功能补肾壮阳，通经活络，活血去瘀，促进宫缩。主治牛胎衣不下。

治疗耗牛胎衣不下 221 例，治愈 207 例。一般在服后 5~6 小时开始排出胎衣，个别病例须在次日再服 1 剂。

将雪莲汤改成复方雪莲注射液(1g 生药 / ml)，雪莲花 500g，小叶假楼梯菜 500g，加常水适量煎煮，收集蒸馏液 250ml，并滤取煎汁。再在药内加水煎煮，滤取煎汁，取 2 次滤液合并浓缩至 750ml，加 3 倍乙醇沉淀 24 小时，回收乙醇，制得药液 750ml，与蒸馏液 250ml 合并，共得注射液 1 000ml，每日 2 次肌注，10~20ml / 次。多数病例需注射 2~3 次。治疗牛胎衣不下 44 例，治愈 41 例、死亡 3 例，凡及时治疗者效果好。

应验散

出自《牛医金鉴》。肉桂 丹参 白扁豆 莲肉 熟地 白芍 吴茱萸 杜仲 破故纸 胡桃肉 川芎 当归 白术 茯苓 山药 黄芪 甘草 陈皮 神曲 为末，开水冲调，候温灌服。功能补气血，健脾胃，暖腰肾，壮命门。主治牛产后劳伤。

关于本方的应用经验，原书云：“有一牛字牛，但凡用力则肚腹膨胀，每每草饱腹中无妨，如有饥渴用力则胀，服药无效。后知此牛产仔，正当忙时，未得满月，气血不足，劳伤饥寒，以致亏损，脾胃三焦丹田命门无实火，故子宫寒冷，而肾胃虚。乃用药健脾胃，补三焦，暖子宫，滋肾水，补养丹田命门而获效验。”

产后康复宁

出自《中国兽医杂志》1997 年第 7 期。益母草 50g 枳实 45g 山楂 40g 黄芪 30g 当归 25g 漏芦 20g 荆芥 15g 木通 15g 川芎 10g 经烘干、粉碎、过筛、拌匀后制成散剂。每日早晚各内服 500g，连服 3 日。功能扶正祛邪，活血化瘀，通经下乳。用于产后康复，防治隐性乳房炎。

据报道添加产后康复宁奶牛平均日增加奶产量 1.43kg ($P < 0.005$)。隐性乳房炎治愈率

达 75% ($P < 0.005$)。

催乳汤

出自《活兽慈舟》，原无方名。党参 45g 黄芩 30g 茯苓 30g 通草 30g 川芎 30g 当归 45g 白芍 30g 续断 30g 牛膝 30g 陈皮 25g 煎汤去渣，候温灌服。功能益气养血，通经下乳。主治牛缺乳。

催奶灵散

出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。王不留行 20g 黄芪 10g 皂角刺 10g 当归 20g 党参 10g 川芎 20g 漏芦 5g 路路通 5g 上药粉碎成粗粉，过筛混匀。马、牛 300~500g；羊、猪 40~60g。连喂 15~30 天。功能补气养血，通经下乳。用于产后乳少，乳汁不下。

金蒲汤

出自《奶牛乳腺炎》。金银花 80g 蒲公英 90g 紫花地丁 80g 连翘 60g 陈皮 青皮各 40g 甘草 30g 引白酒，水煎去渣，候温灌服。功能清热解毒，行气消痈。主治奶牛乳痈。

远志膏

出自《奶牛乳腺炎》。远志 500g，加水 1 500ml，小火煎 5~6 小时，成糊状，去渣，再熬 30 分钟，至药液具粘性。涂于洗净的患部。功能消痈。主治奶牛乳痈。

大安丸

出自《丹溪心法》，见于《中兽医经验集锦》。白术 20g 山楂 30g 建曲 30g 半夏 15g 茯苓 15g 陈皮 15g 连翘 15g 莱菔子 15g 水煎去渣，候温灌服。功能健脾化积，消食和胃。主治犊牛伤乳。

应用本方时，应先绝食 2 天，多饮盐水。每次灌服 200~500ml 为宜。腹痛者，加延胡索；泄泻重者，加焦山楂、地榆炭；胀满者，加枳壳、槟榔；脾虚重者，重用白术，加党参。

参榆散

出自《骆驼病诊疗经验》。党参 炒地榆各 60g 败酱草 120g 为末，开水冲调，候温灌服。功能益气和血，安胎。主治骆驼憋胎症。

原书云：母驼在怀孕期间出现阴户憋胀，轻度腹痛，称为憋胎。

胆膏散

内蒙古自治区验方，原名苏斯一 7，为蒙医方。见于《中兽医方剂大全》。胆膏 50g 连翘 150g 木鳖子仁(制) 麦冬各 125g 香附 木通各 100g 丹参 75g 为末，羔羊每次 5~10g，开水冲调，候温灌服。功能清热解毒，止泻止痢。主治羔羊湿热泻痢。

七味胆膏散

蒙古族兽医验方，出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。胆膏 50g 连翘 150g 木鳖子 125g 麦冬 100g 香附 200g 关木通 50g 丹参 80g 除胆膏外其余 6 味粉碎成细

粉，将胆膏适量水溶解，混入细粉中，充分搅拌，过筛，混匀，于 60℃以下干燥，备用。
羔羊 1~5g。功能清热解毒，止泻止痢。主治羔羊腹泻、痢疾。

草河车四味

出自《兽医简便良方》，原名**伊得尔 一 都如布**，为蒙兽医方。草河车 2g 麦冬 1.5g 连翘 2.5g 木通 2g 为末，炒葫芦子 1.5g、炒大米 1.5g，煎汤为引，冲药末服，日服 2 次。功能清热解毒，滋阴利水。主治羔羊下痢。

狗胆七味

出自《兽医简便良方》，原名**苏苏 一 道老**，为蒙兽医方。狗胆(阴干)3g 木鳖子 麦冬各 5g 连翘 6g 香附 木通 丹参各 4g 为末，每次 5~9g，冲服。功能清热解毒，化瘀行气。主治羔羊下痢。

英雄七味

内蒙古自治区验方，原名**巴特尔 一 7**，为蒙兽医方。见于《中兽医方剂大全》。草乌 诃子各 25g 茜草 翻白草 黑云香各 10g 银朱 甘松各 5g 为末，羔羊每次 3~6g，开水冲调，候温灌服。功能解毒止痢。主治羔羊痢。

方中的黑云香即野猪粪，烧炭用。本方经内蒙古兽药监察所验证，对羔羊痢疗效甚佳。

胡黄连十味

内蒙古自治区验方，原名**洪林 一 10**，为蒙西兽医结合方。见于《中兽医方剂大全》。胡黄连 120g 石榴皮 170g 干姜 100g 防风 50g 黄柏 秦皮 白头翁各 80g 苯乙哌啶 0.25g 硫酸阿托品 0.0025g 盐酸吗啡双胍 5g 为末，混匀，羔羊每次 0.8~1.2g，开水冲调，候温灌服。功能清热解毒，杀菌消炎，止泻止痢。主治羔羊痢疾，泄泻。

经内蒙古兽药监察所验证，本方用于防治羔羊痢，疗效达 95%以上。

黄岩酊

出自《藏兽医经验选编》。岩青 500g 三颗针 700g 两药分置两个容器内，分别加入普通水 7 倍，浸泡 12 小时，直火煎煮 2 小时左右，多层纱布过滤，收集滤液。药渣再加适量水煎煮 1 小时左右，滤出药液。合并先后两次药液。两种药液的浓度均应调整到 50% (多时浓缩，少时冷开水补足)，然后将两种药液混合，即产生黄褐色沉淀，室温下静置 24 小时，再以多层纱布过滤，滤液中按 10%比例加入酒精，即为 50%黄岩酊，装瓶备用。羔羊 2~15ml，犊牛 10~15ml，大羊 20~50ml，猪 50~100ml，牛、马 500~1 000ml，每日灌服 1 次，连用 3~5 天。功能清热解毒，健脾益气。主治羔羊、犊牛拉稀病及大家畜腹泻症。

黄岩酊的半数致死量为 62.03g 生药 / kg 体重。

痢疾散

出自《藏兽医经验选编》。地榆 蒲公英 旱苗蓼 胡黄连 老鹳草各 180g 藏木香 210g 拳参 炒大黄 龙胆草 岩青各 500g 混为细末，开水冲调，候温灌服。马、牛每次 250~500g，猪、羊 20~50g，羔羊 3~6g。功能清热解毒，健脾益气，敛肠止泻。主治

羔羊、犊牛疾病，大家畜胃肠炎，仔猪白痢，受凉腹泻。

旱苗蓼为蓼科蓼属，性温，味淡，功能散寒活血。

榴皮山奈散

出自《藏兽医经验选编》，原名**石榴皮山奈方**，又名**九味石榴皮散**。石榴皮 30g 山奈 15g 白胡椒 荜拨各 6g 肉豆蔻 桂通 草果 山茵芋籽 草蔻各 3g 共研细末为散剂，羔羊每次 3~7g，每天 1~2 次，内服。功能温中散寒，行气止痛，健胃消食，涩肠止痢。主治羔羊拉稀。

将散剂发酵后，滤出发酵酒喂服，疗效更好，有效率达 95% 以上。先将荜拨、山奈、白胡椒碾成粉，加入黄酒曲，按 1: 3 加水，加温发酵，取出阴干作为三香曲酵母。将散剂药按 1: 3 加水煮沸后，冷却至 20℃ 左右，加入三香曲(每 500g 散剂药加三香曲 30g)，充分拌匀密闭。发酵罐(陶瓷器皿为佳)温度保持在 20℃ 左右，经 5~7 日，待发出酸气为止。液体呈黄色如清油状，为混合糊状物，过滤密封备用。羔羊每次 3~5ml，每天 1~2 次，内服。

胡黄圆柏丸

出自《藏兽医经验选编》。由两个处方合成。第一方为：圆柏 60g 木柏枝 60g 镰形棘豆 24g 黄花杜鹃 90g 陇蜀杜鹃叶 60g 甘草 120g 为末，加常水 5 倍，熬成膏剂。第二方为：土胡连(可用黄连或土黄连代替)1 500g 黄刺根中层皮(可用黄柏代)48g 披针叶虎耳草 500g 银老梅 1 500g 小叶假楼斗菜 1 500g 翼首花 500g 异叶青兰 500g 黄花铁线莲 1 500g 丁香 500g 山奈 500g 桃花散(陈石灰 2 份 大黄 1 份)250g 为末，制成散剂。将第二方散剂加入第一方的膏剂中，其量以能做成丸为度。丸剂的大小以 1g 左右为宜。两月龄的羔羊，每次服 1 丸，每日服 2~3 次，连服 3~5 天，但一般服药一次即可见效。功能清热解毒，温中理气，燥湿止泻。主治羔羊痢疾，犊牛拉稀及消化不良。

西藏圆柏为柏科，功能清热解毒，去湿防腐。土胡连为玄参科四方麻属，功能凉血解毒，健胃止痢。银老梅为蔷薇科金老梅属，功能理气散寒，利尿消水，肠道防腐。披针叶虎耳草为虎耳草科虎耳草属，功能清热解毒，清心镇痉。

羔犊止痢汤

西藏自治区东亚县验方，见于《中兽医方剂大全》。岩青 5 000g 胡黄连 4 500g 大黄 2 000g 藏姜 2 500g 老鹳草 4 500g 三花龙胆 5 000g 旱蓼 1 000g 藏茴香 500g 地榆 7 500g 逆阿落 4 500g 火麻仁 2 000g 轮叶棘豆 2 000g 卵叶囊吾 1 000g 上述各药洗净、切片、混合，加五倍量常水煎煮 2~4 小时，滤取药液，再在滤液中加三倍水，待冷后加入 0.1% 苯甲醇和防腐剂，装瓶备用。羔羊每次 4~6ml，犊牛 30~40ml 灌服，每日 1~2 次。功能清热解毒，涩肠止泻，祛风镇痛，开郁醒脾。主治羔犊拉稀病。

逆阿落为蓼科蓼属植物，性温，味辛。功能涩肠止痢。本方对马、驴驹拉稀也有一定效果。15 年治疗各种家畜拉稀 30 余万例，治愈率 87. 19%，总有效率 95. 32%。

麝香酒

出自《青海省中兽医经验集》，原无方名。麝香 1g 研成粉末，加入 70% 酒精 1 000ml，使之全部溶解，每只羔羊灌服 1ml，每日 1 次。功能解毒止泻。主治羔羊下痢。

佛姜饮

出自《青海省中兽医经验集》，原无方名。佛姜 3g (研末)，加温开水或茶水 50ml，给产后 5 天的羔羊 1 次灌服。功能止泻。主治羔羊下痢。

佛姜即中药锁阳，当地牧民将佛姜草连根采集，除去根部泥土，放在锅内烤干，待凉后研成细末，即可服用。原方载共治疗羔羊下痢 539 例，治愈 510 例。

芪附术甘汤

出自《中兽医医药杂志》1991 年第 6 期，原无方名。黄芪 75g 附子 4.5g 白术 45g 甘草 13g 煎汤去渣，候温灌服。功能健脾温中。主治犊牛腹泻。

发热者，可加柴胡、黄芩；咳喘者，可加桔梗、五味子；泻甚者，可加乌梅、诃子。据报道，用本方试治犊牛腹泻 54 例，治愈 52 例。

山药合剂

出自《黑龙江畜牧兽医》1982 年第 2 期。生山药 50g 含糖胃蛋白酶 10g 生山药研末，与胃蛋白酶混合灌服。功能健脾化湿，温肾止泻。主治犊牛腹泻。

杜鹃丛蒴散

出自《藏兽医经验选编》，原名小叶杜鹃丛蒴方。小叶杜鹃 丛蒴各 30g 桂皮 白姜 荜拔各 15g 共研细末，开水冲调，候温灌服。牛犊、马驹每次 10~15g，羔羊 3~7g。功能温中散寒，理气镇痛，醒脾健胃，主治犊牛、羔羊拉稀。

该方制成发酵酒，效果优于散剂。将散剂按 10: 1 加温水和适量的三香曲，搅拌均匀，置陶罐内密封，放于坑上保持恒定温度 28℃ 左右，发酵 7 天，取出过滤，滤液呈清油状备用。牛犊、马驹每次 5~10ml，羔羊 3~5ml，每日 2~3 次。治疗牛犊、马驹拉稀病 4 000 例，治愈 3 800 例；治疗羔羊拉稀 5 600 例，治愈 5 432 例。

8 医癘拐方

二活驱风散

出自《全国中兽医经验选编》，原无方名。麻黄 桂枝 羌活 独活 苍术 木瓜 附子各 45g 防风 松节各 30g 细辛 甘草各 15g 煎汤去渣，候温灌服。连服 2 剂后，可减麻黄、附子，或减量再服，至愈为止。功能解表散寒，祛风除湿。主治牛风湿痹痛。

独活寄生汤

出自《抱朴集》。羌活 独活 防风 当归 桂枝 五加皮 防己 秦艽 续断 川芎 杜仲 车前子 桑寄生 为末，酒为引，开水冲调，候温灌服。功能祛风湿，止痹痛，益肝肾。主治牛痹症，跛行。

本方是由《备急千金要方》中的独活寄生汤加减变化而来。与之相比。补气血功能不及，而祛风湿作用更强。

活血止痛散

出自《牛医金鉴》。当归 乳香 羌活 甘草 桂枝 牛膝 槟榔 没药 生地 陈皮 石斛为末，引姜汁、黄酒，开水冲调，候温灌服。功能活血化瘀，理气止痛。主治牛胸膈痛。

百补散

出自《牛经大全》。白芷 陈皮 厚朴 没药 萆薢 小茴香 当归 煅自然铜 五灵脂 苦楝子 黄芩 骨碎补 鹿茸 牛膝 延胡索各 20g 为末，引酒、姜，开水冲调，候温灌服。功能温肾助阳，行气活血，散寒止痛。主治牛肾伤，腰胯疼痛。

《养耕集》引载本方时，减去了萆薢、当归、黄芩、骨碎补、延胡索、鹿茸、牛膝等七味，只剩下八味药，主治相同，但温补肾阳之力不及本方。

同名方有：百补散 出自《养耕集》。白芷 陈皮 厚朴 没药各 100g 茴香 自然铜（淬） 五灵脂 苦楝子各 60g 为细末，姜、酒煎，温服。功能行气散寒，活血止痛。主治牛肾伤，腰胯疼痛。

当归乳没汤

出自《牛经备要医方》。当归 30g 乳香 30g 没药 30g 川牛膝 60g 钻地风 30g 生地 30g 红花 30g 炮姜 30g 麻黄 15g 川乌 90g 千年健 30g 车前子 30g 桂枝 60g 草乌 15g 木通 30g 陈酒 250g 水煎去渣，候温灌服。功能活血化瘀，驱风散寒。主治牛跌打损伤。

原方随症引经药：头顶用藁本，追风加苍耳子，头痛加川芎，面部用白附子、白芷，两耳用细辛，背脊用羌活、防风，前身用桂枝，重加威灵仙，腰痛用川续断、杜仲，左胁用柴胡，右胁用枳壳，两胁痛气急用青皮、杏仁，甲至大腿用川牛膝、木瓜，小腿用独活，脚底用钻地风、千年健，肋痛用白芥子，头上损伤用蔓荆子，心脘胸中用乳香、没药，新伤用炮姜，陈伤用黑姜，左前用柴胡，右前用升麻，左脚用麻黄，右脚用桂枝。分两随症增减。

归红汤

出自《中兽医学杂志》1984 年第 4 期。当归 40g 红花 35g 川芎 牛膝 续断 40g 五加皮 35g 木瓜 30g 煎汤去渣，候温灌服。功能活血化瘀，祛风活络。主治牛跌打损伤，风湿痹痛。

敷膊散

出自《大武经》，原无方名。栀子 连翘 黄柏 红花 大黄 赤芍（各等份） 为末，小麦面及醋调和，敷膊上。功能清热散瘀。主治牛跌扑失膊。

红花散

出自《牛医金鉴》。红花 秦艽 没药 赤芍 乳香 当归 萆薢 石斛 生地 甘草 陈皮 刘寄奴 菜瓜子为末，引螃蟹汁、黄酒，水调灌服。功能活血化瘀，祛湿止痛。主治

牛前膊闪伤。

活血酒

出自《兽医中草药剂的制备与剂型改革》，原名**牛活血药酒**。黄芪 50g 石菖蒲 25g 狗脊 当归 骨碎补 熟地 鸡血藤各 100g 川芎 50g 大麦酒 4 500ml 用大麦酒浸泡诸药 1 个月，纱布过滤，密封贮存。每次 150~250ml，每日 1 次，加 4 倍量水灌服。功能活血散瘀，舒筋壮骨，健脾益气。主治牛营养不良，劳役过度，骨节肿痛。

舒筋散

出自《中兽医医药杂志》1988 年第 4 期。乳香 没药 骨碎补 当归各 40g 牛膝 45g 川芎 30g 伸筋草 35g 共为细末，开水冲调，给牛 1 次灌服。功能活血止痛，舒筋散瘀。主治关节肿痛。

正骨仔鸡膏

出自《大武经》，原无方名。天南星 生半夏 红花 桃仁 伸筋草各 30g 仔鸡捣烂调药末，将骨折整复后外敷，包紧固定。功能活血止痛。主治牛骨折。

敷寸散

出自《大武经》，原无方名。黄柏 梔子 大黄 酒黄芩 鸡血藤(各等份) 冰片(少许) 为末，引小麦面、醋，调匀敷于患处。功能清热化瘀。主治牛闪伤寸子。

血竭白及散

出自《中国奶牛》1989 年第 4 期。血竭 白及 龙骨各 10g 儿茶 乳香 红花 没药 各 5g 樟脑 朱砂 冰片 轻粉各 2g 为极细末。先洗净患肢，修蹄，清除坏死组织，10% 碘酊消毒，再用本方适量撒布创面，松馏油脱脂棉填塞，绷带包扎，7 日换药 1 次。功能化瘀脱腐，敛疮生肌。主治奶牛腐蹄病。

腐蹄膏

出自《藏兽医经验选编》，原无方名。草三七 瓦苇 小景天 龙骨 阿氏蒿 绢毛苣角茴香各 5 000g 牡蒿 金莲花 斑瓣虎耳草 匍地毛茛 丛状虎耳草各 2 500g 块茎粗苏 1 500g 绿矾 500g 牛羊胆汁 30g 按药重加 8 倍量水煎熬至每千克药剩水 3 000ml，过滤取汁，再加热熬成膏。温水洗净患部，将药膏涂擦在溃烂和坏死部位。功能清热解毒，祛湿通络，散瘀消肿。主治由坏死杆菌引起的牛羊腐蹄病。

瓦苇为水龙骨科瓦苇属，功能消肿止血，祛湿通络。绢毛苣为菊科绢毛苣属，功能清热解毒，平热降压。牡蒿为菊科蒿属，功能清热凉血，滋阴止咳，通利二便。斑瓣虎耳草为虎耳草科虎耳草属，功能除湿解毒，行血去瘀，消肿退黄。丛状虎耳草为虎耳草科虎耳草属，功能清热利湿。

冰硼膏

出自《中兽医治疗学》。冰片 3g 硼砂 6g 滑石 12g 龙骨 10g 新红 3g 轻粉 3g 麝香 0.3g 为细末，凡士林调成油膏。清洗患部后放入油膏，用棕包扎，黄蜡封固，1 日洗换

1 次。功能去腐、敛疮、生肌。主治牛漏蹄。

乳没花椒油

出自《中兽医治疗学》，原无方名。清油 125g 乳香 没药 花椒各 15g 共合一处煎熬，去渣放温，涂于患部。功能润燥止痛，祛瘀生新。主治牛蹄伤，蹄部溃烂，蹄甲焦枯。

天麻活络散

出自《骆驼病诊疗经验》。天麻 30g 防风 30g 荆芥 25g 桔梗 30g 白芷 30g 当归 45g 川芎 25g 秦艽 30g 胆南星 25g 红花 30g 升麻 15g 独活 30g 苏叶 30g 连翘 20g 甘草 20g 薄荷 15g 为末，开水冲调，候温灌服。功能祛风解表，舒筋活血。主治骆驼龟项风。

胜湿活络散

出自《全国中兽医经验选编》。苍术 桑寄生各 45g 羌活 30g 川乌 15g 千年健 20g 肉桂 25g 川芎 海风藤 细辛各 20g 威灵仙 丹皮 泽泻 甘草各 30g 乌药 15g 小茴香 45g 为末，开水冲调，白酒 120g 为引，候温灌服。功能祛风胜湿，活络散寒。主治驼腰胯风湿。

羌活狗脊散

出自《骆驼病诊疗经验》。羌活 45g 狗脊 45g 独活 45g 当归 30g 杜仲 45g 白芷 25g 木瓜 30g 防己 30g 炒破故纸 30g 细辛 15g 牛膝 30g 桑寄生 30g 苍术 30g 甘草 30g 骨碎补 45g 为末，开水冲调，候温灌服。功能祛风除湿，益肾散寒。主治骆驼风湿腰胯病。

沙参止痛散

出自《骆驼病诊疗经验》。沙参 30g 枳壳 30g 乳香 30g 橘红 45g 赤芍 30g 丝瓜络 30g 郁金 30g 牛膝 30g 荷叶 30g 知母 30g 甘草 30g 为末，开水冲调，候温灌服。功能宽胸利膈，散瘀止痛。主治骆驼走伤五攒痛。

石灰膏

出自《驼经大全》。血余炭 10g 石灰 30g 黄丹 5g 沥青 30g 猪脂熬为膏，涂敷患处。功能脱腐生肌，护蹄。主治骆驼漏蹄。

9 医疮痈癰疥方

加减普济消毒饮

出自《牛经备要医方》。大黄 60g 黄芩 30g 黄连 25g 甘草 30g 马勃 30g 薄荷 60g 玄参 60g 牛蒡子 30g 升麻 18g 柴胡 60g 桔梗 60g 滑石 120g 青黛 30g 陈皮 30g 连翘 60g 荆芥 60g 板蓝根 15g 水煎去渣，候凉灌服。功能清热解毒，散痈消肿。主治牛大项颈痈，颈项之间漫肿无头、角热目赤、口角流涎、肌肉热、舌苔黄、便秘、尿赤。

本方即李东垣的普济消毒饮(见于《证治准绳》)减僵蚕，加滑石、青黛、荆芥。

补气托毒护心散

出自《中兽医医药杂志》1987年第5期。生黄芪150g 当归60g 乳香 没药 荆芥 防风 蝉蜕 花粉 栀子各30g 僵蚕 香附各20g 木香 桔梗各15g 大黄25g 甘草10g 为末，开水冲调，候温灌服。功能补气血，托毒护心，行气祛瘀，消肿止痛。主治牛下颌黄，胸黄。

古矿灰散

出自《中兽医治疗学》。老石灰250g 芒硝60g 冰片15g 为细末，醋调，敷于患处。功能消肿止痛。主治牛锁口黄，口角肿痛。

三毒膏

南京军区验方，见于《中兽医方剂大全》。蜈蚣20条 全蝎50个 天南星30g 没药15g 鱼石脂120g 凡士林180g 前4味共为细末，加后2味药调成膏，每用适量涂于患处。功能攻毒散痈。主治牛放线菌病。

拔毒生肌散

出自《全国中兽医经验选编》。松香30g 蜂蜡9g 生石膏60g 赤石脂60g 五倍子45g 滑石30g 冰片12g 为细末，调生桐油外敷患处。功能拔毒生肌。主治牛背疮。

当归醋浸液

出自《中兽医医药杂志》1986年第5期。当归2000g放入4000ml食醋中浸泡48小时。在9月中旬、10月上旬给牛的背部两侧各涂擦一次。大牛每次用浸液150ml，小牛用80ml，以浸湿被毛和皮肤为度。功能驱虫杀虫。用于防治牛皮蝇蚋病。

本方受《串雅兽医方》启示而拟，用牦牛试验结果表明有效率达97.97%，保护率达93.33%。

加味三品一条枪

出自《中兽医方药应用选编》。白砒50g 明矾100g 雄黄10g 乳香10g 樟脑粉3g 冰片3g 将白砒、明矾研细放入瓦罐内，用炭火煅至青烟尽、白烟起，约至上下通红时住火，放置24小时取出，再加雄黄、乳香、樟脑、冰片研细末，用糨糊或蜂蜜调和，搓成筷头粗的药条或枣核大药丸，阴干备用。用法：局部切开排脓清创后，塞入一丸，如切口不大可用药棉花塞紧封盖创口，如切口较大则需缝合一、两针。功能提毒去腐。主治牛瘰癧。

瘰癧，民间俗称鼠疮，上颌、下颌、颈项、耳前或耳后局部肿硬，形似肿瘤。皮肤破溃，流出脓汁，形成瘰管，经久不愈。用此方治疗一般病灶填药后的脱落时间，水牛20~30天，黄牛则需要更长，冬天较夏天时间为长。该方有较强的腐蚀作用，应用时必须严格控制用量，以免蚀之太过，难以收口。

渴龙奔江丹

出自《中兽医医药杂志》1987年第3期。信石 雄黄各2g 轻粉1g 飞罗面4g 为细

末，制成沙枣核大的丸剂。用大宽针在肿处上侧向下刺入 3~4cm(不刺透整个肿块)，用 1% 高锰酸钾水冲洗后，放入 1~2 丸。功能腐脱肿瘤。主治牛放线菌肿。

肌肉组织上的菌肿，有鸡蛋到拳头大，或更大一些，放药 1~2 次，每次 1~2 粒，可在 25 天左右干裂脱落。骨组织上的菌肿，使骨质疏松，成为疏松性骨炎。肿胀坚硬，形状大小不等。需多次在不同位置上放药，一处放药干裂后，再在另一处放药。此药丸毒性强，放药后局部发生短时间的肿胀。在头部菌肿上用药后，肿胀对食欲有一定的影响。

据白云生报道，用本品治疗牛咽部、下颌部、颈部等处放线菌肿 153 例，其中用药 1 次治愈 81 例，2 次治愈 27 例，3 次治愈 14 例，共治愈 122 例。

旋覆膏

出自《中兽医方药应用选编》。旋覆花 30~40g 白糖 40~50g 先将白糖放在锅内加水 150~250ml 煎沸，再将旋覆花研末加入，边煮边搅拌，熬成糊状即可(若加入少量麝香更好)。用时将药膏摊在消毒纱布上，包敷于已洗净的创面，然后扎紧，2~4 天换药 1 次。功能粘附续筋，润肤生肌。主治耕牛筋腱不完全断裂。

该方系由治人断筋的验方移植而来。方中旋覆花外用有“祛湿、拔毒、消肿”之效，配白糖，有利于断裂筋腱的再生与恢复。

虎杖煎

出自《中国兽医杂志》1986 年第 11 期。鲜虎杖根(洗净去须)2 500g 陈茶叶 100g 冰片 20g 虎杖捣烂，茶叶加 5 000ml 水煎 20 分钟，搅拌，候凉过滤，加入冰片。患部洗净后，用软毛刷蘸药液涂于创面，每天涂 10~20 次，以保持创面湿润。功能清热解毒。主治牛烧伤。

烫火散

出自《浙江省猪牛中兽医诊疗经验汇编》，原无方名。地榆粉 500g 生大黄 30g 研末过 60 目筛，加植物油 500~1 000g 调匀，涂患处。功能清热解毒，防腐生肌。主治牛烫火伤。

一扫光

出自《中兽医诊疗经验》第 4 集。硫黄 120g 雄黄 30g 枯矾 60g 为细末，桐油调搽。功能杀虫灭疥。主治牛疥癣。

蚤休汤

出自《兽医验方新编》，原无方名。蚤休根 21g 青木香 徐长卿各 60g 半边莲 马齿苋各 90g 煎汤去渣，候温灌服。功能清热解毒。主治牛、羊毒蛇咬伤。

据该书记载，取七叶一枝花(即蚤休)、半边莲、八角莲、山海螺、田基黄、白花蛇舌草、香茶菜、徐长卿、杠板归、地丁草、青木香、东风菜等鲜品，一种或数种，洗净捣碎，取汁外敷或内服，对毒蛇咬伤均有一定防治作用。

半边莲煎

出自《中兽医医药杂志》1997年第3期。(1)半边莲 100g 炒五灵脂 60g 蚤休根 20g 半枝莲 70g 白花蛇舌草 70g 水煎，加白酒 150ml 灌服，每日 2 次。功能解毒消肿，化瘀止痛。主治牛血液毒素型毒蛇咬伤。(2)半边莲 100g 独角莲 60g 徐长卿 50g 马齿苋 150g 紫花地丁 70g 用法同上。功能解毒镇惊，消肿止痛。主治牛神经毒素型毒蛇咬伤。

同时处理伤口，并外用半边莲散(半边莲 50g 雄黄 30g 明矾 30g 冰片 15g 为末)，白酒调糊涂患处，每日 2 次。

蛇床木鳖散

内蒙古自治区磴口县验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。蛇床子 木鳖子各 10g 丝瓜壳灰 荞麦秸灰各 50g 为细末，擦于患处。功能杀虫止痒。主治骆驼生癞皮。

雄黄艾叶烟

出自甘肃农业大学主编《中兽医学》，原无方名。艾绒 500g 雄黄 120g 烟叶 250g 为末，做成 4 个药条。患驼牵至室内，密闭，头伸于外，点燃药条熏之，至股内侧出汗为度；隔 3 小时再熏 1 次，熏 3~4 次即可止痒，以后骚痴逐渐脱落而愈。功能灭骚止痒。主治骆驼大骚病，奇痒。

驱鼻蝇液

出自《藏兽医经验选编》，原无方名。大狼毒子和根各 23g 贯仲 60g 野葱 25g 马蔺子 120g 螺蛳 90g 结血蒿 500g 花椒 600g 防风 500g 将上药稍碾，盛入干净锅内加水 10 200ml，烧开后微火再熬 3 小时，放置冷处 24 小时，过滤灭菌。在患羊每边角的前外侧，角与皮肤交界处的上方 1~2cm(大羊约 2cm、小羊约 1cm)处剪毛消毒，用兽医针灸三棱针自上而下钻一斜眼，注意钻过角质后，其质地较软，应细心，不能出血，直至钻完较软的角质后为止。大羊每边角根注射 3ml，小羊 1.5ml，徐缓注入。功能清热除湿，杀虫消积。主治羊鼻蝇幼虫病。

对比试验表明，该中草药方注射液的效果优于注射 10%敌百虫溶液或 10%来苏儿溶液。结血蒿为菊科蒿属，功能滋阴降火，驱风止痒。野葱为百合科葱属，功能散寒消肿，健脾开胃。

复方红花杜鹃液

出自《中兽医医药杂志》1985年第3期。鲜红花杜鹃叶 1 500g 白花刺参 地胆草各 350g 将白花刺参、地胆草置于铝锅中，加常水 7 000ml。文火煎煮 2.5 小时，多层纱布过滤，将药液浓缩至 800ml。为使药液在肌肉注射时不引起肿胀、发炎、疼痛等副作用，调药液 pH=5，加 4 个新鲜鸡蛋清配成的 50%稀蛋清，搅匀加热，过量蛋清凝固，除去鞣质等杂质，用 4 层白绸过滤，得透明药液 700ml。将鲜红花杜鹃叶置于蒸馏器中，加常水 7 500ml，浸泡 3 小时后加热蒸馏，取蒸馏液 1 500ml。混合两种药液，调 pH6~7，四层滤纸过滤，装瓶，蒸气消毒 1 小时，密封备用。注射液每毫升含生药 1g。绵羊按每公斤体重 1ml，分成两份在气管两侧注射或颈部肌肉注射。功能清热杀虫。主治绵羊肺线虫病。

试验表明，气管注射 8 天后镜检，幼虫减少率为 89.35%，驱虫率为 95.7%。

南瓜子散

出自《羊病防治》，原无方名。南瓜子 30g 贯众 9g 槟榔 鹤虱 苏木各 6g 为细末，开水冲调，候温灌服。功能驱虫。主治羊绦虫病。

苦楝驱虫散

出自《藏兽医经验选编》，原无方名。花椒 6~9g 苦楝子 12~24g 贯仲 9~15g 为末，水调空腹灌服，日服 1 次，连服 4 次。功能杀虫消积，燥湿散瘀。主治绵羊肠道线虫病。

苏贯槟榔散

出自《羊病防治》，原无方名。苏木 15g 贯众 9g 槟榔 12g 水煎去渣，加白酒 60ml 灌服。功能杀虫。主治羊肝蛭病。

烟石硫浴液

出自《中兽医医药杂志》1990 年第 1 期，原名烟石硫合剂。烟叶 1 000g 生石灰 2 000g 硫黄 3 000g 置铁锅中加水 20kg 煮沸，煎熬至深棕色，以竹筛加纱布过滤，除去粗渣，所得滤液为原液。使用时 1 份原液加温水 20 份。羊剪毛后及时洗浴，每年 3~4 次。药液应保持 20~30℃。当药液减少 1 / 3 时，应及时添加与消耗等量的药液，以保持药液浓度与药量。功能杀虫解毒。主治羊螨病。

9 医杂病方

归芪益母汤

出自《牛经备要医方》。黄芪三两 益母草二两 当归一两 水煎去渣，候温灌服。功能益气补血。主治牛无力，气血俱虚，疲倦多眠。

本方是由当归补血汤加益母草而成。

起膘散

出自《大武经》，原无方名。杜仲 25g 破故纸 30g 党参 30g 阿胶 25g 当归 30g 白芷 20g 生地 25g 熟地 30g 甘草 20g 为末，引黄豆、糯米糟、白酒、猪油，开水冲调，候温灌服。功能补气血，益肝肾。主治牛劳伤羸瘦。

肥牛胖马膏

出自《中兽医诊疗经验》第 4 集。灵枣(去皮核)250g 钩藤 90g 糯米 700g 蜂蜜 125g 猪大肠 1 具 以上各药装入肠内，炖熟后切碎，碾烂如泥，兑汤分灌。功能益气壮膘。主治牛、马劳伤草慢。

原著云：将猪肠改为猪肚，并加苦参、牡蛎各 90g 效果更好。

残牛催肥散

四川省忠县验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。苦参 95g 黄荆子 135g 松针

130g 苦参炒黄，与其余二味共为末，开水冲调，候温灌服。每日 1 剂，连用 10 剂。功能增重催肥。用于老残牛催肥；亦可用于猪、羊。

百部酒

出自《中兽医治疗学》，原无方名。百部 60g 烧酒 1 000g 百部浸泡于烧酒内，24 小时后滤出百部，药酒搽于患处。功能杀虫。主治牛虱。

据《常用中药学》记载：百部制成 20% 的醇浸液，或 50% 水煎液外用，对人、畜的头虱、体虱、阴虱及虱卵具有强力的杀灭力。

阉牛液

出自《中国兽医杂志》1982 年第 3 期，原无方名。野棉花 500g 草乌 50g 毛茛 50g 10% 氯化钙注射液 50ml 取前三味鲜品，洗净，切碎，加水 850ml 煎煮，过滤，得药液约 500ml，加 95% 酒精 300ml，沉淀，回收酒精，加 10% 氯化钙，再加蒸馏水 500ml，过滤，分装，消毒。局部消毒后，用注射器将药液注入睾丸实质中，每辜 10ml。功能缩辜去势。用于公牛去势。

据报道，用此液去势公牛 499 头，12 头发生食欲减少等反应。263 头去势完全，228 头去势不完全，8 头未产生去势作用。

忍冬藤煎

出自《中兽医学杂志》1990 年第 1 期。忍冬藤 50g 甘草 50g 蒲公英 50g 生大黄 100g 木通 钩藤 黄柏 芒硝各 30g 炒栀子 连翘 牡丹皮 陈皮 酒芩各 25g 水煎服。据报道用本方治青杠叶中毒病牛 39 例，治愈 37 例。

【医猪方】

1 催肥保健方

麻盐肥猪羹

出自《淮南子毕万术》，原无方名。火麻仁三升 食盐一升共捣碎，和米糠三斗，拌匀，混入饲料内喂猪(每日 30~50g)，功能润燥滑肠，补虚壮膘，用作猪增重催肥饲料添加剂。

原名“麻盐肥豚豕法。”曰：“取麻子三升，捣千余杵，煮为羹。以盐一升著中，和以糠三斛，饲豚则肥也。”

催肥散

出自《豳风广义》，原无方名。贯众 90g 苍术 120g 炒黄豆 5 000g 芝麻炒 500g 为末，每日 30~50g，拌入食内饲喂，功能驱虫除湿，养营催膘。用作猪饲料添加剂。

原方另曰：“食后每猪再喂大麦一升，不过半月即肥。”若以驱虫为主要目的，应加大贯众用量。《三农纪》引该方为贯众 1.5kg，《活兽慈舟》引该方为贯众 0.5kg。贯众有毒，孕畜慎用，以防流产。

肥猪散

出自《卫济余编》，《中华人民共和国兽药典》(2000 年版) 记载本方。绵马贯众 何首乌(制) 各 30g 麦芽 黄豆(炒) 各 500g 为末，加盐 30g 混匀，每日混饲喂 100g。功能驱虫、开胃，补养，催肥。主治猪食少，瘦弱，虫积，生长缓慢。

原称肥猪方，有一定的驱虫、育肥作用。本方是针对猪生长育肥缓慢的常见原因，采用扶正与祛邪相结合的方法，选用上述药物组成的攻补兼施的混饲药剂。方中何首乌、黄豆扶正补气加强营养；贯众驱虫避疫；麦芽消积导滞。此四味药，寓消于补，扶正祛邪，共奏加快育肥、促进猪只生长之功效。

壮膘散

出自《活兽慈舟》，原名壮膘添肉方。胡麻 500g 酒曲 120g 食盐 250g 陈皮 500g 砂仁 30g 为末。每日 30~50g，混入饲料中喂猪，功能开胃起膘。脾胃虚寒、运化无力，是动物生长发育不良的原因之一。本方除适当加强营养，还给以开胃健脾药物，可用作猪饲料添加剂。

肥猪菜

出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。白芍 前胡 陈皮 滑石 碳酸氢钠各等分，为末。每次 25~50g，开水冲调，候温灌服，或混饲喂服，功能健脾开胃。主治猪消化不良，食欲减退。

肥猪菜是民间常用成方，具有开胃进食、促进增长的作用。但不同地区生产的肥猪菜处方不尽相同。本方是重庆市验方，在四川省已有四家兽药厂根据地方标准生产。《广东省兽药暂行质量标准》中的肥猪菜组成有所不同：白芍 陈皮 天香炉 小苏打 滑石粉 各等份为末，10~25kg 体重的猪每次拌饲喂服 30g，5~10kg 体重的猪每次 10~20g。功能化滞利便。主治猪食欲不振。

复方一年蓬散

江苏省农业科学院畜牧兽医研究所验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。一年蓬 80g 陈皮 10g 女贞子 10g 为细末。以 3% 的比例混饲喂服。功能开胃进食，增重催肥。据试验，本方喂猪，增重提高 8% 以上，饲料转化率提高 11.7%。本方用于促进猪的生长和育肥，亦可添加于母猪饲料中，预防仔猪下痢。

钩吻散

出自《兽用中草药剂的制备与剂型改革》。钩吻 洗净晒干，粉碎成细末，按每公斤体重 2g 剂量拌饲，亦可作煎剂服，连用 7~10 天，功能行血散瘀，消肿止痛，开胃进食，杀虫扶壮。主治僵猪，用于催肥。

钩吻为马钱科植物胡蔓藤，亦名断肠草，味辛、性温，全草有剧毒，根、嫩芽有毒，全株所含有毒生物碱为其主要毒性成分。本植物在我国历代本草中均列为毒品，一般不作药用。采集加工时谨防中毒。但猪、羊对钩吻有很高的耐毒力，食其叶可增肥、防瘟，令毛泽光润。

《本草纲目》曾谓：断肠草，人误食其叶者致死，而羊食其则大肥。经试验和临床应用证明，即使第1天用30g煎汤喂21kg重的猪，并逐日递增30g，直至日服240g，连喂8天，未见中毒反应，反而食欲旺盛，生长良好，膘肥体壮。

钩吻也可与其他药物配成复方使用。如《兽用中草药剂的制备与剂型改革》中的肥猪散。

僵猪散

山西省清徐县验方，见于《中兽医方剂大全》。生牡蛎10g 芒硝10g 山楂10g 食盐5g 麦芽5g 君子仁3g 为末，混于饲料内喂服，5~10kg猪5~10g，功能健脾开胃，催肥。主治僵猪。

复壮散

出自《畜禽疾病防治法精选》。陈皮 枳实 厚朴 大黄 甘草 苍术 磷酸氢钙干酵母各500g 喹乙醇5g 磺胺胍氯化钴 硫酸亚铁氯化锌各2g 亚硒酸钠0.1g 硫酸铜 硫酸镁 碘化钾各5g 炙马钱子4g 为极细末，混匀，每次1~2g，每天2次，混饲喂服，功能健脾开胃，补充微量元素，促进生长。主治僵猪。

2 医时疫寒热方

十神散

出自《和剂局方》，见于《猪经大全》。葛根 升麻 陈皮 甘草 川芎 紫苏 白芷 赤芍 麻黄 香附 生姜 葱白 煎水灌服，功能发汗散寒，理气解肌。主治猪时行感冒。

时行感冒，即流行性感冒。此病流行有一定的季节性，以冬春季节较多，也叫时行症。猪患此病，耳鼻微凉，被毛逆立，恶寒发抖，喜卧懒动，食欲下降，鼻流清涕，咳嗽气促，口色白润，苔薄白，脉浮紧，若治疗不及时，可发展到食欲废绝、便于尿黄、口色干红、苔黄燥、脉象洪数。方中麻黄发汗解表、宣肺平喘，紫苏、白芷、姜、葱表散风寒为主药；升麻、葛根解肌透疹，助主药驱邪外出，陈皮、香附理气行滞，赤芍、甘草解毒和营。故总括全方，适用于寒邪在表未解而有入里内传阳明之势的外感病。

清热散

出自《中华人民共和国兽药典》(2000年版)。大青叶60g 板蓝根60g 石膏60g 大黄30g 玄明粉60g 粉碎、过筛、混匀即得。每猪每日拌料饲喂30~60g。功能清热解毒、泻火通便，主治猪发热，粪干。

经吉林省家畜疫病防治研究所验证，对于猪的流行性感冒等外感发热，口渴、粪干、食欲不振者，有良好疗效。粪便不干者，可去大黄、芒硝，加焦三仙、青皮、陈皮；气喘者，加百部、百合。

本方为猪发热所设。猪的发热常伴有粪便燥结，即热结胃肠或阳明腑证，按理应以大承气汤治之。但大承气汤泻下通便之力有余而清热解毒之功不足。本方中大青叶、板蓝根清热

解毒。生石膏善解阳明之热，大黄、芒硝泻热通便，诸药合用，清热泻火之功卓著。原方验证结果，43头高热病猪中37头治愈。

感冒汤

出自《全国兽医中草药制剂经验选编》。羌活 10g 白芷 10g 防风 10g 川芎 6g 细辛 3g 苍术 10g 桔梗 6g 紫苏 6g 黄芩 6g 荆芥 6g 甘草 3g 其中羌活、白芷、防风、川芎、苍术、桔梗、黄芩、甘草先煎 10 分钟，细辛、荆芥、紫苏后下，再煎 10~20 分钟。煎两次，去渣取液，一次服用。功能祛风解表。主治猪感冒。

复方柴胡注射液

出自《中兽医方药应用选编》。柴胡 750g 细辛 500g 独活 250g 用蒸馏法制成灭菌注射液 1 600ml。按猪体重每 30~50kg 肌注 10ml，50kg 体重以上酌加剂量。功能解表退热，祛风止痛。主治猪感冒。

《猪病防治手册》中载复方柴胡注射液为：柴胡 3 000g 虎杖 1 000g 防风 500g 苏叶 500g 薄荷 500g 将上药切成薄片或磨成粗粉，水浸 2 小时，加水适量，蒸馏，收集馏液 6 000ml。再蒸馏，收集馏液 3 000ml。加 25.5g 氯化钠、15ml 吐温—80，搅拌至溶解，用 10% 火碱液调 pH 至 6~7，精滤，封装，流通蒸汽灭菌 30 分钟。小猪 2~3ml；中等猪 5~10ml；大猪 15~20ml。肌肉或皮下注射，每日 2 次，连用 2 日。

苦木制剂

出自《中兽医学杂志》1995 年第 4 期。苦木树根饮片(干品) 去杂洗净，放入锅内，加水浸过药面，煎煮 1 小时。粗滤，药渣再加水煎煮 1 次。滤去渣，合并 2 次药液，浓缩。加 20% 石灰乳充分搅拌，调 pH 值至 12，静置过夜。用虹吸法吸取上清液，再加 20% 硫酸铜调 pH 值至 5~6，静置 1~2 天。中速滤纸过滤，滤液加 10% 氢氧化钠调 pH 值至 7，浓缩或加蒸馏水至每毫升药液含生药 0.5g，过滤，分装，灭菌，备用。肌肉注射，45kg 重的猪用药 20ml。I 临床证明，本制剂治疗猪感冒、无名高热、中暑等有效，尤其是治疗感冒，有效率 98% 以上。

抗菌灵注射液

出自《中兽医学杂志》1992 年第 2 期。鱼腥草 筋骨草各 300g 青蒿 蒲公英各 200g 洗净切碎，加水蒸馏，约得蒸馏液 2 000ml，再重蒸馏 1 次，收取重蒸馏液约 850ml。余液与药渣煮沸 30 分钟取汁，药渣再加水 1 000ml，煮沸 30 分钟，取过滤液。合并 2 次煎液浓缩至 200ml。加 95% 乙醇 500ml 静置 24 小时，过滤，回收乙醇，呈稠膏状。然后加入蒸馏液，搅拌均匀后，冷藏 24 小时，过滤，调 pH5.5，加入吐温—80 和苯甲醇各 10ml，并加蒸馏水至 1 000ml，过滤，灌封，印字，灭菌，即成含生药 1g / ml 的注射液。肌肉注射 5~30ml。治疗猪风热感冒 335 例，治愈 328 例。治疗肺炎及气管炎 153 例，治愈 146 例。

嵌药

出自《中兽医学杂志》1991 年第 3 期。白砒 10g 细辛 瓜蒌 皂角各 25g 胡椒 20g

为极细末，装瓶备用。在病猪耳背面中下部皮下，避开血管，用宽针向下作一长 1~2cm 的袋形创口，嵌入药末 0.05~0.1g，手压创口，轻揉几下。一般次日嵌药部位开始肿胀，第 3 日肿胀加剧，用宽针刺破，使血水流出，创口涂以桐油或醋即可。功能攻毒泻热。主治猪发热。

对抗菌素不效的热证，该药多能收到满意疗效。嵌药后术部肿胀迅速、肿胀大者康复快，不肿或肿胀慢者效果较差。

曾以本方治疗 4 头架子猪。病猪精神不振、喜卧、鼻镜干燥、结膜潮红、粪干并时而带血、体温 41.5℃，他处用青霉素等治疗 3 日无效。按本方治疗后，次日体温降至 40.5℃，第三日体温恢复正常，开始进食，第四日全部康复。

阿石枣汤

出自《中兽医医药杂志》1984 年第 4 期。生石膏 60g(捣细先煎半小时) 生姜 21g 大枣 30g 甘草 21g 煎 15 分钟，去渣。取 7 克阿司匹林研细，用上述药液溶化。猪一次胃管灌服。功能发汗解表，清热散寒。主治猪寒包火症(重症感冒)。

本方发汗力强，适用于外感风寒，对内有郁热的表里俱实者，用之不当易产生不良后果。表里俱虚者禁用本方，否则大汗亡阳。即使药证相符，亦须得汗即止，以免发汗过度。发汗过度时可用米粉、龙骨、牡蛎粉涂身止汗。兼有粪结时，方中加大黄、芒硝。

三石散

黑龙江省验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。芒硝 60g 滑石 30g 石膏 30g 为末，拌饲或水调灌服，功能清热泻火，利尿。主治猪发热，便干，尿黄。

灭弓汤

出自《中兽医方药应用选编》。常山 10g 槟榔 7g 柴胡 6g 麻黄 5g 甘草 5g 桔梗 6g 常山、槟榔先用文火煮 20 分钟，再加入柴胡、桔梗、甘草同煎 15 分钟，最后放入麻黄煎 5 分钟，去渣候温，用胃管投服。可视病情每天服药 1~2 剂(若服 2 剂，每剂可合并头、二煎一次投服)，连服 2~3 天。功能退热杀虫。主治猪弓形虫病。

江苏省泗阳县畜牧兽医站 1985—1986 年治疗阳性猪 53 例，康复 51 例。后又用猪接种活虫体人工发病的方法(弓形体虫株由江苏省农科院畜牧兽医研究所提供)进行试验，结果：治疗试验组 6 头猪，分别用药 2~3 日后，逐步康复。未经治疗的对照组 2 头猪则先后死亡，经剖检呈现弓形体病猪的典型病理变化。江苏省中西兽医结合研究会曾组织对灭弓汤验证试验，人工接种强毒虫株于架子猪 10 头发生典型弓形体病，应用中药灭弓汤治疗 5 头的试验组，其平均体温一直维持在 41℃ 以下，呼吸与体温反应分别于治疗后第 3 天、第 7 天恢复正常，无废食，无死亡。未予治疗的 5 头对照组，其体温一直较治疗组高 0.5~1.0℃，体温、呼吸等临床症状和食欲的恢复分别较治疗组推迟 3~5 天，死亡 1 头。结果表明中药灭弓汤对弓形体在猪体内的增殖有一定程度的抑制作用。

根据《中药大辞典》记载：狗口服常山水浸膏或肌注射醇浸膏或皮下注射常山碱甲，可致

恶心、呕吐、腹泻及胃肠粘膜充血、出血；过量槟榔碱可引起流涎、呕吐。故临床使用应掌握常山、槟榔的用法、用量，并且应在用药半小时后再饲喂食物，以免因发生呕吐而影响药效。

复方鱼腥草注射液

出自《全国兽用中草药制剂经验选编》。鱼腥草 2 000g 前胡 1 000g 马兜铃 500g 生半夏 500g，洗净切碎后装入蒸馏瓶内，加水适量，浸泡，蒸馏收集蒸馏液 4 000ml，然后将蒸馏液重蒸馏收集重蒸馏液 2 000ml，加入 16g 氯化钠调节渗透压，精滤，封装，灭菌。每毫升相当生药 2g，每支 5ml。功能清热解毒、利水消肿。可用于呼吸道感染引起的急性炎症，特别适用于肺炎咳嗽、喘气病。用量：小猪 2~4ml，中等猪 5~10ml 大猪，15~20ml。肌注，一日 2 次，连用 2~3 天。

复方青蒿注射液

出自《中兽医医药杂志》1994 年第 5 期。青蒿籽 40% 香蒿 20% 藿香 20% 佩兰 10% 薄荷 10% 去除杂质，混合，用蒸馏水制取注射液（《农村中草药制剂技术》，广州市药品检验所编）。每毫升含生药 5g，分装于安瓿内，高压灭菌，避光保存备用。肌肉注射。30kg 重以下的猪 20~40ml；30~50kg 的猪 50~60ml；50~100kg 的猪 70ml。

据报道，用此注射液治疗猪中暑 1 517 例，除 87 例因各种原因死亡、38 例诊断不明确治疗无效外，其余 1 392 例全部治愈。

3 医心肺病方

朱砂心血丸

出自《直指方》，见于《猪经大全》。朱砂 6g(水飞) 猪心血调一杯服之。功能镇惊解毒，活血消肿。主治猪肿心子症。

猪肿心子症是猪心脏肿大、扩张、心肌肥厚的一类疾病。主要由于心阳不振、水气上逆或瘀血内阻而致气血运行不畅，水气内停，郁结于心引起。症见四肢不温、恶寒发抖、口色晦暗、舌苔薄白、眼目发紫、小便短少、水肿、脉细数。死后解剖，可见心脏肿大。方中朱砂味甘性寒，诸家本草都只认为有镇惊安神、解毒的作用。《名医别录》中认为有通血脉的作用。猪心血性寒而解毒，此方用猪心血，以其能引药入心经，取其以心归心，以血导血之意。病猪心脏是否肿大，除非解剖，较难判断。如临床上见到方解中所述症状，可试用本方治疗。

朱砂是汞的硫化物，但非纯品。《神农本草经》列为上品，并注明能化汞。汞制剂能使外周血管扩张，消除血行障碍，引血下行，消除头部充血，有通血脉的作用。内服此药吸收后，经肾脏排出体外，排出时能刺激肾脏，扩张血管，增加泌尿，这是汞制剂能利尿的原因。服此药可治心性水肿，但对肾脏有刺激，故肾性水肿不宜使用。汞制剂能蓄积于体内，久服、

多服易引起中毒，一般用药后须间隔三天以上才能再用。

丹皮地黄汤

出自《中兽医医药杂志》1990年第6期。丹皮 生地黄 黄芩 栀子各30g 蝉蜕 茯神 远志 赤小豆各15g 天竺黄 钩藤各10g 甘草5g。水煎2次，合并药液，体重50kg以上猪分3次灌服，可按病猪大小、体质和精神状态适当增减。功能清热凉血，熄风安神，化痰利湿。主治猪李氏杆菌病。

加减法：对头嘴着地、眼睛红肿者加菊花、草决明各15g；粪便燥结者加大黄30g 芒硝15g 木通20g；怀孕者加杜仲20g 艾叶10g。

活喉蜜

出自《猪经大全》，原无方名。青黛 薄荷 共研末，加蜂蜜和成药饼。塞猪口内，以待药慢化并咽下。功能清热消肿，利咽化痰。主治猪喉闭不能张声(因咽喉炎引起的喉头麻痹)。

患猪喉闭时，由于喉头水肿而叫声嘶哑或叫不出声。严重时张口出气、呼吸困难，可于短期内窒息死亡。方中青黛性寒味咸，能清热凉血、消肿解毒；薄荷性凉味辛，能疏散风热、化痰利水、消肿止痛；蜂蜜味甘性寒，能润燥止咳、通便解毒。三药共研，制成饼状塞入猪口内慢慢化下，可直达患处，清利咽喉，消除肿胀。

复方蒲公英注射液

出自《猪病防治手册》。蒲公英200g 知母100g 板蓝根100g 紫花地丁200g 生石膏100g 射干200g 山豆根100g 吐温—80 5ml 苯甲醇10ml 药材洗净切碎，加水浸泡煎煮3次，每次各煮沸1小时。用纱布过滤，3次滤液合并并浓缩至800ml，放冷，加95%乙醇，使醇含量达70%，搅匀后静置24小时，过滤。沉淀物用少量乙醇冲洗，滤液与冲洗液合并，再加乙醇达含醇量80%，放置过夜，多次过滤，最后回收乙醇至无醇味，所得浓缩液加注射用水稀释至900ml，加1%活性炭煮沸10分钟，放冷，过滤。滤液加苯甲醇和吐温—80，混匀，并加注射用水至1000ml。过滤至澄清，灌封，灭菌即得。本品相当生药1g/ml。肌肉注射，1日2次。小、中猪每次5~10ml；大猪每次10~20ml。功能清热解毒，消肿利咽。主治猪咽喉炎。

蒲紫注射液

出自《猪病防治手册》。蒲公英400g 紫花地丁300g 柴胡300g 薄荷100g 苏叶100g 吐温—80 10ml 苯甲醇10ml①取紫花地丁、蒲公英洗净切碎，加水浸泡煎煮2次，每次1小时，用纱布过滤，2次滤液合并并浓缩至400ml，放冷后加95%乙醇使药液含醇量达60%，搅拌，放置24~48小时，过滤，滤液再加95%乙醇使药液含醇量达80%，放置过夜，过滤，回收乙醇至无醇味。②将柴胡、薄荷、苏叶粉碎，加水2250ml，用蒸馏器蒸馏，收集蒸馏液800ml，再将蒸馏液重蒸馏1次，收集重蒸馏液500ml。③将蒸馏液与水提取液合并，加入苯甲醇和吐温—80，混匀，加注射用水至1000ml，过滤至澄清，灌封，灭菌即得。本品

生药含量相当 1.2g / ml。肌肉注射，每日 1~2 次，每次 5~20ml。功能解表清热，利咽消肿。主治猪咽喉炎。

二陈青龙汤加减

出自《中兽医医药杂志》1990 年第 6 期。法半夏 橘皮 瓜蒌 杏仁 厚朴各 12g 麻黄 9g 云苓 五味子各 15g 共为细末，分 4 次拌料喂服，日服 2 次。功能辛温解表，宣肺平喘。主治咳嗽。

咳嗽是上呼吸道疾病的主要症状，常见于咽喉炎、支气管炎和肺炎等。临床上除咳嗽外多伴有流鼻涕，呼吸困难，减食和不定热型为特征。依病因和症状分风寒、风热和气虚三种证型。本方适用于风寒咳嗽。据报道，用此方治疗猪寒喘症 10 例，疗效颇佳。

风热咳嗽可选用：(1)清肺散加减 出自《兽医验方新编》，原无方名。贝母 葶苈子 板蓝根 茯苓各 30g 桔梗 24g 生甘草 山栀子 黄芩各 18g 共为细末，开水冲调，候温灌服。(2)清肺止咳散出自《四川省中兽医诊疗经验集锦》，原无方名。金银花 10g 连翘 10g 栀子 6g 荆芥 10g 薄荷 10g 牛蒡子 10g 杏仁 10g 桔梗 10g 前胡 10g 瓜蒌 10g 石膏 12g 甘草 3g 桑白皮 12g 煎汤内服。(3)通光散 出自《云南中草药选》。通关藤 100g 每日每头猪 100g，分早晚 2 次水煎灌服，或用其煎液拌料饲喂。7~10 天为 1 个疗程，一般 1 个疗程即可。本方载于《云南中草药选》，即萝藦科通关藤，味苦、微甘，性凉、无毒。功能清热解毒，消炎止痛，止咳平喘，活血生肌。现代药理研究，通关藤茎中的苦味甙体脂甙，多属肉珊瑚甙元，能松弛气管平滑肌，缓解痉挛。《中兽医医药杂志》1996 年第 3 期报道，先后用本方治疗患猪 358 头，痊愈 280 头，显效 68 头。

气虚咳嗽可用：补肺汤 出自《新编中兽医治疗大全》。党参 10g 黄芪 15g 熟地 15g 五味子 10g 紫菀 10g 桑白皮 10g 煎汤，候温灌服。

公英桔梗汤

出自《全国中兽医经验选编》，重庆畜牧兽医站验方，原无方名。鱼腥草 蒲公英桔梗 水杨柳大青叶 制黄芩肺形草各 40g，煎汤去渣，候温灌服，功能清肺解热，理气止咳。主治猪肺热症。

肺形草，别名双蝴蝶、黄金线(《全国中草药汇编》)。此药为龙胆科植物双蝴蝶的幼嫩全草。功能清热解毒，止咳止血。临床用于治疗支气管炎，肺结核咯血，肺炎，肺脓疡，肾炎，泌尿系感染，疔疮疖肿，乳腺炎，外伤出血。

猪喘素

出自《藏兽医经验选编》。滇独活 麻黄 藏黄连 黄精 松花(各等份) 共研细末为散剂，中等大小猪每次服 30g。功能祛风解表，泻火燥湿，润肺止咳。主治猪喘气病。也可制成针剂(生药 500g、水 10 000ml，浸泡 24 小时后蒸馏，药渣加水 5 000ml 浸泡 12 小时，煮沸，同法再蒸馏一次，加入前液，调整 pH 值，灭菌备用。中等大小猪每次肌注 20ml)。

蟾酥注射液

出自《全国兽医中草药制剂经验选编》。制法：(1)蟾酥粉碎搅匀，以水适量煮沸 1 小时，两层纱布过滤，滤液加甘油 30%，搅匀，过滤，将滤液加注射用水至含蟾酥 0.5%，再按药液体积 0.5% 比加入苯甲醇(每 100ml 加 0.5ml 苯甲醇)，搅拌均匀，过滤，灌封，流通蒸汽灭菌。(2)蟾酥粉碎，稍加蒸馏水浸胀，以适量甲醇回流提取 2~3 次，每次 1 小时，过滤，合并甲醇提取液，减压回收甲醇，浓缩物加适量蒸馏水搅拌均匀，过滤，将滤液置分液漏斗中，以丁醇萃取 3 次，取丁醇液，以 pH2 左右的水萃取 5~10 次(丁醇层回收丁醇)，取水层加 pH2 的酸水稀释至含蟾酥 2% 的浓度，置水浴锅上加热，使丁醇挥发，按药液体积 0.5% 加入苯甲醇，再加适量注射用水至含蟾酥 2% 的浓度，精滤，灌封，灭菌。使每 100 毫升注射液相当蟾酥 0.5~2g。肌肉注射，小猪每次 0.5~1ml，大猪 4~6ml。功能解毒通窍。强心利尿。主治猪喘气病，仔猪白痢，猪细菌性肠炎。

复方苇茎注射液

出自《全国兽医中草药制剂经验选编》。芦苇茎(去节，如用鲜品，取干品的 3 倍量)100g 薏苡仁 100g 冬瓜仁 100g 鱼腥草 100g 桃仁 50g 上药分别粉碎，先将芦苇茎和鱼腥草煎煮 3 次，每次煮沸 15 分钟，过滤，将此滤液再煎煮薏苡仁、冬瓜仁、桃仁，方法同上，过滤，合并 3 次滤液，浓缩至糖浆状，搅拌加入 3 倍量 95% 乙醇，放置 24 小时，过滤，滤液减压回收乙醇，再加 4~5 倍量 95% 乙醇，放置冷处 24 小时，过滤，滤液减压回收乙醇至无醇味，加 4.5ml 吐温-80，加注射用水至 450ml，搅拌均匀，放冷处 24 小时，精滤，灌封，100℃ 灭菌 30 分钟。每毫升药液相当生药 1g。猪肌肉注射 10~20ml，气管注射 5ml，每日 1 次。功能补肺止咳，利水平喘。主治猪喘气病，支气管炎。

据四川省峨眉县农林局报导，有较好疗效。本方由《备急千金要方》载苇茎汤加鱼腥草而成，增加清热解毒之功。

4 医脾胃病方

胃肠活

出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。黄芩 20g 陈皮 20g 青皮 15g 大黄 25g 白术 15g 木通 15g 槟榔 10g 知母 20g 玄明粉 30g 神曲 20g 石菖蒲 15g 乌药 15g 牵牛子 20g 为末，开水冲调，候温灌服，或拌饲服用，功能理气，消食，清热，通便。主治猪消化不良，食欲减少，便秘。

本方适用于胃肠积滞及大便秘结。方中大黄、玄明粉泻下清热，攻积导滞，为主药；槟榔、木通、牵牛子下气利水，消积除满，黄芩、知母清肺胃之热，为辅药；神曲、石菖蒲、白术健脾燥湿，消积化食，助运化，为佐药；青皮、陈皮、乌药理气宽肠，调理脾胃气机。诸药合用，具有通秘结、消积滞、除胀满、清邪热的作用。故本方广泛用于猪的胃肠积滞及大便秘结。对其他动物的消化不良、便秘、胃肠炎等症，均可用本方加减。

健胃散

出自《全国兽医中草药制剂经验选编》。麦芽 30g 龙胆草 60g 干姜 9g 大黄 9g 苍术 6g 苏打粉 6g 为末，拌食饲喂；或开水冲调，胃管投服。猪每次 30~150g，每日 2~3 次。功能健脾燥湿，消食导滞。主治猪消化不良。

中西合方：三仙多酶健胃散 出自《中兽医医药杂志》1988 年第 5 期。含糖胃蛋白酶 20g 胰酶 25g 淀粉酶 25g 焦山楂 焦麦芽 焦神曲各 50g 混合研末，拌料喂服。便秘重者加郁李仁 15~20g；脾胃虚寒者加炒白术 10~15g。体重 50kg 以上大猪每次 50g，中猪 30g，小猪 25g，每日 1 次。用本方治疗猪消化不良症 1 000 余例，收效较为满意。

马钱子注射液

出自《中兽医医药杂志》1987 年第 4 期。马钱子(番木鳖)500g 加水浸泡 30 分钟取出，粗碾，刮去皮，切片。用 95%酒精淹过药面浸泡 48 小时，滤出药渣。再加 95%酒精浸过药面泡 24 小时，过滤。合并 2 次滤液，用滤纸过滤，回收酒精，浓缩药液至 80ml 左右，加蒸馏水至 10 000ml，调 pH 为 7，加 0.5%吐温-80，再加 1%甲醛溶液进行化学消毒(即加 36%甲醛溶液 100ml)，调 pH 为 7，抽滤，分装于高压消毒并烘干的 10ml 安瓿中。肌肉注射。50kg 重以上的大猪 8~10ml，10~25kg 重的小猪 3~5ml。用本注射液治疗猪消化不良症 1 411 例，治愈 1 299 例。

苦参苍术散

出自《中兽医医药杂志》1984 年第 3 期。苦参 3kg 苍术 7.5kg 将苦参水浸 20 小时，煎 3 次，得滤液 4 000ml，再与苍术粉及适量的混合饲料拌匀晾干，即成。此散含生药量：苍术 2g，苦参 5g。也可以按比例制成散剂。每日下午饲喂时给药，每头猪每次在饲料中加入苦参苍术散 5g。

三仙余粮散

出自《中国兽医杂志》2000 年第 2 期，原方无名。神曲 焦山楂 麦芽各 10g 禹余粮 5g 为末冲服或拌料饲喂。10kg 体重的猪每日 1 剂，连用 3 日，功能消食止泻。主治仔猪单纯消化不良性腹泻。

内金消食散

出自《中国兽医杂志》2000 年第 2 期，原方无名。炒鸡内金 茯苓 陈皮 焦山楂 焦槟榔 神曲 麦芽各 30g 为末，拌料饲喂，10kg 体重的仔猪每日 1 剂，连用 3 天。功能消食止泻，主治仔猪伤食腹泻。

《中国兽医秘方大全》中载有一个消食散：神曲 30g 莱菔子 20g 大青盐 50g 碱面 50g 研为细末，装瓶备用。混入饲料中喂服。大猪每次 50g，小猪每次 20g，1 日 2 次。据报道，用此方治疗猪消化不良 1 000 余头，服药 3 天后食欲大增，治愈率在 90%以上。

健猪散

出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。大黄 400g 玄明粉 400g 苦参 100g 陈

皮 100g 粉碎，过筛，混匀，即得。猪 15~30g。功能消食导滞，通便。主治消化不良，粪干便秘。

《畜禽疾病防治法精选》中也有一个健猪散。磷酸氢钙 氯化钠各 10g 苍术 干酵母各 15g 为末，分三次拌料服用。功能健脾开胃、补充钙质，治疗猪缺钙及生长缓慢。

猪健散

出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。龙胆草 30g 苍术 30g 柴胡 10g 干姜 10g 碳酸氢钠 20g 粉碎、过筛，混匀，即得。猪每日拌料饲喂 10~20g。功能消食健胃，主治消化不良。

钩吻末

出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。钩吻 粉碎过筛即得。功能健胃，杀虫。主治消化不良，腹泻，虫积。猪每日 10~30g。怀孕猪慎用。

消食通便散

出自《内蒙古中兽药标准》(1988 年版)。玄明粉 33g 小苏打 27g 食盐 14g 石膏 20g 滑石 6g 为末，混饲或调灌。小猪 10~30g，大猪 50~100g。功能消食开胃，清热化滞。主治猪食积，胃热，粪干。

通便散

出自《活兽慈舟》。地龙(蚯蚓) 五谷根 土大黄共捣碎喂服。猪大便不通可由高热病热灼伤阴造成，方中三药均有清热泻火，利水通便之功，故对猪实热便秘有效。

五谷根，是禾本科植物水稻之根；亦有可能是薏苡根之别名(《分类草药性》)，是禾本科植物薏苡的根。功能清热，利湿，健脾，杀虫。

三黄散

出自《中草药防治猪病》。黄芩 35g 黄柏 35g 大黄 30g 为细末，水调灌服或混饲。50kg 体重猪日服 80~100g；幼猪每 5kg 体重日服 2~5g。功能清热解毒。主治猪秋燥肠热。

大黄巴豆煎

出自《中兽医学杂志》1991 年第 2 期。大黄 150g 巴豆 20g 先将巴豆加水浸泡 60 分钟，再加水至 900ml，煮沸 30 分钟，再加入大黄 150g，继续煮沸 30 分钟，去渣，浓缩至 495ml，加苯甲醇 5ml，共 500ml，即相当于每毫升含生药 0.34g。缓缓深部直肠灌注，小猪每次 5~10ml，大猪每次 10~20ml。功能泻下。主治猪便秘。

据报道，用本方共治疗便秘患猪 120 头，痊愈 112 头，好转 6 头。药理实验表明，本方能使肠道蠕动、分泌增强，而且这种作用不被阿托品所阻断。用药后 30~60 秒即见肠音增强，30 分钟内可排便两次，50 分钟后恢复平静。如未排完，可再灌一次。不得用于怀孕猪；使用时严格控制剂量，两次用药间隔不少于 12 小时，以免脱水、直肠脱、便血等。离体肠管试验表明，本方对增强肠管蠕动作用显著。

复方槟榔栓

出自《辽宁畜牧兽医》1984年第2期，原名复方槟榔蜜箭。槟榔 5g 辣椒 1g 为末，加炼蜜 20g、滑石粉适量，共调，搓成直径 1.5~2cm 的条状。用时表面涂少许植物油，徐徐塞入肛门。功能润肠通便。主治猪便秘。

温中涩肠散

出自《中兽医内科学》，原无方名。制硫黄 15g 制赤石脂 30g 石榴皮 45g 硫黄置去核的红枣中，炭火中烧炭存性，研末，与赤石脂混合，用醋调匀，晒干研末后与石榴皮末混匀。每次 10~15g，开水冲调，候温灌服。功能温中涩肠。主治猪虚寒久泻。

治痢片

出自《全国兽医中草药制剂经验选编》。地锦草 25 000g 硬脂酸镁 35g 取地锦草 3 000g，研细末，过 100 目筛；其余地锦草加水煎煮两次，煎液合并用纱布过滤，浓缩至与生药等量，加 95%乙醇 1.5~2 倍，搅匀，静置 24 小时，吸取上层清液。弃去残渣，回收乙醇，浓缩成浸膏，加入地锦草细末，拌匀，过 20 目筛搓粒，置 60℃以下烘干，候冷，加硬脂酸镁，混匀，压片。每片重 0.35g。每日 3 次，每次 4 片，研末拌饲，或温水调灌，功能清热解毒。主治猪肠炎，痢疾。

香参汤

出自《上海畜牧兽医通讯》1984年第5期。木香 10~25g 苦参 60~125g 早晚水煎服(50kg 猪之用量)。病情严重者，开始每日 1~2 剂，2~3 日后，改每日 1 次。里急后重严重者，加白头翁、秦皮、辣蓼、铁苋、地锦草、马齿苋等；脓血多者，加仙鹤草、墨旱莲、地榆炭、槐花炭等；发热者，加葛根、玄参、生地、麦冬；久泻气血双亏者，加党参、白术、升麻等。用此方治疗猪痢疾 78 例，治愈 75 例。

止痢促长散

出自《中兽医医药杂志》1996年第3期。连翘 蒲公英 白头翁 苦参 龙胆草各 1 份 黄芪 淫羊藿各 1.5 份 白芷 苍术 柴胡 陈皮各 1 份 诸药按比例配合，粉碎为极细末备用。每千克体重 1~2g，重症者每千克体重可用 3g。预防量减半。将上药散剂加 5~10 倍量水，煎后连同药渣喂服或灌服。一般 1 日 1 次，重症者 1 日 2 次。对某些重症腹泻，可加用碳酸氢钠以调整机体酸碱平衡，提高疗效。

本方可用于治疗各种畜禽腹泻症，近年来用此方治疗腹泻病猪 1 235 头，治愈 1 154 头。现代药理研究表明：连翘、蒲公英、白头翁、苦参、龙胆草多能抑杀痢疾杆菌、伤寒杆菌、大肠杆菌、变形杆菌、金黄色葡萄球菌等病原菌；白头翁和苦参尚能抑杀某些病毒、阿米巴原虫及某些滴虫。同时可反射性地促进胃液分泌，增强消化功能。

胃肠灵片

出自《中兽医学杂志》1992年第1期。青牛胆(别名地苦胆、金果榄)3 份 雪胆(别名蛇莲、苦金盆)1 份研末制粒后压片。20kg 重的猪每日 30g，120kg 重的猪每日 60g，分 2 次投服。一般用药 2~4 次。临床上治疗猪胃肠炎 122 例，治愈 101 例，好转 9 例，未愈 7 例，

死亡 5 例。

石榴皮汤

出自《中兽医学杂志》1994 年第 4 期。石榴皮 130g 茴香 生姜 100g 红糖 50g 加水 3 000ml 煎汁，分 4 次灌服或让猪自饮。此方量用于 30~40kg 重的猪。应用本方治疗猪水泻(寒泻)数千例，治愈率达 95%。

复方香叶子注射液

出自《中兽医学杂志》1994 年第 4 期。香叶子(全株，鲜品，秋季采集)70% 云木香(干品)15% 五味子(干品)15% 将云木香、五味子先用冷水浸泡 24 小时，然后加入香叶子(切细)，蒸馏成 1: 1 药液，加苯甲醇 2%，过滤，分装于消毒后的洁净的 10ml 安瓿内，封口，高压消毒，印字备用。肌肉注射。仔猪每头次 5~10ml；架子猪每头次 10~20ml；大猪每头次 20~30ml，每日 2 次，连用 1~2 天。

据报道，用该注射液治疗猪腹泻 273 例，治愈 255 例，好转 11 例，无效 7 例。本制剂的止泻作用随着浓度的提高而增加，病初一般用药 1 次即效；久泻者用药 2~3 次可愈。

蟠龙散

出自《证治准绳》，见于《猪经大全》。地龙蚓 30g 风化硝 60g 为末。见肿消(商陆)、荆芥、生姜、葱白浓煎水洗后，将上药末撒在脱出的肠头上，功能清热消肿。主治猪阳症脱肛(阴虚燥结所致)。

地龙蚓，即蚯蚓，又名蟠龙，故方名为蟠龙散。此处蟠龙用干品。

复方龙骨散

出自《中兽医学杂志》1959 年第 8 期。龙骨 10g 五倍子 10g 黄连 4g 为细末。洗净脱出之直肠，将药均匀撒在肠膜上，整复直肠，同时进行肛门外热敷。功能涩肠固脱。主治猪直肠脱。

贯仲驱蛔散

出自《藏兽医经验选编》，原无方名。贯仲 250g 槟榔 90g 甘松 500g 大黄 250g 为细末，小猪 5~6g，加水灌服，日服 1 次，连服 3 次。功能杀虫消积，行气通便，主治猪蛔虫病。

驱蛔散

河北省定县验方，原方无名。见于《中兽医方剂大全》。槟榔 苦楝皮 大黄 芒硝各 9g，研末冲服。功能杀蛔驱虫，主治猪蛔虫病。

5 医肝肾病方

蝉蜕煎

出自《中国兽医杂志》1991 年第 5 期。蝉蜕 25g 加水 250ml，煎至 125ml 左右，去渣，

候温徐徐灌服，连服 5~7 天。功能熄风止痉，主治猪破伤风。

配合锁口、开关穴针刺，百会穴位注射青霉素 1~2 次，效果更好。本方疗效与剂量有关。初次用药每 50kg 体重用 25~30g 蝉蜕，口噤不开症状可缓解。蝉蜕味甘咸、性寒，能逐风散热、定惊去翳、解毒止痉，是治疗破伤风的良药。本方治疗 6 例病猪，除 1 例牙关紧闭、不能进食而死亡外均痊愈。另外，本方对未查出创口的四肢坚硬、耳竖、尾直、食欲废绝症状同样有效，但对牛的破伤风疗效不确切。

白花散

出自《简要济众方》，见于《猪经大全》。朴硝末 30g 茴香子 20g 捣碎煎水，灌服。功能清热化湿，温肾利水。主治猪尿结症。

尿结是尿液闭结而排不出的一种病证，亦称癃闭或胞转，主要由膀胱气化不利所致。可因前焦肺热气壅、燥热伤津、水道通调受阻，中焦湿热下注膀胱，后焦肾阳不足、命门火衰及外伤等情况而发生。临床常见湿热尿结、肾虚尿结、外伤瘀阻尿结三种证型。本方中朴硝咸寒，清热化湿，软坚破结，能使尿液自肠排出，减轻膀胱负担；茴香味辛性温，健脾开胃，暖腰肾，去膀胱冷气，补命门之火，使肾阳复而水湿自降，故为清除胃肠湿热和温肾并用之方。

《兽医验方新编》中有一类似方，名消石散。芒硝 150g 滑石 50g 茯苓 30g 冬葵子 30g 木通 50g 海金沙 35g 共为末，开水冲调，候温灌服。功能化石利尿。主治尿石症。

加味猪苓汤

出自《兽医科技杂志》1983 年第 11 期。猪苓 45g 茯苓 45g 滑石 45g 桔梗 30g 阿胶 18g(烊化) 每日 1 剂，煎汤，分早晚 2 次灌服。功能清热利尿。主治膀胱炎，尿淋漓。

若尿短淋漓，加马鞭草、玉米须、车前子；尿血加白茅根、茜草炭。用本方治疗母猪急性膀胱炎 13 例，其中 12 例服 1~6 剂痊愈。

鱼腥草注射液

出自《全国兽医中草药制剂经验选编》。干鱼腥草 10 000g 洗净切碎，置蒸馏器中加水蒸馏，蒸馏液重蒸馏 1 次，接取先馏出的 800ml 备用。余液与药渣合并煮沸 30 分钟，过滤，滤液浓缩至 200ml，加乙醇 500ml 处理，滤去沉淀，回收乙醇，得稠膏状物，加先馏出的蒸馏液，搅匀，冷藏 24 小时，过滤，调 pH 至 5~6，加入 1%吐温-80 和 2%苯甲醇，并加注射用水至 1 000ml，过滤，灌封，灭菌。每 1ml 注射液相当于药材 10g。每次 5~15ml，每日 2 次肌肉注射。功能消炎，利尿。主治猪尿道炎，肾炎，子宫炎，乳腺炎，肺炎，气管炎，多发性疖肿。

另外，也可将新鲜的鱼腥草 2 000g 加水 1 000ml，蒸馏，收集馏液 500ml，制成每毫升含生药 4g 的注射液，调节渗透压，封装。肌肉注射，隔日 1 次，5 次为 1 个疗程。5~15kg 的猪每次 5ml，大猪适当加量。

回阳生精汤

出自《中兽医学杂志》1991年第1期。淫羊藿 阳起石各30g 肉苁蓉 菟丝子 续断各25g 杜仲 黄芪 党参各20g 甘草15g 水煎去渣，候温灌服，每日1剂，连用2~3剂。功能温肾壮阳，益气生精。主治公猪弱精，死精症。

方中淫羊藿、阳起石补。肾壮阳为主药，配合肉苁蓉、菟丝子、杜仲、续断补肝肾，助四肢爬跨之力，黄芪、党参、甘草补气健脾，保持公猪元气不衰。应用本方共治验弱精、死精病猪8头，效果确切。如发现血精，可加地榆、仙鹤草、金银花、车前子。

治疗公猪死精症的方剂还有天麻酊：出自《中兽医医药杂志》1994年第2期。天麻125g 淫羊藿100g 五味子75g 杜仲75g 牛膝75g 将上药用50度白酒2500ml浸泡一7天，体重200kg以上的猪每服200ml，200kg以下每服150ml，日服2次。用本方治疗公猪死精症8例。均获痊愈。

壮骨散

出自《中兽医治疗学》。首乌20g 蛤粉15g 石决明15g 牛膝20g 杜仲15g 牡蛎25g 龙骨25g 续断15g 秦艽10g 骨碎补15g 甘草10g 诸药共为细末，分2次拌料喂给。功能温肾壮骨。主治骨软症。

骨软症是因钙、磷比例失调、代谢障碍所致的骨质疏松症。治疗时还应考虑补充维生素D，以促进钙磷的吸收与沉积。

6 医胎产及仔猪病方

催情散

出自《中华人民共和国兽药典》(2000年版)。淫羊藿6g 阳起石(酒淬)6g 当归4g 香附5g 益母草6g 菟丝子5g 粉碎过筛，混匀即得。每头猪每次30~60g，拌料喂给。功能补肾壮阳，催情。主治母猪不发情。

同名方催情散 出自《全国兽医中草药制剂经验选编》。当归 熟地 小茴香各30g 川芎 红花 肉桂 艾叶炭各15g 香附 丹参 益母草各25g 白术 白芍各21g 茯苓18g 为末，每次30~45g，作舔剂或水调灌服。功能活血调经，温肾暖宫。主治母猪宫寒不孕，发情不正常。

杜仲丸

出自《证治准绳》，见于《猪经大全》。杜仲250g(糯米汤浸透炒研细) 续断60g(酒浸) 山药180g，为末，每次用30g，米汤和喂，功能补益安胎。主治母猪胎动不安。

参芪保产安胎汤

出自《中草药防治猪病》。党参15g 黄芪15g 黄芩15g 杜仲15g 白芍15g 菟丝子12g 桑寄生10g 甘草10g 木香10g 煎汤去渣，候温投服，功能补气，和血安胎。主治母猪流产。

本方对安胎保产和流产后母体康复均有一定效果。

另有安胎散 出自《中兽医学杂志》1993 年第 3 期。苏叶 10g 艾叶 白术 黄芩 续断各 15g 水煎为 30%浓度药汁，内服。体虚者加黄芪、党参；血热胎动加白芍；肾虚或腰部损伤加杜仲；阴道流血加阿胶。用此方治疗病猪 246 例，治愈 245 例，随访观察 10 天未见复发。

党参龙牡粉

出自《全国兽医中草药制剂经验选编》，原方无名。党参 120g 龙骨 180g 牡蛎粉 150g 骨粉 500g 为末，每日 400g 拌料饲喂。功能益气壮骨，主治猪产后瘫痪。

《中兽医学杂志》1993 年第 1 期报道用活血顺气汤(党参 防风 木瓜 黄芪 牛膝桑枝各 15g 香附 10g 当归 川芎 杜仲各 12g 山羊的下脚节 2 个 水煎浓汁，米酒为引，混饲内服，每日 1 剂)治疗母猪产后瘫痪 286 例，治愈 281 例，经随访 20 天，未见复发。

归芪通乳散

河北省成安县验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。当归 12g 黄芪 30g 王不留行 60g 通草 10g 为末，混于饲料中喂给，功能补益气血，通络下乳。主治母猪气血亏损，缺乳。

公英散

出自《中兽医治疗学》。蒲公英 15g 银花 12g 连翘 9g 丝瓜络 15g 通草 9g 芙蓉花 9g 穿山甲 6g 共研细末，开水冲调，候温灌服。功能清热解毒，消肿散痈。主治猪乳痈。

方中蒲公英、金银花、连翘、芙蓉花清热解毒、消肿散痈；丝瓜络、通草、穿山甲通络化痰。诸药合用，共奏清热解毒、消肿通络之功。本方为治疗乳痈的良方，凡急性乳腺炎红肿热痛者，可酌情应用。本方也可用于其他动物。

《中华人民共和国兽药典》收载本方时，芙蓉叶易芙蓉花，减去了穿山甲，加入了浙贝母。功用相同。

止痢散

出自《中兽医方剂》。雄黄 4g 藿香 11g 滑石 15g 为末，仔猪、羔羊每次 2~4g，调灌或制成舔剂服。功能清热利湿，解毒止痢。主治仔猪白痢，羔羊下痢。

据河北农业大学验证，治疗仔猪白痢 1 253 例，治愈 1 141 例。

止痢丹

出自《中草药防治猪病》，原无方名。黄连粉 3 份 白头翁 4 份 木香粉 2 份 甘草粉 1 份先将白头翁加水煎熬，去渣，浓缩为膏状，加入黄连粉、木香粉和甘草粉混合，干燥后再加入樟脑粉少许混匀。仔猪每 5kg 体重 1 次内服 2~3g，1 日 3 次，连服 3 天。功能清肠解毒，凉血止痢。主治仔猪白痢。

除寒止痢散

四川畜牧兽医学院验方，见于《中兽医方剂大全》。柴胡 100g 桂枝 羌活 独活各 50g 苍术 陈皮各 100g 苦参 50g 松针叶 500g 共为细末。母猪每次 50~60g 喂服，每日 1~2 次；也可用水调成糊状涂于母猪奶头上，仔猪吮乳时吸服。功能除寒湿，止泻痢。主治仔猪白痢。

雄黄糊

出自《兽医简便良方》，原名雄黄舔剂。雄黄 0.4g 加少量面粉，用水调成粘糊状，抹在舌面。功能解毒止痢，主治仔猪白痢。

糖二丑

出自《兽医简便良方》，原名二红糖。二丑 500g 红糖 75g 先煨炒二丑，当膨胀时加入红糖，继续炒至不见糖汁时取出，待凉研末。每用 6~10g。开水冲调，候温灌服。功能利水止泻。主治羔羊下痢，仔猪白痢。

草血竭片

出自《中兽医科技资料选辑》第 2 集。选取洗净晒干的草血竭全草，粉碎过筛。按 2 000g 药粉中加入豆粉 250g，加水至完全浸没药粉。微火加热，挥发多余水分至 2 000ml，停止加热。另取于药粉 5 000g 加入拌匀，用筛筛成 90% 颗粒，烘干加入硬脂酸 100g，拌匀，根据需要压制成 0.1g、0.3g、0.5g 的药片。按仔猪体重 0.3g / kg 投药，1 日 1 次，连用 3 天。功能活血化瘀，止血止痛。主治仔猪白痢。

复方穿心莲

出自《中兽医科技资料选辑》第 1 集，原名穿心莲复方。穿心莲细粉 2 份 地榆 1 份 苦参 1 份 红糖 2 份 先将地榆、苦参加水煎煮，去渣，加入红糖充分溶解，然后将穿心莲细粉加入，调成浓糊状，灌服，仔猪每次 1 药匙(约 1g)，每天 2 次，连用 3 次。功能清热解毒，凉血收敛。主治仔猪白痢。

千里光注射液

出自《全国兽医中草药制剂经验选编》。千里光 50kg 共制成 25 000ml。制法：①将千里光全草在饲料粉碎机内进行粗粉碎(不过筛)，称取千里光 50kg，用适量 85% 乙醇拌湿(要均匀)，然后放入具下嘴的耐酸缸中，再把剩余的 85% 乙醇加入(全部用 200kg 85% 乙醇)，让其自然浸渍 48~72 小时以上，收集浸渍液，回收乙醇，直至无乙醇味止，倾出浓缩液。②将浓缩液放冷，以虹中法吸出浓缩液，用注射用水或新鲜蒸馏水稀释约 1 倍，搅拌均匀，放置过夜(夏天需冷藏)，粗滤除去沉淀。③粗滤液浓缩至总量的一半，放冷，加入 10% 醋酸铅溶液 600ml，剧烈搅拌，冷置 24~48 小时，粗滤除去沉淀(加 10% 醋酸铅溶液的量，还需视具体情况而定，要求沉淀彻底，再滴加醋酸铅溶液不再形成沉淀为度)。④滤液中加入 10% 化学纯硫酸溶液至 pH2~3，搅拌均匀，冷置过夜，粗滤除去沉淀，滤液中加入注射用水至 25 000ml。⑤滤液先通过 732 型强酸性离子交换树脂，除去过量的铅离子(铅离子浓度不能超过 10%)，然后再通过 717 型强碱型离子交换树脂除去醋酸根，直至溶液 pH 在 6.5~

7 之间。⑥在交换液中加入活性炭 50g, 煮沸半小时, 乘热过滤, 滤液用 4%氢氧化钠溶液调节 pH 至 6.5~7.0, 灌封于 10ml、20ml 的安瓿中, 每支分别相当于生药 20g、40g。100℃流通蒸汽灭菌 30 分钟, 灯检合格后包装, 即为成品。肌肉注射, 每日 1 次。猪 1 次 10~15ml, 牛 800~1000ml。功能清热解毒, 泻火除湿。主治仔猪下痢、肠炎、腹泻等。

据浙江农业大学兽药厂报道, 本制剂对猪无名高热的治愈率达到 92.5%, 胃肠炎 80%, 仔猪下痢 96%; 牛流感、猪子宫内膜炎、外科感染高热和猪产后热的治愈率可达 100%。

赛梅止痢散

出自《中兽医医药杂志》1994 年第 1 期。赛葵 100g 乌梅 100g 生姜粉 50g 金银花粉 100g 黄芩 100g 六一散 100g 新鲜杉木炭粉 200g 混合研成极细末。每千克体重 0.5g, 每日 2~3 次, 拌料喂服。据报道, 本方有健脾解毒, 涩肠止泻的作用。临床治疗仔猪腹泻 3 049 例, 治愈 2 994 例。

7 医杂病方

神术散

出自《和剂局方》, 见于《猪经大全》。苍术 30g 细辛 10g 炙甘草 20g 藁本 30g 白芷 20g 羌活 20g 川芎 20g 和姜、葱煎汤去渣, 候温灌服。功能祛风除湿, 活血通络, 温经散寒。主治猪风寒湿卧症(痹症)。

徐长卿散

河南省桐柏县验方, 见于《中兽医医药杂志》1991 年第 4 期。徐长卿 10g 延胡索 8g 红花 10g 附子 8g 煎汤去渣, 候温灌服; 或为末冲服。功能驱风散寒, 除湿通络。主治猪风寒湿痹。

由于猪舍潮湿, 加之外感风、寒、湿邪, 使患猪经络凝滞、气血不畅。血瘀不通而导致后躯疼痛、麻痹。该证多见于冬春季节, 如不及时治疗, 往往导致瘫痪甚至死亡。

加减法: 风邪偏胜者, 加防风、羌活、独活、川乌、草乌; 寒邪偏盛者, 加肉桂、麻黄、干姜、细辛, 湿邪偏胜者, 加苍术、牛膝、防己、薏苡仁; 气血亏虚者, 加党参、黄芪、当归、川断、桑寄生。

健骨散

出自《中兽医医药杂志》1986 年第 5 期。骨粉 70% 仙灵脾 1.5% 五加皮 2.5% 茯苓 2.5% 白芍 1.5% 苍术 1.5% 大黄 2.5% 小麦麸 18% 为末。每日 30~50g, 分两次拌料喂服, 连喂 1 周为 1 个疗程。功能补肾健脾, 活血通络, 祛风除湿。主治猪骨软病。

为便于观察疗效, 将病猪按临床症状分为三型: 异食型; 轻型, 轻度跛行, 减食, 精神不振; 重型, 前肢严重跛行或跪地行走, 四肢关节肿大、背拱起、触之嘶叫、肌肉萎缩、喜卧。应用本方共收治 482 例, 治愈 470 头, 总有效率达 97.5%。其中异食型 165 例, 经 2

疗程全部治愈；轻型 273 例，252 例经 3 个疗程治愈，21 例经 4 个疗程治愈；重型 44 例，3 例经 3 个疗程治愈，29 例经 4 个疗程治愈。

苍术血粉散

出自《中兽医医药杂志》1990 年第 4 期。自制血粉 100g 苍术 90g 牡蛎粉 60g 骨粉 60g 槟榔 50g 苏打粉 40g 炒食盐 40g 共为细末，分 10 日喂完，每日 40~50g，分 2~3 次拌料饲喂。功能健脾开胃。主治动物异食癖。

在屠宰牲畜时，将血液收集，加入适量麸皮搅拌至能形成颗粒状，晒干即为自制血粉。据报道，本方具有补充钙、磷、蛋白质和微量元素，驱除体内外寄生虫，调节神经、代谢和胃肠消化功能。用自拟的苍术血粉散为主治疗各种类型异食癖患猪 100 例，其中混合型 42 例，僵猪 33 例，骨软病 17 例，其他 8 例，治愈 81 例，好转 16 例。

健脾补血糖浆

出自《中兽医医药杂志》1994 年第 1 期。茯苓 30g 白术 30g 当归首 60g 生地 60g 槟榔 50g 使君子 30g 甘草 10g 加水 1 000ml，浓煎成 200ml，加入红糖 50g。每千克体重 1 次内服 3~5ml，每日 2 次。据报道，本方功能补气健脾，生血驱虫。治疗仔猪贫血 1 254 例，治愈 1 249 例。

大黄石灰散

出自《兽医科技杂志》1981 年第 8 期。大黄末 熟石灰(各等份) 焙成粉红色。局部扩创，清除坏死组织，洗净后撒布本方，能止血，解毒。生肌。主治猪创伤出血及坏死杆菌病。

本方是桃花散的变方，药味相同，药量配比及制法不同。据报道，用本方治疗猪坏死杆菌病 83 例，治愈 81 例。研磨少量冰片加入本方中，防腐、消肿、止痛的效果更佳。

大青解毒散

出自《全国中兽医经验选编》。大青叶 90g 石膏 贝母 板蓝根各 30g 为末，开水冲调，候温灌服。功能清热解毒。主治猪丹毒，高热。

本方与《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)中收录的清热散比较，少大黄、芒硝；多贝母，降低了泻下清热的作用，而以清热润肺见长。

硫黄膏

出自《中草药防治猪病》。硫黄 20g 苦楝皮粉 20g 食盐 10g 樟脑 1g 为末，加入油脂 10ml 搅拌均匀，涂擦患处。功能杀虫止痒。主治猪疥癣。

《中兽医方药应用选编》中亦载有硫黄膏：硫黄粉 500g 棉籽油 500ml 熬成软膏，擦患部。功能解毒杀虫，止痒润肤。主治疥癣。

灭疥散

出自《中兽医治疗学》，原无方名。硫黄 30g 雄黄 15g 枯矾 45g 花椒 25g 蛇床子 25g 为细末，油调涂搽患处。功能杀虫灭疥，主治猪疥癣。使用时注意防止猪互相舔食，以

免中毒。

疥癣是一种由螨虫引起的皮肤病，患部发痒、脱毛起痂。病初多生于头部，后蔓延身体两侧，甚至全身。在饲养管理不良的冬春季节，影响尤为严重，可引起猪只消瘦，甚至死亡。硫黄膏和灭疥散两方均简单有效，可以试用。方中各药物均有杀虫作用，而油脂既作为药粉的载体，又可直接作用于虫体，使其不能行使正常生理功能而死亡，另外油脂还具有滋润皮肤的作用。以上两法亦可杀体表寄生昆虫，如虱、蚤等。

复方百部膏

出自《中兽医治疗学》，原无方名。百部 250g 苍术 125g 雄黄 60g 清油 250g 百部加水 2 000ml，煮沸 1 小时，过滤，加入研细的苍术、雄黄，再加清油调匀，每用适量涂搽患部。功能杀虫止痒。主治猪虱寄生。

用药后 30 分钟后虱子即可死亡。应结合消毒药喷洒猪栏及护理用具，方能根治。杀虫药物中以百部根为特效。

溲渍液

出自《中国兽医杂志》1999 年第 8 期，原名湿敷液，又名马齿苋煎。马齿苋 60g 加水煮沸 15 分钟后浸于溲渍垫上敷患处，每次 10~30 分钟。功能清热解毒，主治猪急性渗出性皮肤病。

双花散

出自《中兽医医药杂志》1992 年第 1 期。金银花 板蓝根各 200g 共为细末，每次用 25g 拌料喂母猪，每日 2 次。功能清热除湿。主治猪湿疹。

据报道，此方喂服母猪治疗哺乳仔猪湿疹共 40 窝 300 多头仔猪，不仅可以治疗已病仔猪，而且对未发病仔猪有预防效果。

治疗湿疹还可以选用：(1)参柏汤 出自《中国兽医杂志》1984 年第 1 期。苦参生黄柏生百部 黄芩 生石膏(先煎)各 30g 硫磺 80g 冰片(后入)10g 明矾(后入)30g 冰片、明矾待上药煎好后乘热加入，捣匀，滤渣，候温外涂。药液在 500ml 左右。用本方治疗猪湿疹 30 例，治愈 25 例，好转 5 例。(2)杏黄膏 出自《甘肃畜牧兽医》1987 年第 1 期。苦杏仁 20g 黄连素 1g 苯海拉明 300mg 香油适量 将苦杏仁用文火炒糊，研碎，加黄连素、苯海拉明，用香油调成软膏备用。患部先用新洁尔灭棉球清洗，擦干，然后均匀涂抹药膏，每日 1~2 次，重者可涂 3~4 次。共治疗猪急慢性湿疹 98 例，治愈 96 例。

【医禽方】

1 增产保健方

艾叶散

出自《饲料研究》1988年第6期。艾叶 为末，在饲料中添加2%~2.5%，功能温中散寒，行气健胃。用于促进肉鸡增重和蛋鸡产蛋。

试验表明，按上述剂量喂白洛克雏鸡71天，增重提高22.69%。另有人在饲料中用0.5%的艾粉代替等量麸皮喂星布罗和艾维茵商品代混合雏，结果饲料利用率和增重均显著提高。

据报道，在饲料中用0.5%的艾叶粉代替等量麸皮饲喂尼克蛋鸡，年平均产蛋率提高4.87%，降低死亡率50%。另有报道，在蛋鸡的基础日粮中添加1.5%~2%的艾粉，产蛋率可提高4%~5%。

研究表明，少量艾叶内服，能促进胃液分泌，增进食欲。

据报道，可用于促进肉鸡增重的单味药物还有大蒜粉(在饲料中添加50mg/kg)、蜂花粉(在饲料中添加0.1%~0.2%)、钩吻(在饲料中添加0.2%)、沸石(在饲料中添加3%~5%)、麦饭石(添加1%~2%)、松针粉(添加0.3%~0.4%)等。

另据资料介绍：罗马尼亚在蛋鸡饲料中加玉米花粉，产蛋量提高11%；俄罗斯在蛋鸡产蛋后期13~14月龄饲料中加刺五加叶粉(0.15g/kg)，第10天每1000只鸡多产蛋242.8枚，比对照组提高4%，10天后提高5.7%~17.8%；匈牙利在蛋鸡饲料中添加1%红辣椒粉和苜蓿粉，再加少量植物油，产蛋率提高7%~8%。

催肥方

出自《居家必用事类全集》。土硫黄每次一般用0.5~1g(即半钱许)。同米饭拌匀喂服。功能驱虫健胃。用于鸡鸭催肥。

增重散

出自《天然物中草药饲料添加剂大全》。黄芪 小茴香各50g 艾叶 肉桂 钩吻 五加皮各100g 为末混饲，每日每只鸡1~1.5g(10日龄开始)。功能益气助阳，温胃进食。用于促进肉鸡增重。

据山东省莱阳农学院中兽医教研组试验，每只鸡平均多增重350g。

肥鸡散

出自《畜禽饲料添加剂》。肉桂50g 干姜20g 甘草9g 茴香7g 炒黄豆6g 硫酸亚铁8g 为末混饲，每日每只鸡0.5~1g。功能温中散寒，增重催肥。用于促进肉鸡增重。

味香肥鸡散

出自《饲料研究》1988年第2期。桂皮40g 小茴香30g 羌活 陈皮各10g 甘草 胡椒各5g 为末混饲，每日每只鸡1g。功能温中散寒，健脾理气。用于促进肉鸡增重。

健鸡散

出自《中华人民共和国兽药典》(2000年版)。党参 黄芪 茯苓各20g 六神曲 麦芽

山楂各 10g 甘草 槟榔(炒)各 5g 为末，在饲料中添加 2%。功能益气健脾，消食开胃。主治鸡食欲不振，生长迟缓；可用于肉鸡增重。

雄黄散

出自《中兽医医药杂志》1989 年第 3 期。明雄黄 寒水石各等份 为细末，装入胶囊。每只公鸡每次 3g，隔日 1 次，共 3 次。用于抑制性机能。促进增重。

五味胡椒散

出自《黑龙江畜牧兽医》1989 年第 2 期。五味子 10 粒 白胡椒 7~8 粒投服，每天 1 次，连用 4~5 天。功能温中涩精。用于公鸡去势催肥。

激蛋散

出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。虎杖 100g 丹参 80g 菟丝子 当归 川芎 牡蛎 肉苁蓉各 60g 地榆 白芍各 50g 丁香 20g 为末，在饲料中添加 1%。功能清热解毒。活血祛瘀，补肾强体。主治蛋鸡输卵管炎，产蛋功能低下。

蛋鸡宝

出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。黄芪 200g 党参 茯苓 白术 山楂 六神曲 麦芽 菟丝子 蛇床子 淫羊藿各 100g 为末，在饲料中添加 2%，连用 3 周。功能益气健脾，补肾壮阳。用于提高蛋鸡产蛋率，延长产蛋高峰期。

蒜糖液

出自《中国禽业导刊》2000 年第 6 期。大蒜 100g 8%蔗糖水 2 000ml 大蒜捣成泥，入糖水浸泡 1~2 小时后备用。每日每只产蛋鸡 20ml，加在饲料中喂给，连喂 7 天。功能提供营养，帮助消化，提高产蛋率。用于促进产蛋。

八味促卵散

出自《山东中兽医》1989 年创刊号。当归 200g 生地 200g 阳起石 100g 淫羊藿 200g 苍术 200g 山楂 150g 鲜马齿苋 300g 板蓝根 150g 鲜马齿苋捣成浆，其他药为末，混合，再加白酒 300ml 和水适量，制成颗粒剂。(少量的制法，可把药面团放在钉有木框的纱窗上来回搓动，以纱窗孔内漏下的即为颗粒剂。晾干备用)。在配合料中加入本品 3%，饲喂 43 日龄母鸡至开产。功能助阳促卵。用作母鸡开产前的饲料添加剂。

山东省枣庄市畜牧兽医站报道，本方剂有明显的促进母鸡性发育的作用。试验组群体开产日龄比对照组提前了 20 天，开产期也相对集中、整齐；平均蛋重试验组比对照组高 11.1g。

蛋黄增色剂

出自《天然物中草药饲料添加剂大全》，原名苍术粉。苍术 为末，在饲料中添加 2%，功能健脾燥湿。用于鸡蛋蛋黄增色。

据报道，可用于鸡蛋蛋黄增色的药物还有人参茎叶(在饲料中添加 5%~10%)，万寿菊花瓣(添加 0.3%)、聚合草(添加 5%)、紫苜蓿(添加 5%)、海藻(添加 2%~6%)、槐树叶(添加 5%)、胡枝子叶(添加 12%)、玉米花粉(添加 0.5%)、红辣椒(添加 0.1%)、紫菜(0.3g

/羽)等。

降脂增蛋散

出自《中华人民共和国兽药典》(2000年版)。党参 白术各 80g 刺五加 仙茅 何首乌 当归 艾叶各 50g 山楂 六神曲 麦芽各 40g 松针 200g 为末混饲,鸡 0.5~1g。功能补肾益脾,暖宫活血。主治产蛋下降;可降低鸡蛋胆固醇。

鸡宝康

出自《中兽医医药杂志》1992年第4期。黄芪 酸枣仁 远志各 20g 为末,在饲料中添加 1.5%,每隔 5 天添加 1 次。功能补益气血,安神镇惊。用于促进生长,提高产蛋率。

龙胆保健沙

出自《养鸽技术及鸽病防治》,原名保健沙。蚝壳片 250g 骨粉 80g 陈石灰 55g 中粗沙 350g 红泥 150g 木炭末 5g 食盐 40g 红铁氧 15g 龙胆草末 5g 穿心莲末 3g 甘草末 2g 混合,每对鸽每次 15~20g,上午喂饲后给予。功能促进生长,增进食欲,预防疾病。用于鸽只保健。

本方为广东省家禽科学研究所配方。类似方尚有:(1)香港九龙鸽场配方(细沙 600g、贝壳粉 310g、食盐 33g、牛骨粉 14g、木炭末 15g、旧石膏 10g、明矾 5g、甘草 5g、龙胆草 5g、二氧化铁 3g);(2)广东一些鸽场常用的保健沙配方(黄泥 100g、细沙 100g、蚝壳粉 150g、旧石灰 60g、木炭末 30g、骨粉 40g、食盐 15g、龙胆草末 30g、甘草末 20g)等。

乳鸽保健砂

出自《中兽医学杂志》1998年第4期。黄泥 20g 细沙 25g 贝壳粉 25g 骨粉 8g 含碘食盐 3g 石膏 2g 硫酸亚铁 0.5g 木炭末 2g 甘草 白芍各 1g 苍术 龙胆各 0.5g 亚硒酸钠 0.04g 制成小颗粒,供乳鸽自由采食。功能防病促长。

助禽免

出自《中国兽医杂志》1999年第7期。党参 50g 灵芝 女贞子各 30g 麦冬 枸杞子 桑葚各 10g 加水浸泡 30 分钟,煎煮 30 分钟,煎 3 次,合并 3 次滤液,浓缩成相当于生药 100%,灭菌备用。1~5 日龄鸡饮水中添加 1%。功能扶正固本,益气滋阴。用作免疫增强剂,能克服新城疫免疫接种时母源抗体的干扰,提高抗体效价。

矾雄散

出自《三农纪》,原无方名。白矾 雄黄 甘草 共为末,每只鸡每次 1~1.5g,拌饭饲之。功能清热燥湿。防避某些鸡病。

原文载:“若遇瘟,急用白矾、雄黄、甘草为末,拌饭饲之,薰以苍术、赤小豆、皂角、藜芦末。”这里所指鸡瘟,是古代对鸡各种急性热性病的泛称。《新疆畜牧业》1985 年第 1 期中所载自拟雄明散(雄黄、明矾、甘草、腐植酸钠,用于防治禽霍乱)即本方加味。《内蒙古中兽药标准》(1988 年版)中收录的鸡清瘟解毒片,其药味组成也与本方相同。另据《中兽医医药杂志》1986 年第 6 期报道,本方的水浸上清液和混悬液,对多杀性巴氏杆菌的体

外抑菌效价为 1: 256。

十味育雏散

出自《山东中兽医》1989 年创刊号。当归 100g 黑芝麻 50g 淫羊藿 100g 生姜 50g 苍术 100g 山楂 100g 苦参 150g 干马齿苋 100g 大蒜 150g 板蓝根 100g 把生姜、大蒜捣成泥，加白酒 200ml 搅拌；把黑芝麻炒至稍露香味与其他药物共同粉碎为末。然后将以上诸品混合，加入少量温水拌匀，合成药团。把药团放在钉有木框的纱窗上来回搓动，以纱窗孔内漏下的即为颗粒剂。边漏边撒上些已称出的饲料干粉，并不断振荡容器，防止粘结成块，以保证成粒。搓动药面团时用力要均匀，使颗粒大小力求一致。晾干备用。在饲料中加入本品 2%，喂饲 1~42 日龄的雏鸡。功能扶正壮体，防治病虫。作为雏鸡饲料添加剂。

山东省枣庄市畜牧兽医站等试验，本方对雏鸡有促进综合发育的功能，有较强的保护力，试验组鸡的育成率比对照组高出 21%，生长速度是对照组的 1.92 倍，饲料报酬是对照组的 1.87 倍，体重是对照组的 1.72 倍。

2 医瘟疫痢痘方

白花蛇舌草散

出自《中兽医学杂志》1986 年第 3 期，原无方名。白花蛇舌草 200g 茵陈 半枝莲 大青叶各 100g 生地 150g 藿香 当归 赤芍 车前子 甘草各 50g 煎汤去渣，供 100 羽鸡 3 天饮服，或拌入饲料喂服。功能清热解毒，祛湿止泻。主治急性禽霍乱。

同时报道的还有一个配套方，用于治疗慢性禽霍乱。其组方如下：白花蛇舌草 半枝莲各 80g 生地 50g 车前子 茵陈 大黄 茯苓 白术 泽泻各 60g 生姜 半夏 桂枝 白芥子各 50g。

禽药片

出自《中兽医学杂志》1987 年第 4 期。一见喜 100g 藿香 木香各 50g 胡黄连 乌梅各 42g 黄柏 35g 苍术 半边莲 大黄 SMD 土霉素各 30g 白芷 25g TMP6g 为末，加淀粉适量，制成 1 000 片，每片含中西药 0.5g。成鸡每次 4~5 片投服，每日 2 次；预防量酌减。功能清热解毒，消炎止痢。用于防治禽霍乱，鸡沙门氏杆菌，呼吸道感染。穿心莲片

出自《中兽医医药杂志》1987 年第 2 期。原无方名。穿心莲 板蓝根各 60g 蒲公英 旱莲草各 50g 苍术 30g 为细末，加适量淀粉，压制成每片含生药 0.45g，烘干。每只鸡每天给药 3~4 片，每日 3 次投服。功能清热解毒。主治禽霍乱。

穿心莲散

出自《兽医验方新编》原无方名。穿心莲 90g 鸡内金 8g 甘草 2g 为细末，雏鸡、雏鸭每只每次 0.5~0.8g；成鸡、成鸭每只每次 1~1.5g，鹅每只每次 2~3g。灌服或混饲。

功能清热解毒，止泻。主治禽巴氏杆菌病，泻痢。

禽康灵

出自《黑龙江畜牧兽医》1986年第2期。巴豆霜 4g 乌蛇 2g 雄黄 1g 为末，3月龄以内的鸡每 20~50 只用药 1g，成鸡每 5~10 只用药 1g，拌饲喂给，或掺少许面粉做成条状填喂。功能解毒杀虫。主治鸡霍乱，球虫病。

金蒲散

出自《中兽医学杂志》1990年第6期。蒲公英 150g 野菊花 黄芩 紫花地丁 板蓝根 当归各 100g 为末，混均，按 1.5 %混入饲料内，分 3 次给药，每次 1 周，两次之间隔 1 周，从 22 日龄开始用药，直到 56 日龄。功能清热解毒，消肿散痛。用于预防雏鸡葡萄球菌病。

鸡乐

出自《中兽医学杂志》1989年第10期。金荞麦 将不同入药部位(根、茎叶、花)分别制备成乙醇提取液，低温浓缩至无醇味，混合，加蒸馏水适量，使每毫升含生药 1g。预防量以 0.1%比例拌料，连喂 3 天；治疗量以 0.2%比例拌料，连喂 3~5 天。功能清热解毒，活血化瘀。主治鸡慢性葡萄球菌病。

本方原无方名，“鸡乐”是研制单位准备报批生产的商品名称。金荞麦为蓼科多年生植物，其制剂的主要有效成分为双聚原矢车菊甙元。本制剂对鸡金黄色葡萄球菌有较好的抑制作用，防治慢性型(关节炎、眼炎、皮炎)鸡葡萄球菌病，有效率为 83%~94%。

通鼻散

出自《中兽医学杂志》1991年第1期。原无方名。白芷 防风 益母草 乌梅 猪苓 诃子 泽泻各 100g 辛夷 桔梗 黄芩 半夏 生姜 葶苈子 甘草各 80g 为细末，拌饲喂(以上为 100 只鸡 3 日量)，连用 9 天。功能散风，化痰，通窍。主治鸡传染性鼻炎。

喉炎净散

出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。板蓝根 840g 蟾酥 80g 合成牛黄 60g 胆膏 120g 甘草 40g 青黛 24g 玄明粉 40g 冰片 28g 雄黄 90g 为末，混饲喂，鸡 0.05~0.15g。功能清热解毒，通利咽喉。主治鸡喉气管炎。

本方是在六神丸的基础上演化而来，与喉症丸相近。

扶正解毒散

出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。板蓝根 黄芪各 60g 淫羊藿 30g 为末。鸡 0.5~1.5g。功能扶正祛邪，清热解毒。主治鸡法氏囊病。

复方黄芪饮

出自《中国兽医杂志》1998年第3期，又名囊炎康。黄芪 石膏 茅根 甘草 制成口服液，每 1ml 含生药 1g。每次 1~3ml，每天服 1~2 次。功能扶正祛邪，清热利水。主治鸡传染性法氏囊病。

银翘参芪饮

出自《中兽医学杂志》1997年第2期，原无方名。金银花 连翘 板蓝根 大青叶 黄芩各500g 贝母 桔梗 党参 黄芪各400g 甘草100g 加水15kg 煎煮20分钟。取汁，按1:5饮水，连用3天。功能清热解毒。化痰平喘，益气健脾。主治鸡传染性支气管炎。

定喘汤

出自《中兽医医药杂志》1987年第6期。麻黄 大青叶各300g 石膏250g 制半夏 连翘 黄连 金银花各200g 蒲公英 黄芩 杏仁 麦门冬 桑白皮各150g 菊花 桔梗各100g 甘草 煎汤去渣，拌于1天的日粮中喂5000只鸡。功能清热解毒，化痰定喘。主治鸡传染性支气管炎。

据报道，用本治疗病雏7178只，治愈率达97.7%。

镇喘散

出自《中华人民共和国兽药典》(2000年版)。香附 干姜各30g 黄连20g 桔梗15g 山豆根 甘草各10g 明矾5g 皂角 合成牛黄各14g 蟾酥 雄黄各3g 为末。鸡0.5~1.5g。功能清热解毒，止咳平喘，通利咽喉。主治鸡慢性呼吸道病，喉气管炎。

银翘蓝根煎

出自《畜禽鱼病防治新技术》，原无方名。金银花 15g 连翘 板蓝根 秦皮 白茅根各20g 车前子15g 麻黄 冬花 桔梗 甘草各10g 煎汤饮水服，按每日每只鸡1g生药计，连用3天。功能清热平喘，利水涩肠。主治鸡肾病变型传染性支气管炎。

参芪蓝根煎

出自《畜禽鱼病防治新技术》，原无方名。党参 黄芪 金银花 连翘各10g 板蓝根 鱼腥草各20g 黄柏 龙胆 茯苓各10g 车前子 金钱草 枇杷叶各15g 山楂 麦芽 甘草各10g 煎汤饮水服，按每日每只鸡2g生药计。连用3天。功能扶正祛邪，利水通淋，化痰止咳。主治鸡肾型传支。

鱼腥草散

出自《中兽医医药杂志》1989年第3期，原无方名。鱼腥草360g 蒲公英180g 黄芩 葶苈子 桔梗 苦参各90g 为末，每只雏鸡每次用药0.5g，1日3次，混于饲料中喂服。功能清热解毒，消肿散痈。主治鸡曲霉菌病。

喘咳清

出自《畜禽鱼病防治新技术》金荞麦 凤茄花 鱼腥草 板蓝根 麻黄 杏仁 半夏 桔梗 山楂 甘草 为末，鸡每公斤体重1g，分早晚2次混饲。连用4~5天。功能清热解毒，化痰平喘。主治鸡慢性呼吸道病。

三黄汤

出自《福建畜牧兽医》1985年第4期。黄柏 黄连各100g 大黄50g 加水1500ml，微火煎至约1000ml，滤出药液，再加水煎一次，合并两次药液，10倍稀释于饮水中，供1

000 只雏鸡自由饮服。功能清热燥湿。主治雏鸡大肠杆菌病。

四黄药谷

出自《中兽医学杂志》1991 年第 4 期，原无方名。黄连 黄芩 黄柏 大黄各 60g 苍术 厚朴各 40g 甘草 30g 浓煎去渣，用药液煮稻谷，饲喂 400~500 羽成年鸭。功能清热燥湿。主治鸭巴氏杆菌病。

若为雏鸭，可根据病情选用下列配方：大黄 黄芩各 25g 乌梅 白头翁各 30g 苍术 厚朴各 20g 当归 党参各 15g 煎汁拌饲喂 1 000~1 200 羽雏鸭。

鸡痢灵

出自《中兽医医药杂志》1984 年第 4 期，原无方名，首批生产时名鸡痢灵，《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)收载名为鸡痢灵散。雄黄 藿香 黄柏 滑石各 10g 白头翁 诃子 马齿苋 马尾连各 15g 为末，雏鸡 0.5g。功能清热解毒，涩肠止痢。主治雏鸡白痢。

四味穿心莲散

出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。穿心莲 45g 辣蓼 15g 大青叶 葫芦茶各 20g 为末，鸡 0.5~1.5g。功能清热解毒，除湿化滞。主治鸡泻痢，积滞。

雏痢净

出自《中华人民共和国兽药典》(2000 年版)。白头翁 马齿苋各 30g 黄连 15g 黄柏 20g 乌梅 15g 诃子 9g 木香 20g 苍术 60g 苦参 10g 为末，雏鸡 0.3~0.5g。功能清热解毒，涩肠止泻。主治雏鸡白痢。

板蓝根汤

出自《中国兽医杂志》1991 年第 7 期。原无方名。板蓝根 100g，加水 1 500ml 煎汤，去渣，与 50kg 水混合，置饮水器中任其自饮。功能清热解毒。用于防治鹌鹑痘病。

本方亦可用于治疗鸡痘。近年来报道的治鸡痘复方，也多数含有板蓝根。如：(1)板蓝根 金银花 连翘 赤芍 葛根各 20g 蝉蜕 甘草 竹叶各 10g 桔梗 15g 煎汤，100 只鸡饮用(《中兽医医药杂志》1984 第 2 期)；(2)板蓝根 金银花 黄柏各 80g 丹皮 黄芩 山豆根 苦参 白芷 防风 皂角刺各 50g 栀子 甘草各 100g 每羽每日 0.5~2.0g，煎汤拌饲(《中兽医学杂志》1987 年第 2 期)；(3)板蓝根 100g 金银花 蒲公英 山楂 甘草各 50g 黄芩 30g 为末，拌饲喂 100 羽鸡。

紫草煎

内蒙古自治区乌拉特中旗方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。紫草 10g 生地 6g 甘草 3g 煎汤去渣，拌饲喂服。功能解毒凉血。主治鸡痘。

败毒和中散

出自《鸡谱》。连翘 牛蒡子各 3g 黄连(酒炒) 枳壳 桔梗各 2g 紫草 甘草各 1g 蝉蜕 7 个 川芎 1g 麦冬 2g 木通 前胡 升麻各 1.5g 为细末，水丸，每丸重 3g，每服 1 丸。功能清热解毒，宽胸利气。主治鸡痘。

润喉煎

出自《中兽医学杂志》1987年第4期，原无方名。板蓝根 75g 麦冬 50g 生地 50g 丹皮 50g 连翘 50g 莱菔子 50g 知母 25g 生甘草 15g 水煎，去渣，成汤 1 000ml，拌入饲料中喂 500 只鸡。功能清热解毒，滋阴润喉，下气消食。主治粘膜型鸡痘。

冰青散

出自《中兽医学杂志》1984年第12期。冰片 青黛 硼砂各等份 为极细末，用喷粉器喷于咽喉部，每鸡每次 0.1~0.15g。功能清热解毒。主治鸡粘膜型或混合型鸡痘。

白矾液

出自《串雅兽医方》，原无方名。白矾 研末外敷，或溶液洗之。功能防腐收敛。主治鸡水眼(鸡痘)。

3 医脏腑病方

冲和丸

出自《鸡谱》。羌活 防风 苍术 白芷 川芎 生地 黄芩 细辛 甘草各等份共为末，并用生姜汁同枣泥丸之。每丸重 3g，每服 1 丸。功能辛温解表，散寒除湿。主治鸡伤寒病症(风寒感冒之初期)。

小柴胡丸

出自《鸡谱》。柴胡 9g 黄芩 3g 半夏 9g 甘草 3g 共为细末，用生姜同大枣泥为丸，重 3g 每服 1 丸。功能和解少阳。主治鸡伤寒病症。

本方源于《伤寒论》中的小柴胡汤，但减少了人参一味。适用于鸡感冒等外感表证。病鸡表现为精神沉郁，翼垂毛乍，不欲饮食。

复方柴胡汤

出自《鸡病中药防治》，原无方名。柴胡 知母 金银花 连翘 枇杷叶 莱菔子各 50g 水煎去渣，成汤 1 000ml，分早、晚 2 次拌入饲料中喂 1 000 只雏鸡。功能清热解毒，辛凉透表，化痰止咳，降气消食。主治雏鸡感冒。

方中按语云：“雏鸡感冒，一般用辛凉解表药即可治愈。雏鸡形气未充，切忌用苦寒之品。另外，在给药后应适当提高室温，以助药力。”

四黄抽薪丸

出自《鸡谱》。黄芩(酒炒) 栀子各 15g 石斛 3g 黄柏 9g 枳壳 3g 生石膏 3g 黄连 6g 大黄 3g(壮者加，弱者莫用) 为细末，清茶和丸，每丸 3g，每服 1 丸。功能清热泻火，表里双解，其泻火之力强，犹如釜底抽薪，故名。主治鸡伤热。

凉膈散

出自《鸡谱》。防风 荆芥 桔梗 山栀 玄参 石膏 薄荷 黄连 贝母 大黄 天

花粉 牛蒡子各 3g 为细末，水丸，每丸 3g。每服 1 丸。功能泻黄通便，清上泻下。主治鸡噪黄。

发散丸

出自《鸡谱》。苏叶 前胡(醋炒) 枳壳各 9g 姜半夏 15g 红橘 桔梗 葛根各 9g 甘草 1.5g 为末，和水为丸，丸重 3g，每服 1 丸。功能发表散寒，理气止咳，化痰平喘。主治鸡寒喘。

鸡即吉

出自《民间兽医通讯》1958 第 4 期。大黄 2 份 黄芩 2 份 香附 4 份 蒙石 2 份 各味分别研细末，前 3 味混合均匀，为水丸，再以蒙石末上衣，每丸重 0.15g，每包装 20 丸。内服，每鸡每次 2~4 丸，小鸡减半。功能清热理气。主治鸡消化不良，下痢。

健脾消食丸

出自《鸡谱》。白术(土炒) 茯苓 厚朴(姜汁炒) 山楂(去子)各 15g 神曲 30g 麦芽 枳壳 青皮 砂仁各 9g 草 1.5g 为细末，神曲和为丸，每服 1 丸(3g)。功能消食导积。主治鸡食积。

黄连饮

出自《养鸽指南》，原无方名。黄连 0.8g 黄柏 1g 金银花 0.7g 木棉花 0.7g 白头翁 0.5g 茵陈 0.4g 苍术 0.1g 甘草 0.3g 煎汤去渣，供饮用。功能清热解毒，燥湿止泻。主治鸽肠炎，腹泻。

二术柴胡散

云南农业大学验方，见于《中兽医方剂大全》。苍术 20g 厚朴 白术 干姜 肉桂 柴胡 白芍 龙胆 黄芩各 10g 木炭末适量为末，混匀，外观为黑色，分装，每包重 5g。大鸡每服 1 包，小鸡半包，日服 2 次。功能疏肝解郁，健脾和胃，燥湿止泻。主治鸡腹泻。

龙蓍丁液

出自《黑龙江畜牧兽医》1988 年第 1 期。龙芽苻木 蓍草 丁香叶 按 5: 3: 2 配药，采用闭路式水循环提取法煎煮 3 次，第 1 次加水 10 倍，冷浸 30 分钟，煮沸 2 小时；第 2 次加水 8 倍，煎煮 1.5 小时；第 3 次加水 6 倍，煎煮 1 小时。过滤，合并 3 次药液，常压蒸馏法浓缩，除去 2 / 3 水分。高速离心 10 分钟，除去沉淀，再减压低温浓缩至每 1ml 相当于生药 10g。每日每只雏鸡用相当于原生药 0.4g，溶于饮水中服用。功能益气，清热，止痢。主治雏鸡下痢，并有增重作用。

制脱散

山西省汾阳县验方，见于《中兽医方剂大全》。党参 100g 黄芪 100g 白术 100g 山药 100g 升麻 20g 为细末，混合于 50kg 饲料内饲喂中鸡。功能补中益气。主治鸡脱肛。

山西农业大学验方(党参 40g 黄芪 60g 山药 50g 升麻 30g 枳壳 30g 为细末，于

饲料中添加 2%，连喂 10~30 天，功能益气升提，主治鸡脱肛)与本方相近。

盐石散

出自《中兽医医药杂志》1991 年第 6 期，原无方名。食盐 2g 石膏 2g 为细末 混于 100g 饲料中喂服，1 日 1 次，连喂 3 天。功能清热开胃。主治鸡啄肛，啄羽，啄卵癖。

降石汤

出自《千家妙方》，见于《中兽医医药杂志》1989 年第 5 期。降香 3g 石韦 滑石 鱼脑石各 10g 金钱草 30g 海金沙 鸡内金 冬葵子各 10g 甘草梢 3g 川牛膝 10g 为末，拌在饲料中喂服，每鸡每次服 5g，每日 2 次，连服 4 天为 1 个疗程。功能解表清热，祛风利湿。主治鸡痛风症。

茵陈三皮散

上海市奉贤县验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。茵陈 60g 茯苓 桑白皮 大腹皮 姜皮 白术 泽泻 干姜 青木香 厚朴 木瓜 大枣各 30g 龙胆草 60g 为细末，每羽每次 0.5~1g，混饲料中喂服；或煎汤加入饮水中喂服。每天 3 次，3 天为 1 个疗程。功能利水消肿，益肝健脾。主治鸡腹水综合症。

特效腹水康

出自《中国兽医杂志》1998 年第 1 期。茯苓 85g 姜皮 45g 泽泻 20g 木香 90g 白术 25g 厚朴 20g 大枣 25g 山楂 95g 甘草 50g 维生素 C 45g 为末，预防在 8~35 日龄肉鸡饲料中添加 0.4%；治疗添加 1.5%，连用 3~5 天。功能健脾理气，渗湿利水。用于防治肉仔鸡腹水症。

肾肿痛风散

出自《畜禽鱼病防治新技术》。海金沙 金钱草 泽泻 木通 猪苓 滑石 茯苓 川芎 白术 大黄 为末，每公斤体重 0.5~1g，1 日分 2 次混饲喂，连用 3~5 天。功能清热通淋。主治鸡痛风。

金沙蝼蛄散

山东省茌平县验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。海金沙 木通 瞿麦 蝼蛄各等份 为末，每只鸡每日 0.5~1g，拌饲喂服。功能利水通淋。主治鸡痛风。

加减驻龙百补丸

出自《鸡谱》。当归(酒洗) 生地(酒洗) 熟地 菟丝子各 9g 天冬 麦冬各 6g 枸杞 白茯苓 山萸(酒浸) 山药 人参 鹿角胶(蛤粉炒成珠)各 9g 五味子 柏子仁各 3g 牛膝(酒浸) 杜仲(姜炒)各 9g 共为细末，蜜丸，每丸 3g，每服 1 丸。功能益气补血，滋阴壮阳。主治鸡劳伤。

本方可看成是鸡的十全大补丸，人参一味现兽医上一般用党参代替。鸡劳伤表现“冠瘦，腿脚枯干，饮食日减，精神疲倦，目光神少，不鸣不浴，懒行懒动。”多见于短期内频繁角斗的斗鸡或交媾无度的公鸡。

促精散

出自《中兽医医药杂志》1987年第6期。炙淫羊藿 40g 肉苁蓉 巴戟天 白术各 30g 党参 麦门冬 天门冬 黄柏 甘草各 20g 为末，公鸡每次 8g，每天 1 次，调灌，或混于饲料中喂服，连用 5 天。功能益气助阳。主治公鸡精子、精液品质下降。

据报道，本方作为饲料添加剂，能提高公鸡采精量，提高精液品质。

4 医虫证杂病方

球康

出自《中国兽医杂志》1997 年第 11 期。黄芪 10g 白头翁 15g 苍术 10g 乌梅 10g 苦参 12g 黄柏 12g 地榆 12g 白茅根 12g 薏苡仁 7g 为末，饲料中添加 0.5%。功能扶正祛邪，燥湿止痢。主治鸡球虫病。

据报道，用本方进行试验，抗球虫指数达 179.7。

常山柴胡合剂

出自《禽病防治》。常山 500g 柴胡 80g 加水 5 000ml，煎汤去渣，候凉，1 月龄雏鸡每只喂服 10ml，连用 3 天。功能杀虫。主治鸡球虫病。

据报道，用本方(名球虫净)治疗患球虫病病鸡 50 例，治愈 47 例；对照组 31 例全部死亡(《湖北畜牧兽医》1984 年第 4 期)。

驱球散

出自《中国兽医杂志》1992 年第 3 期。常山 250g 柴胡 90g 苦参 185g 青蒿 100g 地榆炭 90g 白茅根 90g 煎汤，浓缩至 280ml，稀释后混拌于 42kg 饲料中，治疗用；或为末，在饲料中添加 0.5%，预防用。功能清热燥湿，杀虫止痢。用于防治鸡球虫病。

球虫七味散

出自《中兽医病证诊疗经验》。青蒿 60g 常山 35g 草果 20g 生姜 30g 柴胡 45g 白芍 40g 甘草 20g 煎汤去渣，拌入精料供 50 日龄雏鸡 100 只自由采食服用，1 付药煎 2 次，每日上下午各喂 1 次。功能清热燥湿，杀虫消积，健脾和胃。主治鸡球虫。

规那皮散

出自《最新实用兽医手册》。规那皮 黄连 黄芩 黄柏 鸦胆子 甘草各 5g 为极细末，初生雏鸡每次 0.5g，连服 10~15 天。功能清热燥湿，杀虫止痢。主治鸡球虫病。规那皮即奎宁树皮。

四黄散

出自《中兽医临证要览》。黄连 黄柏 黄芩 大黄各 10g 紫草 15g 煎汤去渣，拌饲料中供 20 只 30 日龄左右鸡服用。功用清热燥湿，解毒化瘀。主治鸡球虫病。

据杨再昌等报道，用清热燥湿药(黄芩 40% 黄柏 30% 土大黄 30%)，益气健脾药(炙

黄芪 60% 党参 40%), 涩肠止泻药(石榴皮 60% 诃子 40%), 温中散寒药(吴茱萸 60% 干姜 40%), 补血药(当归 50% 白芍 50%), 辛凉解表药(柴胡 70% 菊花 30%)等 6 组中药, 对鸡人工感染艾美尔球虫的防治试验结果表明: 清热燥湿组效果最好, 抗球虫指数为 194.3; 辛凉解表组和益气健脾组具有一定效果, 抗球虫指数分别为 171.8 和 168.5; 其余 3 组基本无效, 抗球虫指数为 127.6~136.5(《中兽医学杂志》2000 年第 3 期)。

白头翁苦参汤

出自《中兽医学杂志》2000 年第 3 期。白头翁 100g 苦参 100g 金银花 50g 忍冬藤 50g 泽泻 30g 黄连 20g 广木香 20g 槟榔 20g 水煎 3 次, 合并煎液, 加入饮水中供 100 只鸡一次饮完, 连用 5 天。功能清热解毒, 燥湿止痢。主治蛋鸡大肠杆菌病, 能使产蛋率迅速回升。

白头翁苦参散

出自《中兽医医药杂志》1992 年第 4 期。白头翁 苦参 鸦胆子各等份 为末拌饲, 每羽每次 0.5~1g。功能清热燥湿, 杀虫止痢。

痢感净

出自《广东省兽药暂行质量标准》, 原名鸡痢感净散。生石膏 寒水石各 2g 穿心莲 3g 山香菜 1g 皂角刺 0.5g 雄黄 0.3g 冰片 0.2g 痢特灵 1g 为末, 鸡每公斤体重一次喂服 0.5g, 每天 2 次; 或按 1%比例混饲喂服 2 天。功能清热解毒, 杀虫。用于防治鸡球虫病和卡氏白细胞虫病。

槟榔灭绦汤

出自《中兽医医药杂志》1997 年第 1 期。槟榔 300g 贯众 280g 红石榴皮 280g 木香 300g 炒枳壳 280g 大黄 280g 茯苓 300g 泽泻 300g 煎汤, 供 1 400 只成年鸭饮服。功能杀虫驱虫, 行气健脾。主治鸡绦虫病。

鹤草根芽丸

出自《中兽医医药杂志》1983 年第 1 期, 原无方名。仙鹤草根和根上发出的芽 洗净, 晒干, 研细, 用少量面粉和水制成药重 1~2g 的粒丸。鸡每公斤体重服 1 粒, 连服 1~2 次。仙鹤草根芽亦可制成浸膏, 按每公斤体重 150mg 有效剂量内服。功能驱虫杀虫。主治鸡绦虫。

据报道, 该制剂对鸡赖利绦虫的驱虫率为 87%~100%。

南瓜子散

出自《中兽医学杂志》1989 第 4 期, 原无方名。南瓜子 100g 焙焦, 为末, 拌米饭喂 5 只成年鸡。功能驱虫。主治鸡蛔虫病。

鸡癣膏

出自《鸡谱》, 原无方名。猪脂油 125g 蜗牛 60g 川椒 60g 硫黄 30g 黄连 9g 先将脂油炼出, 将蜗牛入油内熬黄色; 次下川椒同熬, 去渣; 再将黄连、硫黄为极细末, 候油冷入内调成膏。治疗时先刷去患处白屑, 见血津为度, 然后将药膏搽之。功能润肤杀虫。主

治鸡癣。

硫黄软膏

出自《养鸡指南》。硫黄 10g 凡士林 50g 调成膏，每日 1 次涂搽患部。功能杀虫止痒。主治鸡脱羽螨。

加味三妙散

出自《中兽医医药杂志》1986 年第 4 期。黄柏 苍术各 30g 滑石 20g 石菖蒲 牛膝各 10g 苍术用米泔浸泡 4 小时，捞出文火炒干，再加黄柏同炒，炒至黄柏切面微黑即可；将滑石、牛膝、菖蒲暴晒 2~3 小时后，与前药混合，磨细过筛备用。每次 50g，混于米饭中喂服 35~40 只患鸭，每日 2 次。功能清热除湿，利水消肿。主治小鸭湿热脚肿。

本方为三妙散加石菖蒲、滑石而成。

茵陈二参散

山西省离石县验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。茵陈 连翘各 6g 桔梗 木通 苍术 柴胡 青皮 陈皮 苦参 沙参 土茯苓各 3g 升麻 2g 甘草 3g 分 2 次水煎，去渣，令其饮用 4 天。功能清热解毒，滋阴散风。主治鹦鹉脱毛症。

应激安

出自《畜禽鱼病防治新技术》。黄芪 3g 白术 1.5g 松针粉 2g 枣仁 2g 槐叶粉 1.5g 为末，饲料中添加 1%。功能益气固本，宁心安神。用于防止鸡的应激反应。

减抱方

出自《农政全书》。麻子炒熟，混饲料内喂食。功能润燥滑肠，补充营养。用于减少母鸡抱窝，促进产蛋。

【医犬猫方】

1 医脾胃病方

枯矾散

出自《中兽医医药杂志》1988年第5期。枯矾 20g 冰片 4g 共为细末，淡盐水冲洗口腔后撒患处，每次 2~5g，每日 2 次，功能敛疮消肿。主治犬口腔溃疡。

治疗中应给流食，忌酸、辛、咸等刺激。可配合维生素 B₆、维生素 C，每日 1 次，连用 3~4 日。共治 15 例，治愈 12 例。

灵仙食醋煎

出自《中兽医医药杂志》1985年第4期。威灵仙 15g 食醋 50~80ml 威灵仙为末，与食醋共煎，去渣，候温分数次缓缓灌服。功能化骨润喉。主治猫鱼骨梗喉。

乌药煎

出自《中兽医医药杂志》1985年第2期，原无方名。天台乌药 50g 煎汤去渣，候温内服。每日 1 剂，连用 2~3 剂，能行气止痛。主治犬咳嗽，支气管炎，消化不良，胃肠卡他，腹膜炎。

乌药是治犬、猫病的常用药物。《本草纲目》中说：乌药治“犬、猫百病，并可磨服。”

温中降气散

广西兽医研究所验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。砂仁 白术 山楂 麦芽 柿蒂 陈皮各 2g 各药均炒焦，为末，分 2 次水冲服。功能温中健脾，降逆止呕。主治犬呕吐，厌食。

胃肠活液

出自《中兽医医药杂志》1988年第5期。焦山楂 9g 半夏 陈皮 茯苓 干姜 甘草 神曲各 3g 水煎 2 次，去渣。合并 2 次煎液，浓缩至每 ml 含生药 0.5g，按 0.2g / 100ml 加入苯甲酸钠，10℃以下保存，保存期 10 天。用小注射器经口角缓慢灌服；每千克体重给药 4ml。功能温中健脾，消食止泻。主治猫食少，呕吐，腹泻。

据报道，用本方治疗猫胃肠炎 86 例，治愈 74 例，好转 7 例。

砂仁鱼

出自《活兽慈舟》，原无方名。砂仁 3g 鲫鱼 1 条 砂仁为细末，入鱼肚蒸熟，分 2 次服。功能温中止呕。主治猫胃寒呕吐。

椒砂散

出自《活兽慈舟》，原无方名。胡椒 5g 砂仁 3g 为细末，每日 2~4g，加少量水调服。功能温中、行气、开胃。主治猫胃寒食少。

三味乌药散

出自《活兽慈舟》，原无方名。乌药 5g 砂仁 甘草各 3g 为细末，每日 2~4g，加少量水调服，功能行气温中，止呕。主治猫胃寒呕吐。

硝黄蜜调散

出自《犬猫疾病防治》，原无方名。芒硝 大黄各 5~15g，为末，蜂蜜调和，喂服或灌

服，功能泻下通肠。主治犬、猫便秘。

依梭加(Peridale)

出自 The Veterinary Formulary——Handbook of Medicines Used in Veterinary Practice (英国皇家药物学会《兽医实用药物手册——兽医处方集》)。卵叶车前子壳(Ispaghula Husk) 颗粒剂(90%)。犬、猫 1.5~5g。功能通便。主治便秘。服药后应随时供应饮水。

培利德(Peridale)

出自 The Veterinary Formulary——Handbook of Medicines Used in Veterinary Practice (英国皇家药物学会《兽医实用药物手册——兽医处方集》)。梧桐(Stercutia) 制成胶囊或小颗粒。犬 1.5~6g(小颗粒, 98%); 猫 59~118mg(胶囊), 120mg(膏剂)。功能通便。主治便秘。

以上两方均被原著归类为容积性泻剂。它们在胃肠道能吸收水分，因而能增加粪便容积而促进肠蠕动。用于治疗慢性便秘或要避免直肠过分收缩的病例。由于此类药还能促进粪便形成块状，所以也用它来控制腹泻。

止痢煎

出自《最新实用兽医手册》，原无方名。黄连 黄柏 三颗针 大青叶 半边莲 川军 白头翁各 15g 花生米红衣 10g 煎 7 味煎汤去渣，花生米红衣为细末，混合分早晚 2 次灌服，功能清热解毒，止痢。主治猫肠炎，痢疾。

槐花灌肠汤

出自《中兽医医药杂志》1987 年第 6 期，原名槐花散加味。炒槐花 20g 侧柏叶(焙)30g 炒枳壳 10g 黑芥穗 9g 仙鹤草 10g 白及 10g 煎汤至约 100ml，候温，深部灌肠，1 日 2 次。功能清热止血，止痢。主治犬湿热泻痢。

本方是由《本事方》中的槐花散加仙鹤草，白及，并改散剂为汤剂而成，原名槐花散加味。疾病初期使用可清热解毒、燥湿、凉血止血；后期补脾摄血，可加黄芪、党参、白术、山药。

双花黄连汤

出自《中兽医医药杂志》1990 年第 5 期。金银花 30g 黄连 大黄各 20g 败酱草 蒲公英 冬瓜子 赤芍 鸡内金 各 15g 丹皮 甘草各 10g 煎汤去渣，候温灌服，功能清热解毒，化瘀止痢。主治犬热毒泻痢。

本方是由《金匱要略》中的大黄牡丹汤加减化裁而成。据辽宁省新宾县兽医卫生站介绍，用本方治疗犬胃炎 38 例，治愈 35 例。其临证加减法：腹泻重者，不用或少用大黄；便血者加白头翁，重用金银花、黄连；无潜血者，加五倍子(为末冲服)。

犬痢汤

出自《兽医大学学报》1985 年第 4 期。黄连 10g 黄芩 黄柏各 15g 苍术 枳壳各 10g

山药 栀子 半夏 竹茹 白芍 黄芪各 15g 地榆(生熟各半)30g 木香 当归 甘草各 8g 煎汤去渣, 1 日分 2 次内服, 亦可深部灌肠。功能清热燥湿, 止痢。主治犬泻痢, 细小病毒性肠炎。

据报道, 用本方及以本方为基础研制的泻痢安糖糊及泻痢安胶囊治疗犬细小病毒性肠炎 319 例, 治愈 288 例。

2 医心肺肝肾病方

金银花汤

出自《兽医常用中药及处方》, 原无方名。金银花 16g 当归 12g 蒲公英 玄参各 4g 煎汤去渣, 候温灌服。功能清热解毒, 活血利咽。主治犬咽喉肿痛, 喉疮。

参芪百合汤

出自《山东中兽医》1998 年第 1 期, 原方无名。党参 黄芪 百合各 30g 桔梗 款冬花 18g 百部 浙贝母 杏仁 枇杷叶 白及各 15g 麻黄 甘草各 5g 煎汤灌服。功能益金润肺, 止咳化痰。主治犬支气管炎。

茵陈柴胡汤

出自《山东中兽医》1998 年第 1 期, 原方无名。茵陈 30g 柴胡 30g 青皮 15g 枳实 15g 龙胆草 20g 白芍 15g 甘草 10g 煎汤灌服。功能清热除湿, 疏肝利胆。主治犬黄疸。

追风散

出自《犬猫疾病防治》。防风 荆芥穗 薄荷 蝉蜕各 15g 白芷 胆南星 天麻 升麻各 10g 僵蚕 12g 葛根 8g 煎汤去渣, 灌服。功能熄风镇惊, 主治犬猫破伤风。

用于猫时, 应酌情减量。原书云: 本方适用于破伤风初期; 中期用防风散(防风羌活 蝉蜕各 15g 胆南星 僵蚕各 12g 天麻 白芷各 10g 全蝎 川芎各 8g 细辛 红花 半夏各 5g 水煎服); 后期用天麻散(党参 黄芪 当归 金银花 连翘 天麻各 5g 玄参 僵蚕各 12g 乌蛇 胆南星 蝉蜕 全蝎各 6g 蜈蚣 3 条水煎服)。

黄连须饮

出自《中兽医学杂志》1989 年第 3 期, 原方无名。黄连须 12g 柴胡 丹参各 10g 车前子 当归 枸杞子各 5g 甘草 3g 加水煎 45 分钟, 去渣取汁, 1 日分 2~3 次服用。功能清肝, 化瘀, 明目。主治犬创伤性眼炎、肝经郁热引起的目赤肿痛。

腹皮饮

黑龙江宝清县验方, 原方无名。见于《中兽医方剂大全》。大腹皮 25g 桑白皮 20g 陈皮 10g 白术 20g 葶苈子 25g 茯苓 20g 煎汤去渣, 成 50ml, 每公斤体重 2ml 深部灌肠。功能健脾利水, 主治犬腹水。

3 医虫证疥癬方

槟蒜汤

出自《吉林畜牧兽医》1990年第3期。槟榔 30g 大蒜 30g(拍碎) 水煎去渣，候温，空腹分2次灌服，幼犬当酌情减量。功能驱虫杀虫，解毒止痢。主治犬绦虫病、钩虫病。

方中槟榔含槟榔碱，既麻痹虫体又促进肠管蠕动，使虫体排出；大蒜杀菌力强，防治虫体引起的肠道感染。二药合用，标本同治，相得益彰。本方一般只需内服1剂，病犬2~3天后即愈。用槟蒜汤治疗犬绦虫病8例、钩虫病3例，均获痊愈。其中仅有2例服药后出现唾液分泌增多，但在1小时内消失。

槟椒木香散

出自《中兽医医药杂志》1988年第1期，原无方名。槟榔 1g 花椒 0.4g 木香 0.3g 为细末，加开水 10ml，候温灌服。功能驱虫。主治猫绦虫。

原方云：服中药后2小时，再灌服10%硫酸钠 20ml、稀盐酸 2ml。

槟榔南瓜子煎

出自《兽医验方新编》，原无方名。槟榔 10g 南瓜子 15g(炒熟，捣碎) 加水 300ml 煎汤，当药汤煎到约 30ml 时，去渣，候温，按每千克体重 10ml 灌服。功能驱虫。主治犬、猫绦虫病。

狼毒硫黄油

出自《兽医验方新编》。狼毒 500g 硫黄 150g 白胡椒 150g 为细末，豆油 500g 烧开，晾凉后加上药末 50g，调匀。每用适量涂于患处，功能杀虫止痒。主治犬蠕形螨病。

百部硫黄合剂

北京农业大学验方，又名除螨合剂。见于《中兽医方剂大全》。百部 60g 硫黄 5g 食盐 1g 甘油 200ml 用 50%的乙醇 100ml 浸泡百部 24 小时，取浸液，加入硫黄、食盐、甘油，再加常水至总量 100ml。每用适量涂擦患处。用时振荡，使药物混匀。功能杀螨止痒。主治犬、猫及兔的各种螨病。

临床用本方治疗猫螨病 100 例，兔螨病 43 例，犬螨病 2 例，均治愈；治愈后患部取样镜检，螨虫消失。本方杀死兔痒螨病全部螨虫的时间(20.5 小时)比 1%敌百虫溶液(58.5 小时)要短得多。

百部液

出自《串雅兽医方》。将百部捣烂取汁，或煎汤，或用水浸液，或乙醇浸液外涂，功能杀虫。主治狗疥癬。

洗瘙汤

出自《活兽慈舟》。贯众 皂角 槟榔 青果 雄黄 硫黄 黄荆子 寒水石 共煎浓汁，外洗。功能杀虫止痒，清热除湿。主治犬毛脱皮痒。

二仙汤

出自《活兽慈舟》。仙人掌 仙茅 煎汤，合粥饲喂。功能清热除湿。主治犬皮肤瘙痒。

灭虱洗液

出自《蓄艾录》，原无方名。桃叶 苦楝树根 共捣烂，开水冲泡，取液外洗，功能杀虫。主治猫生虱。

癣螨净

出自《中国兽医杂志》2000 年第 1 期。苦参 百部各 20g 白藓皮 土茯苓各 40g 蝉蜕 10g 黄芩 15g 杭菊 15g 生甘草 5g 加水 1 500ml。蒸 15 分钟，倒出 250ml 药液作擦剂；再用文火煎 20 分钟，所得药液稀释 50~100 倍药浴 10~15 分钟。擦剂涂擦患部，每日 2 次。功能杀虫、消炎、止痒。主治犬顽固性皮肤病。

4 医杂病方

避蝇袋

出自《活兽慈舟》，原无方名。将菖蒲、黄荆切碎或为末。布袋盛装，常吊带于犬颈上，可驱臭避蝇。主治犬生蝇营。

蝇营指常在犬毛内生活的蝇，多为黄色，类似虻，吸食犬血为生。

烫伤膏

出自《活兽慈舟》。石灰水(石灰调水澄清后取上清液) 蚯蚓(焙干为末) 加入麻油搅匀，涂敷患处。功能清热止痛，消肿生肌。主治犬烫伤。

慈姑银黄煎

福州军区验方，原无方名。见于《中兽医方剂大全》。山慈姑 9g 金银花 12g 黄连 6g 黄柏 9g 白芷 6g 甘草梢 3g 煎汤去渣，候温灌服。功能清热解毒，主治犬毒蛇咬伤。

除臭煎

出自《活兽慈舟》，原无方名。密陀僧 1g 苍术 5g 甘松 5g 皂角 3g 细辛 3g 白芷 5g 煎汤去渣，混粥内饲喂。功能除湿通窍，避秽除臭。主治犬周身臭不可闻。

避疫药垫

出自《活兽慈舟》，原无方名。桃树叶 黄荆叶 菖蒲叶 贯众叶 土细辛 垫于犬窝。功能避瘟解疫。用于避犬瘟疫。

止叫方

出自《蓄艾录》。陈皮末涂犬鼻上，功能理气燥湿。主治猫叫不止。

附件

中华人民共和国兽药典

二〇〇五年版二部所载成方制剂

(所载方剂目录)

二母冬花散

二陈散

十黑散

七补散

七味胆膏散

七清败毒颗粒

八正散

三子散

三白散

三香散

大承气散

大黄末

大 黄 酊
大 黄 流 浸 膏
大 黄 碳 酸 氢 钠 片
大 戟 散
山 大 黄 末
千 金 散
小 柴 胡 散
马 钱 子 酊（番木鳖酊）
马 钱 子 流 浸 膏
天 麻 散
无 失 散
木 香 槟 榔 散
木 槲 硝 黄 散
五 皮 散
五 苓 散
五 虎 追 风 散
五 味 石 榴 皮 散
止 咳 散
止 痢 散
公 英 散
风 湿 活 血 散
乌 梅 散
六 味 地 黄 散
巴 戟 散
双 黄 连 口 服 液
甘 草 流 浸 膏
甘 草 浸 膏
甘 草 颗 粒
龙 胆 泻 肝 散
龙 胆 酊
龙 胆 碳 酸 氢 钠 片
平 胃 散
四 君 子 散
四 味 穿 心 莲 散

四 逆 汤
四 黄 止 痢 颗 粒
生 肌 散
生 乳 散
白 及 膏
白 术 散
白 龙 散
白 头 翁 散
白 矾 散
半 夏 散
加 味 知 柏 散
加 减 消 黄 散
百 合 固 金 散
当 归 苁 蓉 散
当 归 散
曲 麦 散
肉 桂 酊
朱 砂 散
伤 力 散
多 味 健 胃 散
壮 阳 散
决 明 散
阳 和 散
防 己 散
防 风 散
防 腐 生 肌 散
如 意 金 黄 散
红 花 散
远 志 酊
远 志 流 浸 膏
苍 术 香 连 散
杨 树 花 片
杨 树 花 口 服 液
扶 正 解 毒 散

牡蛎散

肝蛭散

辛夷散

补中益气散

补肾壮阳散

阿胶

陈皮酊

鸡球虫散

鸡痢灵片

鸡痢灵散

驱虫散

青黛散

板青颗粒

板蓝根片

郁金散

拨云散

金花平喘散

金荞麦片

金锁固精散

肥猪菜

肥猪散

鱼腥草注射液

定喘散

降脂增蛋散

参苓白术散

荆防败毒散

荆防解毒散

茵陈木通散

茵陈蒿散

茴香散

厚朴散

胃肠活

虾蟹脱壳促长散

钩吻末

香薷散

复方大黄酊

复方龙胆酊（苦味酊）

复方豆蔻酊

复明蝉蜕散

保胎无忧散

保健錠

促孕灌注液

独活寄生散

姜酊

姜流浸膏

洗心散

穿心莲注射液

秦艽散

泰山盘石散（泰山磐石散）

桂心散

桃花散

破伤风散

柴胡注射液

柴葛解肌散

蚌毒灵散

蚕用蜕皮液

健鸡散

健胃散

健猪散

健脾散

益母生化散

消疮散

消食平胃散

消积散

消黄散

通关散

通乳散

通肠芍药散

通 肠 散
桑 菊 散
理 中 散
理 肺 止 咳 散
理 肺 散
黄 连 解 毒 片
黄 连 解 毒 散
银 翘 散
猪 苓 散
猪 健 散
麻 杏 石 甘 片
麻 杏 石 甘 散
麻 黄 鱼 腥 草 散
麻 黄 桂 枝 散
清 肺 止 咳 散
清 肺 散
清 胃 散
清 热 健 胃 散
清 热 散
清 暑 散
清 解 合 剂
清 瘟 败 毒 片
清 瘟 败 毒 散
蛋 鸡 宝
雄 黄 散
紫 草 膏
跛 行 镇 痛 散
喉 炎 净 散
普 济 消 毒 散
温 脾 散
滑 石 散
强 壮 散
槐 花 散
蜂 螨 酊

催 奶 灵 散
催 情 散
解 暑 抗 热 散
雏 痢 净
镇 心 散
镇 喘 散
镇 痢 散
橘 皮 散
颠 茄 酊
激 蛋 散
擦 疥 散
藿 香 正 气 散

药典附录制剂通则部分内容

散剂

散剂系指一种或多种药材混合制成的粉末状制剂，分为内服散剂和外用散剂。

散剂在生产与贮藏期间均应符合下列有关规定。

一、供制散剂的药材均应粉碎。一般散剂应通过二号筛，外用散剂应通过五号筛，眼用散剂应通过九号筛。

二、散剂应干燥、疏松、混合均匀、色泽一致。如含有毒性药或贵重药时，应采用配研法混匀并过筛。

三、用于深部组织创伤及溃疡面的外用散剂，应在清洁避菌环境下配制。

四、一般散剂应密闭贮藏，含挥发性药物或易吸潮药物的散剂应密封贮藏。

【均匀度】 取供试品适量置光滑纸上，平铺约 5cm²，将其表面压平，在亮处观察，应呈现均匀的颜色，无花纹、色斑。

【水分】 取供试品照水分测定法(附录 57 页)测定。除另有规定外，不得过 10.0%。

标示装量	装量差异限度
1.0g 或 1.0g 以下	± 10%
1.0g 以上至 6g	± 8%
6g 以上至 50g	± 5%

【装量差异】 标示装量在 50g 以下(包括 50g)的内服散剂，装量差异限度应符合表中规定。

检查法 取供试品 10 袋(瓶)，分别称定每袋(瓶)内容物的重量，每袋(瓶)内容物的重量与标示装量相比较，超出装量差异限度的不得多于 2 袋(瓶)，并不得有 1 袋(瓶)超出装量差异限度一倍。

外用散剂和标示装量在 50g 以上的散剂照最低装量检查法(附录 80 页)检查，应符合规定。

胶 剂

胶剂系指动物皮、骨、甲或角用水煎取胶质，浓缩成稠胶状，经干燥后制成的固体块状内服制剂。

胶剂在生产与贮藏期间均应符合下列有关规定。

一、胶剂所用原料应用水漂洗或浸漂，除去非药用部分，切成小块或锯成小段，再漂净。

二、加水煎煮数次至煎煮液清淡为度，合并煎煮液，静置，滤过，浓缩。浓缩后的胶液在常温下应能凝固。

三、胶凝前，可按各该品种制法项下规定加入辅料(黄酒、冰糖、食用植物油等)

四、胶凝后，按规定重量切成块状，阴干。

五、胶剂应为色泽均匀、无异常臭味的半透明固体。

六、胶剂一般应制定水分、总灰分、重金属、

砷盐等项目检查。

七、胶剂宜密闭贮藏，防止受潮。

片 剂

片剂系指药材提取物、药材提取物加药材细粉或药材细粉与适宜辅料混匀压制而成的圆片状或异形片状的制剂。分为浸膏片、半浸膏片和全粉片。

片剂在生产与贮藏期间均应符合下列有关规定。

一、用于制片的药粉(膏)与辅料应混合均匀。含药量小或含有毒性药物的片剂，可根据药物的性质用适宜的方法使药物分散均匀。

二、凡属挥发性或遇热易分解的药物，在制片过程中应避免受热损失。

三、压片前的颗粒应控制水分，以适应制片工艺的需要，并防止成品在贮藏期间潮解、发霉、变质

四、片剂根据需要，可加入矫味剂、芳香剂和着色剂等附加剂。

五、为增加稳定性，掩盖药物不良臭味或改善片剂外观等，可对制成的药片包糖衣或薄膜衣。有些药物也可根据需要制成泡腾片等。

六、片剂外观应完整光洁，色泽均匀；应有适宜的硬度，以免在包装、贮运过程中发生磨损或破碎。

七、除另有规定外，片剂应密封贮存。

八、片剂应进行微生物限度的控制。

除另有规定外，片剂应进行以下相应检查。

【重量差异】 片剂重量差异限度应符合表中规定。

平均重量	重量差异限度
0.3g 以下	± 7.5%
0.3g 或 0.3g 以上	± 5%

检查法 取供试品 20 片，精密称定总重量，求得

平均片重后，再分别精密称定每片的重量，每片重量与标示片重相比较(凡无标示片重的应与平均片重相比较)，超出限度的不得多于2片，并不得有1片超出限度一倍。

糖衣片应在包衣前检查片芯的重量差异，符合上表规定后，方可包衣，包衣后不再检查重量差异。

【崩解时限】 照崩解时限检查法(附录 79 页)检查。除另有规定外，应符合规定。

锭 剂

锭剂系指药材粉末与适量粘合剂(或利用药材本身的粘性)制成不同形状的固体制剂。

锭剂在生产与贮藏期间均应符合下列有关规定。

一、作为锭剂黏合剂使用的蜂蜜、糯米粉等应按规定方法进行处理。

二、制备时，应用各该品种制法项下规定的粘合剂或利用药材本身的粘性合坨，以模制法或捏搓法成型，修整，阴干。也可用泛制法制备锭剂。

三、需包衣或打光的锭剂，应用制法项下规定的包衣材料进行包衣或打光。

四、锭剂应平整光滑、色泽一致、无皱缩、飞边、裂隙、变形及空心。

五、除另有规定外，锭剂应密闭，置阴凉干燥处贮存。

六、锭剂应进行微生物限度的控制。
除另有规定外，锭剂应进行以下相应检查。

平均重量	重量差异限度
1g 或 1g 以下	±12%
1g 以上至 2g	±10%
2g 以上至 4g	±8%
4g 以上至 6g	±7%
6g 以上至 9g	±6%
9g 以上	±5%

【重量差异】 锭剂重量差异限度应符合表中规

定。

检查法 取供试品 20 锭，精密称定总重量，求得平均锭重后，再分别精密称定每锭的重量，每锭重量与标示锭重相比较(凡无标示锭重的应与平均锭重相比较)，超出限度的不得多于2锭，并不得有1锭超出限度一倍。

颗 粒 剂

颗粒剂系指药材提取物与适宜的辅料或药材细粉制成的颗粒状制剂，分为可溶性颗粒剂、混悬性颗粒剂和泡腾性颗粒剂。

颗粒剂在生产与贮藏期间应符合下列有关规定。

一、除另有规定外，药材应按各该品种项下规定的方法进行提取、纯化、浓缩至规定相对密度的清膏，喷雾制粒或喷雾干燥，制成细粉，加适量的辅料，混匀，制成颗粒；也可将清膏加适量的辅料或药材细粉，混匀并制成颗粒。应控制辅料用量，一般前者不超过干膏量的2倍，后者不超过清膏量的5倍。

二、除另有规定外，挥发油应均匀喷入干燥颗粒中，密闭至规定时间或用B-环糊精包合后加入。

三、配制颗粒剂时可加入矫味剂和芳香剂。

四、颗粒剂应干燥、颗粒均匀、色泽一致，无吸潮、软化、结块、潮解等现象。

五、除另有规定外，颗粒剂应密封，在干燥处贮存，防止受潮。

六、颗粒剂应进行微生物限度的控制。

除另有规定外，颗粒剂应进行以下相应检查。

【粒度】 除另有规定外，照粒度测定法(附录 78 页，第二法，双筛分法)测定，不能通过一号筛和能通过五号筛的总和，不得过 15.0%。

标示装量	装量差异限度
1.0g 或 1.0g 以下	±10%
1.0g 以上至 1.5g	±8%

1.5g 以上至 6g	± 7%
6g 以上至 50g	± 5%

【水分】照水分测定法(附录 57 页)测定。除另有规定外，不得过 6.0%。

【溶化性】取供试品 10g，加热水 200ml，搅拌 5 分钟，立即观察，应全部溶化或呈混悬状。可溶性颗粒剂应全部溶化，允许有轻微浑浊；混悬性颗粒剂应能混悬均匀；泡腾颗粒剂遇水时应能迅速产生气体并呈泡腾状。颗粒剂均不得有焦屑等异物。

【装量差异】颗粒剂装量差异限度应符合表中规定。

检查法 取供试品 10 袋(瓶)，分别称定每袋(瓶)内容物的重量，每袋(瓶)内容物的重量与标示装量相比较(凡无标示装量应与平均装量相比较)，超出限度的不得多于 2 袋(瓶)，并不得有 1 袋(瓶)超出限度一倍。

标示装量在 50g 以上的颗粒剂照最低装量检查法(附录 80 页)检查，应符合规定。

软 膏 剂

软膏剂系指药物、药材细粉、药材提取物与适宜基质混合制成的半固体外用制剂。常用基质分为油脂性、水溶性和乳剂型基质。其中用乳剂型基质的亦称乳膏剂。

软膏剂在生产与贮藏期间均应符合下列有关规定。

一、供制备软膏剂用的固体药物，除能溶解或相互共熔于某一组分外，应预先用适宜的方法制成最细粉。

二、软膏剂应均匀、细腻、具有适当的粘稠性，易涂布在皮肤或粘膜上并无刺激性，必要时可加入保湿剂和透皮吸收促进剂。

三、油脂性基质常用的有凡士林、石蜡、液状石蜡、硅油、蜂蜡、硬脂酸等；水溶性基质主要有聚乙二醇、淀粉甘油；乳剂型基质常用的有钠皂、

脂肪醇硫酸酯(钠)类等。必要时可加入保湿剂、防腐剂、抗氧剂或透皮促进剂。

四、软膏剂应无酸败、变色、变硬、融化、油水分离等变质现象，必要时可加适量防腐剂或抗氧剂。

五、软膏剂所用的包装材料不得与药物或基质发生理化反应。

六、除另有规定外，软膏剂应置遮光、密闭贮存。

除另有规定外，软膏剂应进行以下相应检查。

【装量】照最低装量检查法(附录 80 页)检查，应符合规定。

【无菌】用于烧伤或严重创伤的软膏剂，照无菌检查法(附录 82 页)检查，应符合规定。

【微生物限度】照微生物限度检查法(附录 87 页)检查，应符合规定。

流浸膏剂与浸膏剂

流浸膏剂或浸膏剂系指药材用适宜的溶剂提取，蒸去部分或全部溶剂，调整浓度至规定标准而制成的制剂。

流浸膏剂

流浸膏剂在生产与贮藏期间均应符合下列有关规定。

一、除另有规定外，流浸膏剂每 1ml 相当于原药材 1g。浸膏剂每 1g 相当于原药材 2~5g。

二、除另有规定外，流浸膏剂用渗漉法制备，亦可用浸膏剂加规定溶剂稀释制成。浸膏剂用煎煮法或渗漉法制备，全部煎煮液或渗漉液应低温浓缩至稠膏状，加稀释剂或继续浓缩至规定的量。

渗漉法的要点如下：

(1) 根据药材的性质可选用圆柱形或圆锥形的渗漉器：

(2) 药材须适当粉碎后，加规定的溶剂均匀湿润，密闭放置一定时间，再装入渗漉器内；

(3) 药材装入渗漉器时应均匀，松紧一致，加入溶剂时应尽量排除药材间隙中的空气，溶剂应高出药材面，浸渍适当时间后进行渗漉；

(4) 渗漉速度应符合各该流浸膏项下的规定；

(5) 收集 85% 药材量的初漉液另器保存，续漉液经低温浓缩后与初漉液合并，调整至规定量，静置，取上清液分装。

三、流浸膏剂一般应制定乙醇量。久置若产生沉淀时，在乙醇和有效成分含量符合各该品种项下规定的情况下，可滤过除去沉淀。

四、除另有规定外，应置遮光容器内密封，流浸膏剂应置阴凉处贮藏。

除另有规定外，流浸膏剂、浸膏剂应进行以下相应检查。

【装量】照最低装量检查法(附录 80 页)检查，应符合规定。

【微生物限度】照微生物限度检查法(附录 87 页)检查，应符合规定。

酊 剂

酊剂系指药物用规定浓度的乙醇提取或溶解而制成的澄清液体制剂，亦可用流浸膏稀释制成。

酊剂在生产与贮藏期间均应符合下列有关规定。

一、除另有规定外，含有毒性药的酊剂，每 100ml 应相当于原药物 10g；其他酊剂，每 100ml 相当于原药物 20g。

二、酊剂可用溶解法、稀释法、浸渍法或渗漉法制备。

(1) 溶解法或稀释法取药物粉末或流浸膏，加规定浓度的乙醇适量，溶解或稀释，静置，必要时滤过，即得。

(2) 浸渍法取适当粉碎的药材，置有盖容器中，加入溶剂适量，密盖，搅拌或振摇，浸渍 3~5 日或规定的时间，倾取上清液，再加入溶剂适量，依

法浸渍至有效成分充分浸出，合并浸出液，加溶剂至规定量后，静置 24 小时，滤过，即得。

(3) 渗漉法 照流浸膏剂项下的方法(附录 7 页)，用溶剂适量渗漉，至流出液达到规定量后，静置，滤过，即得。

三、酊剂应检查乙醇量。

四、酊剂久置产生沉淀时，在乙醇和有效成分含量符合各该品种项下规定的情况下，可滤过除去沉淀。

五、酊剂应置遮光容器内密封，在阴凉处贮藏。

除另有规定外，酊剂应进行以下相应检查。

【甲醇量检查法】照甲醇量检查法(附录 54 页)检查，应符合规定。

【装量】照最低装量检查法(附录 59 页)检查，应符合规定。

【微生物限度】照微生物限度检查法(附录 87 页)检查，应符合规定。

合剂(口服液)

合剂系指药材用水或其他溶剂，采用适宜方法提取、纯化、浓缩制成的内服液体制剂(又称“口服液”)。

合剂在生产与贮藏期间均应符合下列有关规定。

一、药材应按各品种项下规定的方法提取、纯化、浓缩至规定的相对密度；含有挥发性成分的药材宜先提取挥发性成分，再与余药共同煎煮。

二、合剂应在清洁避菌的环境中配制，及时灌装于无菌的洁净干燥容器中。

三、合剂中可加入适宜的附加剂，其品种与用量应符合国家标准的有关规定，不得影响制品的稳定性，应避免对检验产生干扰。必要时亦可加入适量的乙醇。

四、合剂若加蔗糖作为附加剂，除另有规定外，

其含蔗糖量不得高于 20% (g/ml)。

五、除另有规定外，合剂应澄清。不得有酸败、异臭、产生气体或其他变质现象。

六、一般应制定相对密度、pH 值等检查项目。

七、合剂应密封、置阴凉处贮藏。在贮藏期间允许有少量轻摇易散的沉淀。

【装量】 照最低装量检查法(附录 80 页)检查，应符合规定。

【微生物限度】照微生物限度检查法(附录 87 页)检查，应符合规定。

灌 注 剂

灌注剂系指药材提取物、药物以适宜的溶剂制成的供子宫、乳房等灌注的灭菌液体制剂。分为溶液型、混悬型和乳浊型。

灌注剂在生产与贮藏期间应符合下列有关规定。

一、除另有规定外，药材应按各该品种项下规定的方法提取、纯化或用适宜的方法粉碎成规定的粒度要求。

二、灌注剂应在洁净环境下配制。各种用具及容器均需用适当方法清洗干净并进行灭菌，在整个操作过程中应注意避免污染，必要时可加抑菌剂等附加剂。

三、配制灌注剂的溶剂和附加剂应符合注射剂项下对溶剂和附加剂的规定。

四、除另有规定外，灌注剂应适当调节 pH 值与渗透压，一般 pH 值应为 5.5~7.5。

五、溶液型灌注剂应澄清，不得有沉淀和异物。混悬型灌注剂中的颗粒应细腻，均匀分散，放置后其沉淀物不得结块，振摇后一般应在数分钟内不分层。乳浊型灌注剂应分布均匀。

六、灌装后，一般应根据药物性质选用适宜的方法和条件及时灭菌，以保证制成品无菌。

七、灌注剂应密封、遮光贮藏。

【装量】 照最低装量检查法(附录 80 页)检查，应符合规定。

【无菌】 照无菌检查法项下的方法(附录 82 页)检查，应符合规定。

注 射 剂

中药注射剂系指从药材中提取的有效物质制成的可供注入动物体内的灭菌溶液或乳状液，以及供临用前配成溶液的无菌粉末或浓溶液。

用时需加适当溶剂溶解使用的注射剂，其名称中应冠以“注射用”的文字。

注射剂在生产与贮藏期间均应符合下列有关规定。

一、除另有规定外，药材应按各该品种项下规定的方法提取、纯化、制成半成品，以半成品投料，配制符合规定的注射剂。

二、溶剂 注射剂所用的溶剂必须安全无害，并不得影响疗效和质量。

溶剂分为水性溶剂和非水性溶剂两种类型，并应符合下列条件。

(1) 水性溶剂 最常用的水性溶剂为注射用水，亦可用 0.9%氯化钠溶液或其他适宜的水溶液。

(2) 非水性溶剂 常用的非水性溶剂为植物油，应精制使符合下列规定。

①应无异臭、无酸败味；除另有规定外，色泽不得深于黄色 6 号标准比色液，在 10℃时应保持澄明。

②碘值为 79~128；皂化值为 185~200；酸值不大于 0.56。

其他还有乙醇、丙二醇、聚乙二醇等的水溶液。

三、附加剂 配制注射剂时，可按药物的性质加入适宜的附加剂。附加剂一般有渗透压调节剂、pH 调节剂、增溶剂、抗氧剂、抑菌剂等。抗氧剂有亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、焦亚硫酸钠、半胱氨酸等。常用的抑菌剂及其浓度(g/ml)

为苯酚 0.5%、甲酚 0.3%、三氯叔丁醇、0.5%等。抑菌剂用量应能抑制注射液内微生物的生长。加有抑菌剂的注射液，仍应用适宜的方法灭菌。注射量超过 5ml 的注射液，添加的抑菌剂必须特别审慎选择。

四、容器 注射剂常用容器有玻璃安瓿、玻璃瓶、塑料瓶(袋)等，容器除另有规定外，应符合国家标准中有关药用玻璃容器和塑料容器的规定。容器所用胶塞和隔离膜亦应符合有关规定。

五、配制 注射液的配制应遵守有关规程，容器应洁净干燥灭菌后使用。

配制注射用油溶液时，应先将精制油在 150℃干热灭菌 1~2 小时，并放冷至适宜的温度。

注射剂在配制过程中，应严密防止微生物的污染及药物的变质。已调配的药液应在当日内完成灌装、灭菌，如不能在当日内完成，必须将药液在不变质与不易繁殖微生物的条件下保存。

六、灌装 配制后的药液应立即灌装，接触空气易变质的药物，在灌装过程中，应排除容器内空气，可填充二氧化碳或氮等气体，立即用适宜的方法熔封或严封。

标示装量 / ml	增加量 / ml	
	易流动液	粘稠液
0.5	0.10	0.12
1	0.10	0.15
2	0.15	0.25
5	0.30	0.50
10	0.50	0.70
20	0.60	0.90
50	1.0	1.5

七、灭菌 熔封或严封后，一般应根据药物性质选用适宜的方法和条件及时灭菌，以保

证制成品无菌。

八、检漏 熔封的注射剂在灭菌时或灭菌后，应采用减压法或其他适宜的方法进行容器检漏。

九、贮藏 注射剂除应遮光贮藏外，并应按规定的条件贮藏。

十、配制注射剂前的半成品，应检查重金属、砷盐，除另有规定外，含重金属不得过百万分之十(附录 40 页第二法)；含砷盐不得过百万分之二(附录 42 页第一法)。本检查须进行有机破坏。

【装量差异】 灌装注射液时，应按表中适当增加装量，以保证注射用量不少于标示量。除另有规定外，供多次用量的注射液，每一容器的装量不得超过 10 次注射量，增加装量应能保证每次注射用量。

【检查法】 注射液的标示装量为 2ml 或 2ml 以下者取供试品 5 支，2ml 以上至 10ml 者取供试品 3 支，10ml 以上者取供试品 2 支；开启时注意避免损失，将内容物分别用相应体积的干燥注射器抽尽，然后注入标化的量具内，在室温下检视；测定油溶液的装量时，应先加温摇匀，再用干燥注射器抽尽后，同前法操作，放冷至室温检视。每支注射液的装量均不得少于其标示量。

注射液规格为 50ml 以上至 500ml 的照最低装量检查法(附录 80 页)检查，应符合规定。

【澄明度】 除另有规定外，照《澄明度检查细则和判断标准》的规定检查，应符合规定。

【不溶性颗粒】除另有规定外，溶液型静脉注射液、静脉注射液用无菌粉末及注射用浓溶液照不溶性微粒检查法(附录 68 页)检查，应符合规定。

【有关物质】按各品种项下规定，照注射剂有关物质检查法(附录 71 页)检查，应符合规定。

【无菌】 照无菌检查法项下的方法(附录 82 页)检查，应符合规定。

【热原】除另有规定外，静脉用注射剂按各品种项

下的规定，照热原检查法（附录 81 页）检查，应符合规定。

附：2005 年版兽药典所用药筛，选用国家标准的 R40 / 3 系列，分等如下：

筛号	筛孔内径(平均值)	目号
一号筛	2000μ m±70μ m	10 目
二号筛	850μ m ± 29μ m	24 目
三号筛	355μ m±13μ m	50 目
四号筛	250μ m±9. 9μ m	65 目
五号筛	180μ m±7. 6μ m	80 目
六号筛	150μ m±6. 6μ m	100 目
七号筛	125μ m± 5. 8μ m	120 目
八号筛	90μ m ±4. 6μ m	150 目
九号筛	75μ m ±4. 1μ m	200 目

粉末分等如下：

最粗粉 指能全部通过一号筛，但混有能通过三号筛不超过 20%的粉末；

粗 粉 指能全部通过二号筛，但混有能通过

四号筛不超过 40% 的粉末；

号筛不少于 95% 的粉末。

中 粉 指能全部通过四号筛，但混有能通过五号筛不超过 60% 的粉末；

细 粉 指能全部通过五号筛，并含能通过六号筛不少于 95% 的粉末；

最细粉 指能全部通过六号筛，并含能通过七号筛不少于 95% 的粉末；

极细粉 指能全部通过八号筛，并含能通过九

附录：常用药对

解表类：

桂枝、白芍：一散一敛，调和营卫，使表邪得解，里气得和。主治风寒表虚证。

桂枝、附子：温经散寒，宣痹止痛。治风寒湿痹，腰背四肢疼痛。

麻黄、桂枝：发汗解表，宣肺平喘。主治外感风寒表实证。

生姜、大枣：和中健脾，调和营卫。是治外感方的辅助药。

荆芥、防风：发汗解表，祛风胜湿。作用平和，风寒、风热、外感均可用。

防风、防己：祛风胜湿，除痹止痛。治风寒湿邪引起的痹证疼痛。不论前后肢关节肌肉疼痛，均可加入方中。

羌活、防风：发散风寒，胜湿止痛。

羌活、独活：发散风寒，胜湿止痛。通治一身上下风寒湿邪。

清热类：

石膏、知母：清热泻火，除烦止渴。

知母、贝母：名二母散。滋阴润肺，清热化痰。治肺热咳嗽或阴虚燥咳痰稠。

知母、黄柏：滋阴降火。

黄连、肉桂：名交泰丸。泻心温肾交通水火。治心肾不交，怔忡。

黄柏、苍术：名二妙散。清热燥湿，治湿热下注，筋骨疼痛，湿热带下，小便短黄，苔黄腻。

生地、玄参：滋阴清热，润燥通肠。

银花、连翘：清热解毒。适于一切热毒及热性病各期。

青蒿、鳖甲：清热凉血，滋阴退热。

泻下类：

大黄、芒硝：泻热通腑，治肠道积滞，大便秘结，或热毒内结。

大黄、桃仁：活血消肿，通经止痛。

祛风湿类：

独活、寄生：祛风湿，止痹痛，强腰膝，壮筋骨。治肝肾不足之腰膝疼痛。

防己、黄芪：益气消肿，治四肢肿胀，朝轻暮重而气虚者。

桑寄生、川续断：补肾强腰，治肾亏腰痛，及肾虚引起的胎动不安或治腰肌劳损。

五加皮、木瓜：补肝肾，强筋骨。

秦艽、灵仙、络石藤：治筋骨痹痛。

防己、薏苡仁、蚕沙：适于湿热痹痛，肢体不遂。

马钱子、地龙：名龙马自来丹。治风湿痹痛，筋脉拘挛。

秦艽、薏苡仁、萆薢：治湿热痹痛。

川乌、草乌、地龙：治寒痹。

青风藤、海风藤：祛风湿，通经络，止痹病，治风湿痹痛，关节不利，筋脉拘挛，肢节及腰肢疼痛。多入复方。

芳香化湿类：

苍术、厚朴：健脾燥湿，行气消胀。对痰饮水肿都有效。

藿香、佩兰：化湿和中，解表散寒。

藿香、半夏：芳香化湿，和中止呕。治脾胃湿浊呕吐。

利水渗湿类：

茯苓、白术：健脾利湿，治小便不利、水肿、停饮。

猪苓、泽泻：利水渗湿，治小便不利，水肿，药性平和。

木通、王不留行：通络下乳。

温里类药对：

附子、干姜：回阳救逆，补火助阳。治亡阳症，冷汗自出，四肢厥逆。

附子、肉桂：补火助阳。在此基础上再加六味地黄丸名八味丸，可温补肾阳。

附子、桂枝：温经散寒，宣痹止痛。

理气类药对：

陈皮、半夏：和胃降逆，止嗽化痰。

青皮、陈皮：疏肝行气，散结消滞。

佛手、香橼：疏肝理气，和中化痰。

木香、砂仁：温中散寒，行气止痛。

消食类药对：

谷芽、麦芽：消食和中，健脾开胃。治食积停滞，消化不良。

山楂、神曲：健脾和胃，消食化积。治食积胀满，腹痛泄泻。

活血祛瘀类药对：

乳香、没药：活血止痛，消肿生肌。疮家圣药，伤科要药。

三棱、莪术：破血祛瘀，行气止痛。

桃仁、红花：活血祛瘀，通络止痛。

五灵脂、蒲黄：名失笑散。活血祛瘀，散结止痛。

穿山甲、王不留：通经下乳。

化痰止咳平喘类药对：

南星、防风：名夺命散。祛风化痰，解痉止痛。治破伤风，狂犬咬伤。

南星、枳实：燥湿化痰，行气开瘀。

白附子、僵蚕：祛风化痰解痉，治风证瘫痪。再加全虫名牵正散，治面部神经麻痹。

安神类药对：

磁石、硃砂：重镇安神，潜阳明目。

龙骨、牡蛎：平肝潜阳，镇静安神。另可收涩固敛。再加沙苑子、芡实、莲须名金锁固精丸，可补肾涩精。

酸枣仁、柏子仁：养心安神，治血虚烦躁，惊悸怔忡。

远志、菖蒲：宁心安神，开窍益智。治心神不安，惊悸。

平肝熄风类药对：

天麻、钩藤：平肝潜阳，熄风止痉。

全虫、蜈蚣：名止痉散。息风止痉，通络止痛。

全虫、白僵蚕：熄风止痉，通络化痰。

天麻、川芎：名天麻丸。平肝潜阳，熄风止痛。

补益类药对：

人参、附子：名参附汤。大补元气，回阳救逆。

人参、白术：健脾气，补肺气，益心气。

人参、当归：益气补血，治气血不足诸症。

人参、熟地：名两仪膏。益气补血。

党参、黄芪：补中益气，益肺升阳。

黄芪、白术：益气健脾，固表止汗。治脾气虚弱，食少便溏。

黄芪、桂枝：益气温经，和脉通痹。治血痹证，肌肤麻木不仁。

仙茅、仙灵脾：温肾壮阳，祛寒除痹。治阳萎精冷，腰膝冷痛。

川断、狗脊：补肝肾，强腰膝。入独活寄生汤加强强腰止痛的功效。

补骨脂、肉豆蔻：名二神丸。温补脾肾，涩肠止泻，治五更泻。

杜仲、寄生：补益肝肾。

熟地、菟丝子：名双补丸。可滋阴补血，补益肝肾，益精填髓。

熟地、玄参：名玄菟丹。滋阴清热，降火解毒。

肉苁蓉、锁阳：补肾助阳，润肠通便。

当归、熟地、白芍、川芎：名四物汤。补血活血。

当归、川芎：名芎归汤。养血活血，行气止痛。

天冬、麦冬：名二冬膏。润肺养阴，清心除烦。治咳嗽，口干咽燥。

天冬、生地、人参：名三才汤。清热滋阴，生津止渴。治气阴两伤之证。

枸杞、菊花：滋补肝肾，益精明目。

枸杞子、菟丝子：治肝阴亏所致的各种眼病。

墨旱莲、女贞子：名二至丸。补肾养肝，治肝肾阴虚。

龟板、熟地：滋阴潜阳，治肝肾不足，虚火上炎。再加黄柏、知母名大补阴丸，滋阴降火，治骨蒸潮热，盗汗遗精，心烦易怒，足膝痛热或痿软。

收涩类药对：

芡实、金樱子：名水陆二仙丹，补肾涩精。治遗精，白浊，尿频，带下。

桑螵蛸、益智仁：补肾助阳，固涩缩尿。治肾虚阳衰引起的尿频。

2005 年兽药典所载处方及构成

二 母 冬 花 散 (知母 30g 浙贝母 30g 款冬花 30g
桔梗 25g 苦杏仁 20g 马兜铃 20g 黄芩 25g 桑白皮 25g
白药子 25g 金银花 30g 郁金 20g)
二 陈 散 (半夏 (姜制) 45g 陈皮 50g 茯苓 30g 甘草 15g)
十 黑 散 (知母 30g 黄柏 25g 栀子 25g 地榆 25g 槐花

20g 蒲黄 25g 侧柏叶 20g 棕板 25g 杜仲 25g 血余炭 15g)
七 补 散 (党参 30g 白术 (炒) 30g 茯苓 30g 甘草 25g
黄芪 (炙) 30g 山药 25g 酸枣仁 (炒) 25g 当归 30g
秦艽 30g 陈皮 20g 川楝子 25g 香附 (醋炙) 25g 麦芽 30g)
七 味 胆 膏 散 (胆膏 50g 连翘 150g 木鳖子 125g
麦冬 100g 香附 200g 关木通 50g 丹参 80g)
七 清 败 毒 颗 粒 (黄芩 100g 虎杖 100g 白头翁 80g 苦
参 80g 板蓝根 100g 绵马贯众 60g 大青叶 40g)
八 正 散 (关木通 30g 瞿麦 30g 萹蓄 30g 车前子 30g
滑石 60g 甘草 25g 栀子 (炒) 30g 大黄 (酒制) 30g
灯心草 15g)

三子散（诃子 200g 川楝子 200g 梔子 200g）
三白散（玄明粉 400g 石膏 300g 滑石 300g）
三香散（丁香 25g 木香 45g 藿香 45g 青皮 30g 陈皮 45g 槟榔 15g 牵牛子（炒）45g）
大承气散（大黄 60g 厚朴 30g 枳实 30g 玄明粉 180g）
大黄末（本品为大黄制成的散剂。）
大黄酊（本品为大黄经过加工制成的酊剂。每 1ml 相当于原生药 0.2g。）
大黄流浸膏（本品为大黄加工制成的流浸膏。）
大黄碳酸氢钠片（本品含碳酸氢钠（ NaHCO_3 ）应为标示量的 90.0% ~110.0%。）
大戟散（京大戟 30g 滑石 90g 甘遂 30g 牵牛子 60g 黄芪 45g 玄明粉 200g 大黄 60g）
山大黄末（本品为大黄制成的散剂。）
千金散（蔓荆子 20g 旋覆花 20g 僵蚕 20g 天麻 25g 乌梢蛇 25g 南沙参 25g 桑螵蛸 20g 何首乌 25g 天南星（制）25g 防风 25g 阿胶 20g 川芎 15g 羌活 25g 蝉蜕 30g 细辛 10g 全蝎 20g 升麻 25g 藿香 20g 独活 25g）
小柴胡散（柴胡 45g 黄芩 45g 姜半夏 30g 党参 45g 甘草 15g）

马钱子酊（番木鳖酊）（本品为马钱子流浸膏经加工制成的酊剂。）

马钱子流浸膏（本品为马钱子经过加工制成的流浸膏。）

天麻散（天麻 30g 党参 45g 防风 25g 荆芥 30g 薄荷 30g 何首乌（制）30g 茯苓 45g 甘草 25g 川芎 25g 蝉蜕 30g）

无失散（槟榔 20g 牵牛子 45g 郁李仁 60g 木香 25g 关木通 20g 青皮 30g 三棱 25g 大黄 75g 玄明粉 200g）

木香槟榔散（木香 15g 槟榔 15g 枳壳（炒）15g 陈皮 15g 青皮（醋制）50g 香附（醋制）30g 三棱 15g 莪术（醋制）15g 黄连 15g 黄柏（酒炒）30g 大黄 30g 牵牛子（炒）30g 玄明粉 60g）

木槟硝黄散（槟榔 30g 大黄 90g 玄明粉 110g 木香 30g）

五皮散（桑白皮 30g 陈皮 30g 大腹皮 30g 姜皮 30g 茯苓皮 30g）

五苓散（茯苓 100g 泽泻 200g 猪苓 100g 肉桂 50g 白术（炒）100g）

五虎追风散（僵蚕 15g 天麻 30g 全蝎 15g 蝉蜕 150g 天南星（制）30g）

五味石榴皮散（石榴皮 30g 红花 25g 益智仁 35g

肉桂 30g 萆薢 25g）

止咳散（知母 25g 枳壳 20g 麻黄 15g 桔梗 30g 苦杏仁 25g 葶苈子 25g 桑白皮 25g 陈皮 25g 生石膏 30g 前胡 25g 射干 25g 枇杷叶 20g 甘草 15g）

止痢散（雄黄 40g 藿香 110g 滑石 150g）

公英散（蒲公英 60g 金银花 60g 连翘 60g 丝瓜络 30g 通草 25g 芙蓉叶 25g 浙贝母 30g）

风湿活血散（羌活 15g 独活 15g 广防己 15g 防风 10g 荆芥 10g 当归 10g 红花 10g 威灵仙 10g 桂枝 15g 秦艽 10g 槲寄生 10g 续断 20g 苍术 10g 川楝子 10g 香加皮 15g）

乌梅散（乌梅 15g 柿饼 24g 黄连 6g 姜黄 6g 诃子 9g）

六味地黄散（熟地黄 70g 山茱萸（制）35g 山药 35g 牡丹皮 30g 茯苓 30g 泽泻 30g）

巴戟散（巴戟天 30g 小茴香 30g 槟榔 12g 肉桂 25g 陈皮 25g 肉豆蔻（煨）20g 肉苁蓉 25g 川楝子 20g 补骨脂 30g 胡芦巴 30g 关木通 15g 青皮 15g）

双黄连口服液（金银花 375g 黄芩 375g 连翘 750g）

甘草流浸膏（本品为甘草浸膏经加工制成的流浸膏。）

甘草浸膏（本品为甘草经加工制成的浸膏。）

甘草颗粒（本品为甘草流浸膏经加工制成的颗粒。）

龙胆泻肝散（龙胆 45g 车前子 30g 柴胡 30g 当归 30g 梔子 30g 生地黄 45g 甘草 15g 黄芩 30g 泽泻 45g 关木通 20g）

龙胆酊（本品为龙胆经加工制成的酊剂。）

龙胆碳酸氢钠片（龙胆 100g 碳酸氢钠 150g）

平胃散（苍术 80g 厚朴 50g 陈皮 50g 甘草 30g）

四君子散（党参 60g 白术（炒）60g 茯苓 60g 甘草（炙）30g）

四味穿心莲散（穿心莲 450g 辣蓼 150g 大青叶 200g 葫芦茶 200g）

四逆汤（附子（制）300g 干姜 200g 甘草（炙）300g）

四黄止痢颗粒（黄连 200g 黄柏 200g 大黄 100g 黄芩 200g 板蓝根 200g 甘草 100g）

生肌散（血竭 30g 赤石脂 30g 乳香（制）30g 龙骨（煨）30g 冰片 10g 没药（制）30g 儿茶 30g）

生乳散（黄芪 30g 党参 30g 当归 45g 通草 15g 川芎 15g 白术 30g 续断 25g 木通 15g 甘草 15g 王不留行 30g 路路通 25g）

白及膏（白及 210g 乳香 30g 没药 30g）

白术散（白术 30g 当归 25g 川芎 15g 党参 30g 甘草 15g 砂仁 20g 熟地黄 30g 陈皮 25g 紫苏梗 25g 黄芩 25g 白芍 20g 阿胶（炒）30g）

白龙散（白头翁 600g 龙胆 300g 黄连 100g）

白头翁散（白头翁 60g 黄连 30g 黄柏 45g 秦皮 60g）

白矾散（白矾 60g 浙贝母 30g 黄连 20g 白芷 20g 郁金 25g 黄芩 45g 大黄 25g 葶苈子 30g 甘草 20g）

半夏散（半夏（制）30g 升麻 45g 防风 25g 桔矾 45g）

加味知柏散（知母（酒炒）120g 黄柏（酒炒）120 g 木香 20g 乳香（制）25g 没药（制）25g 连翘 20g 桔梗 20 g 金银花 30g 荆芥 15g 防风 15g 甘草 15g）

加减小黄散（大黄 30g 玄明粉 40g 知母 25g 浙贝母 30 g 黄药子 30g 栀子 30g 连翘 45g 白药子 30g 郁金 45g 甘草 15g）

百合固金散（百合 45g 白芍 25g 当归 25g 甘草 20g 玄参 30g 川贝母 30g 生地黄 30g 熟地黄 30g 桔梗 25g 麦冬 30g）

当归苁蓉散（当归（麻油炒）180g 肉苁蓉 90g 番泻叶 45g 瞿麦 15g 六神曲 60g 木香 12g 厚朴 45g 枳壳 30g 香附（醋制）45g 通草 12g）

当归散（当归 30g 红花 25g 牡丹皮 20g 白芍 20g 没药（制）25g 大黄 30g 天花粉 25g 枇杷叶 20g 黄药子 25 g 白药子 25g 桔梗 25g 甘草 15g）

曲麦散（六神曲 60g 麦芽 30g 山楂 30g 厚朴 25g 枳壳 25g 陈皮 25g 青皮 25g 苍术 25g 甘草 15g）

肉桂酊（本品为肉桂经加工制成的酊剂。）

朱砂散（朱砂 5g 党参 60g 茯苓 45g 黄连 60g）

伤力散（党参 50g 白术（炒焦）40g 茯苓 30g 黄芪 50 g 山药 50g 当归 50g 陈皮 50g 秦艽 30g 香 40g 甘草 40g）

多味健胃散（木香 25g 槟榔 20g 白芍 25g 厚朴 20g 枳壳 30g 黄柏 30g 苍术 50g 大黄 50g 龙胆 30g 焦山楂 40 g 香附 50g 陈皮 50g 大青盐（炒）40g 苦参 40g）

壮阳散（熟地黄 45g 补骨脂 40g 阳起石 20g 淫羊藿 45g 锁阳 45g 菟丝子 40g 五味子 30g 肉苁蓉 40g 山药 40g 肉桂 25g 车前子 25g 续断 40g 覆盆子 40g）

决明散（石决明（煅）30g 决明子 30g 栀子 20g 大黄 25 g 黄芪 30g 郁金 20g 黄芩 30g 马尾连 25g 没药（制）20 g 白药子 20 g 黄药子 20g）

阳和散（熟地黄 90g 鹿角胶 30g 白芥子 20g 肉桂 20g 干姜（炮）20g 麻黄 10g 甘草 20g）

防己散（防己 25g 黄芪 30g 茯苓 25g 肉桂 30g 胡芦巴 20g 厚朴 15g 补骨脂 30g 泽泻 45g 猪苓 25g 川楝子 25g 巴戟天 25g）

防风散（防风 30g 独活 25g 连翘 15g 升麻 25g 柴胡 20 g 附子（制）15g 乌药 20g 羌活 25g 当归 25g 甘草 15g 葛根 20g 山药 25g）

防腐生肌散（桔矾 30g 陈石灰 30g 血竭 15g 乳香 15 g 没药 25g 煅石膏 25g 铅丹 3g 冰片 3g 轻粉 3g）

如意金黄散（天花粉 60g 黄柏 30g 大黄 30g 姜黄 30g

白芷 30g 厚朴 12g 苍术 12g 甘草 12g 陈皮 12g 生天南星 12g）

红花散（红花 20g 没药（制）20g 桔梗 20g 六神曲 30 g 枳壳 30g 当归 30g 山楂 30g 厚朴 20g 陈皮 25g 甘草 15g 白药子 25g 黄药子 25g 麦芽 30g）

远志酊（本品为远志流浸膏经加工制成的酊剂。）

远志流浸膏（本品为远志经加工制成的流浸膏。）

苍术香连散（黄连 30g 木香 20g 苍术 20g）

杨树花片（本品为杨树花浸膏与杨树花粉末压制成的片剂。每片相当于生药杨树花 0.3g。）

杨树花口服液（本品为杨树花经提取制成的合剂。每 1ml 相当于原生药 1g。）

扶正解毒散（板蓝根 60g 黄芪 60g 淫羊藿 30g）

牡蛎散（牡蛎 60g 黄芪 60g 麻黄根 30g 浮小麦 120g）

肝蛭散（绵马贯众 60g 槟榔 24g 苏木 25g 肉豆蔻 25g 茯苓 25g 龙胆 25g 木通 25g 甘草 25g 厚朴 25g 泽泻 25g）

辛夷散（辛夷 60g 知母（酒制）30g 黄柏（酒制）30g 北沙参 30g 木香 15g 郁金 30g 明矾 20g）

补中益气散（黄芪（炙）35g 熟地黄 30g 胡芦巴 25g 远志 35g 丁香 20g 巴戟天 30g 锁阳 35g 菟丝子 35g 五味子 35g 蛇床子 35g 韭菜子 35g 覆盆子 35g 沙苑子 35g 肉苁蓉 30g 莲须 30g 补骨脂 20g）

补肾壮阳散（淫羊藿 35g 熟地黄 30g 胡芦巴 25g 远志 35g 丁香 20g 巴戟天 30g 锁阳 35g 菟丝子 35g 五味子 35g 蛇床子 35g 韭菜子 35g 覆盆子 35g 沙苑子 35g 肉苁蓉 30g 莲须 30g 补骨脂 20g）

阿胶（本品为驴皮经煎煮、浓缩制成的固体胶）

陈皮酊（本品为陈皮经加工制成的酊剂。）

鸡球虫散（青蒿 3000g 仙鹤草 500g 何首乌 500g 白头翁 300g 肉桂 260g）

鸡痢灵片（雄黄 10g 藿香 10g 滑石 10g 白头翁 5g 黄柏 10g 马尾连 15g 诃子 15g 马齿苋 15g）

鸡痢灵散（雄黄 10g 藿香 10g 滑石 10g 白头翁 15g 黄柏 10g 马尾连 15g 诃子 15g 马齿苋 15g）

驱虫散（鹤虱 30g 使君子 30g 槟榔 30g 芜荑 30g 雷丸 30g 绵马贯众 60g 干姜（炒）15g 附子（制）15g 乌梅 30g 诃子 30g 大黄 30g 百部 30g 木香 15g 榧子 30g）

青黛散（青黛 200g 黄连 200g 黄柏 200g 薄荷 200g 桔梗 200g 儿茶 200g）

板青颗粒（板蓝根 600g 大青叶 900g）

板蓝根片（板蓝根 300g 茵陈 150g 甘草 50g）

郁金散（郁金 30g 诃子 15g 黄芩 30g 大黄 60g 黄连 30g 黄柏 30g 栀子 30g 白芍 15g）

拨云散（炉甘石 9g 硼砂 9g 大青盐 9g 黄连 9g 铜绿 9g 硼砂 3g 冰片 3g）

金花平喘散（洋金花 200g 麻黄 100g 苦杏仁 150g 石膏 400g 明矾 150）

金荞麦片（本品为金荞麦粉及浸膏加工制成的片剂。每片相当于金荞麦原药材 0.3g）

金锁固精散（沙苑子（炒）60g 芡实（盐炒）60g 莲须 60g 龙骨（煅）30g 牡蛎（煅）30g 莲子 30g）

肥猪菜（白芍 20g 前胡 20g 陈皮 20g 滑石 20g 碳酸氢钠 20g）

肥猪散（绵马贯众 30g 何首乌（制）30g 麦芽 500g 黄豆（炒）500g）

鱼腥草注射液（本品为鱼腥草经水蒸气蒸馏制成的灭菌水溶液。每 1ml 相当于原生药 2g。）

定喘散（桑白皮 25g 苦杏仁（炒）20g 莱菔子 30g 葶苈子 30g 紫苏子 20g 党参 30g 白术（炒）20g 关木通 20g 大黄 30g 郁金 25g 黄芩 25g 栀子 25g）

降脂增蛋散（刺五加 50g 仙茅 50g 何首乌 50g 当归 50g 艾叶 50g 党参 80g 白术 80g 山楂 40g 六神曲 40g 麦芽 40g 松针 200g）

参苓白术散（党参 60g 茯苓 30g 白术（炒）60g 山药 60g 甘草 30g 白扁豆（炒）60g 莲子 30g 薏苡仁（炒）30g 砂仁 15g 桔梗 30g 陈皮 30g）

荆防败毒散（荆芥 45g 防风 30g 羌活 25g 独活 25g 柴胡 30g 前胡 25g 枳壳 30g 茯苓 45g 桔梗 30g 川芎 25g 甘草 15g 薄荷 15g）

荆防解毒散（金银花 30g 连翘 30g 生地黄 15g 牡丹皮 15g 赤芍 15g 荆芥 15g 薄荷 15g 防风 15g 苦参 30g 蝉蜕 30g 甘草 15g）

茵陈木通散（茵陈 15g 连翘 15g 桔梗 12g 川木通 12g 苍术 18g 柴胡 12g 升麻 9g 青皮 15g 陈皮 15g 泽兰 12g 荆芥 9g 防风 9g 槟榔 15g 当归 18g 牵牛子 18g）

茵陈蒿散（茵陈 120g 栀子 60g 大黄 45g）

茴香散（小茴香 30g 肉桂 20g 槟榔 10g 白术 25g 木通 10g 巴戟天 20g 当归 20g 牵牛子 10g 藁本 20g 白附子 15g 川楝子 20g 肉豆蔻 15g 草澄茄 20g）

厚朴散（厚朴 30g 陈皮 30g 麦芽 30g 五味子 30g 肉桂 30g 砂仁 30g 牵牛子 15g 青皮 30g）

胃肠活（黄芩 20g 陈皮 20g 青皮 15g 大黄 25g 白术 15g 木通 15g 槟榔 10g 知母 20g 玄明粉 30g 六神曲 20g 石菖蒲 15g 乌药 15g 牵牛子 20g）

虾蟹脱壳促长散（露水草 50g 龙胆 150g 泽泻 100g 沸石 350g 夏枯草 100g 筋骨草 150g 酵母 50g 稀土 50g）

钩吻末（本品为钩吻制成的散剂。）

香薷散（香薷 30g 黄芩 45g 黄连 30g 甘草 15g 柴胡 25g 当归 30g 连翘 30g 栀子 30g 天花粉 30g）

复方大黄酊（大黄 100g 陈皮 20g 草豆蔻 20g 60%乙醇 适量）

复方龙胆酊（苦味酊）（龙胆 100g 陈皮 40g 草豆蔻 10g 60%乙醇 适量）

复方豆蔻酊（草豆蔻 20g 小茴香 10g 桂皮 25g 甘油 50ml 60%乙醇 适量）

复明蝉蜕散（蝉蜕 35g 龙胆 35g 生地黄 25g 菊花 25g 珍珠母 50g 决明子 30g 栀子 25g 黄芩 40g 白芷 25g 防风 25g 苍术 35g 蒺藜 25g 青箱子 25g 木贼 35g 旋覆花 25g）

保胎无忧散（当归 50g 川芎 20g 熟地黄 50g 白芍 30g 黄芪 30g 党参 40g 白术（炒焦）60g 枳壳 30g 陈皮 30g 黄芩 30g 紫苏梗 30g 艾叶 20g 甘草 20g）

保健锭（樟脑 30g 薄荷脑 5g 大黄 15g 陈皮 8g 龙胆 15g 甘草 7g 滑石粉、淀粉、乙醇各适量。）

促孕灌注液（淫羊藿 400g 益母草 400g 红花 200g）

独活寄生散（独活 25g 桑寄生 45g 秦艽 25g 防风 25g 细辛 10g 当归 25g 白芍 15g 川芎 15g 熟地黄 45g 杜仲 30g 牛膝 30g 党参 30g 茯苓 30g 肉桂 20g 甘草 15g）

姜酊（本品为姜流浸膏经过加工制成的酊剂。）

姜流浸膏（本品为干姜加工制成的流浸膏。）

洗心散（天花粉 25g 木通 20g 黄芩 45g 黄连 30g 连翘 30g 茯苓 20g 黄柏 30g 桔梗 25g 白芷 15g 栀子 30g 牛蒡子 45g）

穿心莲注射液（本品为穿心莲经水醇法提取制成的灭菌水溶液。每 1ml 相当于原生药 1g。）

秦艽散（秦艽 30g 蒲黄 25g 黄芩 20g 瞿麦 25g 当归 25g 红花 15g 车前子 25g 大黄 20g 白芍 20g 栀子 25g 天花粉 25g 淡竹叶 15g 甘草 15g）

泰山盘石散（泰山磐石散）（党参 30g 黄芪 30g 当归 30g 续断 30g 黄芩 30g 川芎 15g 白芍 30g 熟地黄 45g 白砂仁 15g 甘草（炙）12g）

桂心散（肉桂 25g 青皮 20g 白术 30g 厚朴 30g 益智 20g 干姜 25g 当归 20g 陈皮 25g 砂仁 25g 五味子 25g 肉豆蔻 25g 甘草 25g）

桃花散（陈石灰 480g 大黄 90g）

破伤风散（甘草 500g 蝉蜕 120g 钩藤 90g 川芎 30g 荆芥 45g 防风 60g 大黄 60g 关木通 45g 黄芪 50g）

柴胡注射液（本品为柴胡制成的注射液。每 1ml 相当于原生药 1g。）

柴葛解肌散（柴胡 30g 葛根 30g 甘草 15g 黄芩 25g 羌活 30g 白芷 15g 白芍 30g 桔梗 20g 石膏 60g）

蚌毒灵散（黄芩 60g 黄柏 20g 大青叶 10g 大黄 10g）

蚕用蜕皮液（本品为筋骨草或紫背金盘经加工制成的水溶液。）

健鸡散（党参 20g 黄芪 20g 茯苓 20g 六神曲 10g 麦芽 10g 山楂（炒）10g 甘草 5g 槟榔（炒）5g）

健胃散（山楂 15g 麦芽 15g 六神曲 15g 槟榔 3g）

健猪散（大黄 400g 玄明粉 400g 苦参 100g 陈皮 100g）

健脾散（当归 20g 白术 30g 青皮 20g 陈皮 25g 厚朴 30g 肉桂 30g 干姜 30g 茯苓 30g 五味子 25g 石菖蒲 25g 砂仁 20g 泽泻 30g 甘草 20g）

益母生化散（益母草 120g 当归 75g 川芎 30g 桃仁 30g 干姜（炮）15g 甘草（炙）15g）

消疮散（金银花 60g 皂角刺（炒）30g 白芷 25g 天花粉 30g 当归 30g 甘草 15g 赤芍 25g 乳香 25g 没药 25g 防风 25g 浙贝母 30g 陈皮 60g）

消食平胃散（槟榔 25g 山楂 60g 苍术 30g 陈皮 30g 厚朴 20g 甘草 15g）

消积散（山楂（炒）15g 麦芽 30g 六神曲 15g 莱菔子（炒）15g 大黄 10g 玄明粉 15g）

消黄散（知母 30g 浙贝母 25g 黄芩 45g 甘草 20g 黄药子 30g 白药子 30g 大黄 45g 郁金 45g）

通关散（猪牙皂 500g 细辛 500g）

通乳散（当归 30g 王不留行 30g 黄芪 60g 路路通 30g 红花 25g 通草 20g 漏芦 20g 瓜蒌 25g 泽兰 20g 丹参 20g）

通肠芍药散（大黄 30g 槟榔 20g 山楂 45g 枳实 25g 赤芍 30g 木香 20g 黄芩 30g 黄连 25g 玄明粉 90g）

通肠散（大黄 150g 枳实 60g 厚朴 60g 槟榔 30g 玄明粉 200g）

桑菊散（桑叶 45g 菊花 45g 连翘 45g 薄荷 30g 苦杏仁 20g 桔梗 30g 甘草 15g 芦根 30g）

理中散（党参 60g 干姜 30g 甘草 30g 白术 60g）

理肺止咳散（百合 45g 麦冬 30g 清半夏 25g 紫菀 30g 甘草 15g 远志 25g 知母 25g 北沙参 30g 陈皮 25g 茯苓 25g 浮石 20g）

理肺散（蛤蚧 1 对 知母 20g 浙贝母 20g 秦艽 20g 紫苏子 20g 百合 30g 山药 20g 天冬 20g 马兜铃 25g 枇杷叶 20g 防己 20g 白药子 20g 栀子 20g 天花粉 20g 麦冬 25g 升麻 20g）

黄连解毒片（黄连 30g 黄芩 60g 黄柏 60g 栀子 45g）

黄连解毒散（黄连 30g 黄芩 60g 黄柏 60g 栀子 45g）
银翘散（金银花 60g 连翘 45g 薄荷 30g 荆芥 30g 淡豆豉 30g 牛蒡子 45g 桔梗 25g 淡竹叶 20g 甘草 20g

芦根 30g）

猪苓散（猪苓 30g 泽泻 45g 肉桂 45g 干姜 60g 天仙子 20g）

猪健散（龙胆草 30g 苍术 30g 柴胡 10g 干姜 10g 碳酸氢钠 20g）

麻杏石甘片（麻黄 30g 苦杏仁 30g 生石膏 150g 甘草 30g 以上 4 味，粉碎成细粉，过筛，混匀，制粒，干燥，压制成 800 片，即得）

麻杏石甘散（麻黄 30g 苦杏仁 30g 石膏 150g 甘草 30g）

麻黄鱼腥草散（麻黄 50g 黄芩 50g 鱼腥草 100g 穿心莲 50g 板蓝根 50g）

麻黄桂枝散（麻黄 45g 桂枝 30g 细辛 5g 羌活 25g 防风 25g 桔梗 30g 苍术 30g 荆芥 25g 紫苏叶 25g 薄荷 25g 槟榔 20g 甘草 15g 皂角 20g 枳壳 30g）

清肺止咳散（桑白皮 30g 知母 25g 苦杏仁 25g 前胡 30g 金银花 60g 连翘 30g 桔梗 25g 甘草 20g 橘红 30g 黄芩 45g）

清肺散（板蓝根 90g 葶苈子 50g 浙贝母 50g 桔梗 30g 甘草 25g）

清胃散（石膏 60g 大黄 45g 知母 30g 黄芩 30g 陈皮 25g 枳壳 25g 天花粉 30g 甘草 30g 玄明粉 45g 麦冬 30g）

清热健胃散（龙胆 30g 黄柏 30g 知母 20g 陈皮 25g 厚朴 20g 大黄 20g 山楂 20g 六神曲 20g 麦芽 30g 碳酸氢钠 50g）

清热散（大青叶 60g 板蓝根 60g 石膏 60g 大黄 30g 玄明粉 60g）

清暑散（香薷 30g 白扁豆 30g 麦冬 25g 薄荷 30g 木通 25g 猪牙皂 20g 藿香 30g 茵陈 25g 菊花 30g 石菖蒲 25g 金银花 60g 茯苓 25g 甘草 15g）

清解合剂（石膏 670g 金银花 140g 玄参 100g 黄芩 80g 生地黄 80g 连翘 70g 栀子 70g 龙胆 60g 甜地丁 60g 板蓝根 60g 知母 60g 麦冬 60g）

清瘟败毒片（石膏 120g 地黄 30g 水牛角 60g 黄连 20g 栀子 30g 牡丹皮 20g 黄芩 25g 赤芍 25g 玄参 25g 知母 30g 连翘 30g 桔梗 25g 甘草 15g 淡竹叶 25g 以上 14 味，粉碎，过筛，混匀，制粒，干燥，压制成 1600 片（包衣），即得。）

清瘟败毒散（石膏 120g 地黄 30g 水牛角 60g 黄连 20g 栀子 30g 牡丹皮 20g 黄芩 25g 赤芍 25g 玄参 25g 知母 30g 连翘 30g 桔梗 25g 甘草 15g 淡竹叶 25g）

蛋鸡宝（党参 100g 黄芪 200g 茯苓 100g 白术 100g 麦芽 100g 山楂 100g 六神曲 100g 菟丝子 100g 蛇床子 100g 淫养霍 100g）

雄黄散（雄黄 200g 白及 200g 白蔹 200g 龙骨（煅）200g 大黄 200g）

紫草膏（紫草 60g 金银花 60g 当归 60g 白芷 60g 麻油

500g 白蜡 25g 冰片 6g)

跛行镇痛散(当归 80g 红花 60g 桃仁 70g 丹参 80g 桂枝 70g 牛膝 80g 土鳖虫 20g 乳香(制) 20g 没药(制) 20g)

喉炎净散(板蓝根 840g 蟾蜍 80g 合成牛黄 60g 胆膏 120g 甘草 40g 青黛 24g 玄明粉 40g 冰片 28g 雄黄 90g)

普济消毒散(大黄 30g 黄芩 25g 黄连 20g 甘草 15g 马勃 20g 薄荷 25g 玄参 25g 牛蒡子 45g 升麻 25g 柴胡 25g 桔梗 25g 陈皮 20g 连翘 30g 荆芥 25g 板蓝根 30g 青黛 25g 滑石 80g)

温脾散(当归 25g 厚朴 30g 青皮 25g 陈皮 30g 益智 30g 牵牛子(炒) 15g 细辛 12g 苍术 30g 甘草 20g)

滑石散(滑石 60g 泽泻 45g 灯心草 15g 茵陈 30g 知母(酒制) 30g 黄柏(酒制) 30g 猪苓 25g 瞿麦 25g)

强壮散(党参 200g 六神曲 70g 麦芽 70g 山楂(炒) 70g 黄芪 200g 茯苓 150g 白术 100g 草豆蔻 140g)

槐花散(槐花(炒) 60g 侧柏叶(炒) 60g 荆芥(炒炭) 60g 枳壳(炒) 60g)

蜂螫酊(百部 马钱子(制) 烟叶等量)

催奶灵散(王不留行 20g 黄芪 10g 皂角刺 10g 归 20g 党参 10g 川芎 20g 漏芦 5g 路路通 5g)

催情散(淫羊藿 6g 阳起石(酒淬) 6g 当归 4g 香附 5g 益母草 6g 菟丝子 5g)

解暑抗热散(滑石 51g 甘草 8.6g 碳酸氢钠 40g 冰片 0.4g)

雏痢净(白头翁 30g 黄连 15g 黄柏 20g 马齿苋 30g 乌梅 15g 诃子 9g 木香 20g 苍术 60g 苦参 10g)

镇心散(朱砂 10g 茯苓 25g 党参 30g 防风 25g 甘草 15g 远志 25g 栀子 30g 郁金 25g 黄芩 30g 黄连 30g 麻黄 15g)

镇喘散(香附 300g 黄连 200g 干姜 300g 桔梗 150g 北豆根 100g 皂角 40g 甘草 100g 合成牛黄 40g 蟾蜍 30g 雄黄 30g 明矾 50g)

镇痫散(当归 6g 川芎 3g 白芍 6g 全蝎 1g 僵蚕 6g 钩藤 6g 蜈蚣 1g 朱砂 0.5g)

橘皮散(青皮 25g 陈皮 30g 厚朴 25g 肉桂 30g 细辛 12g 小茴香 45g 当归 25g 白芷 15g 槟榔 12g)

颠茄酊(本品为颠茄草经加工制成的酊剂。)

激蛋散(虎杖 100g 丹参 80g 菟丝子 60g 当归 60g 川芎 60g 牡蛎 60g 地榆 50g 肉苁蓉 60g 丁香 20g 白芍 50g 明矾 50g)

擦疥散(狼毒 120g 猪牙皂(炮) 120g 巴豆 30g 雄黄 9g 轻粉 5g)

藿香正气散(藿香 60g 紫苏叶 45g 茯苓 30g 白芷 15g 大腹皮 30g 陈皮 30g 桔梗 25g 白术(炒) 30g 厚朴 30g

半夏(制) 20g 甘草 15g)